

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Embrapa Clima Temperado
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
BR 392 - km 78 - CEP 96010-971 - Pelotas, RS - Cx. Postal 403
www.embrapa.br/clima-temperado
www.embrapa.br/fale-conosco

BRS CAINGUÁ

Cultivar de amoreira-preta

Embrapa Clima Temperado - Junho 2019 - 300 exemplares

Foto: Maria do Carmo Bassoli Pasera



MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA
E ABASTECIMENTO



PÁTRIA AMADA
BRASIL
GOVERNO FEDERAL





Origem: 'BRS Cainguá', testada como seleção Black 212, é resultante de hibridação entre a Seleção 2/96 e a cultivar Caingangue, ambas do programa de melhoramento da Embrapa Clima Temperado.

Planta: As plantas da cultivar BRS Cainguá são mais eretas, se comparada às plantas das cultivares BRS Xingu e Tupy. As hastes apresentam espinhos, mas esses são em menor número e tamanho do que nas cultivares citadas. As folhas são de coloração verde mais clara, tendendo a verde-amarelado. Logo que abrem, as flores têm tons rosados tornando-se, posteriormente, brancas.

Colheita: Nos últimos cinco anos, apenas em 2013 o início da colheita coincidiu exatamente com o início da cultivar Tupy. Em geral, ela inicia alguns dias mais tarde, no fim de novembro.

Finalidade: As frutas dessa cultivar são alongadas e de maior tamanho, conferindo ótima aparência, o que as destaca das frutas de outras cultivares. Quanto ao sabor, elas são, no mínimo, comparáveis às da cultivar Tupy. Em geral, apresentam maior relação açúcar/acidez, o que proporciona melhor sabor. Assim, acredita-se que a cultivar BRS Cainguá será bem aceita na comercialização como fruta fresca.

Adaptação: Esta cultivar tem faixa de adaptação semelhante àquela da cultivar Tupy, ou seja, áreas com 200 a 300 horas de acúmulo de frio hibernal (temperaturas iguais ou menores que 7,2 °C). É possível que a adaptação seja mais ampla, mas ela não foi testada em áreas diferentes dessa faixa.

Tratos culturais: Seguem as mesmas recomendações das demais cultivares. Entretanto, como as plantas são menos vigorosas, se o produtor quiser alta produção já nos primeiros anos, poderá usar menor espaçamento entre plantas nas linhas de plantio (entre 50 cm e 80 cm entre plantas). Por apresentar o hábito de crescimento ereto ou semiereto e ser menos vigorosa, pode dispensar a utilização de sistemas de sustentação.

Época de plantio: Preferentemente nos meses de outono.

Disponibilidade: Mudanças da nova cultivar poderão ser obtidas junto aos viveiristas licenciados pela Embrapa. Consultar o site: <https://www.embrapa.br/cultivar/amora>

