



ISBN

Nº 48

08.10.81

# Diário - noticiário - noticiário

## material para imprensa, rádio e televisão - divulgação livre

### VARIETADES DE SOJA RECOMENDADAS PELA EMBRAPA PARA 1981/82

A EMBRAPA através da Unidade de Execução de Pesquisa de Âmbito Estadual de Dourados (UEPAE Dourados), com base em resultados de pesquisa de vários anos em locais representativos da região, realizou durante a reformulação do Sistema de Produção para Soja (Dourados 21 e 22.7.81) algumas modificações na lista de variedades recomendadas para a região da Grande Dourados.

A relação das cultivares recomendadas com os respectivos ciclos de maturação e peso de 100 sementes encontram-se na tabela abaixo:

Cultivares recomendadas para a região da Grande Dourados, safra 1981/82.

Cultivares	Ciclo (dias)	Peso de 100 sementes (g)
<b>GRUPO PRECOCE</b>	menos que 105	
Paraná		13,6
Coker 136 <sup>a</sup>		13,6
IAS 5		16,4
Davis		13,9
Bragg		13,2
<b>GRUPO MÉDIO</b>	106 a 125	
União		13,6
BR 5		13,6
Bossier		12,8
Florida <sup>a</sup>		16,8
Missões <sup>a</sup>		18,9
<b>GRUPO SEMITARDIO</b>	126 a 135	
Dourados		12,9
Santa Rosa		11,6
Andrews		10,9
Tiaraju <sup>b</sup>		10,8
Viçoja		11,9
IAC 4		9,9
São Luiz <sup>a</sup>		14,5
Mineira <sup>a</sup>		12,8
Industrial <sup>a</sup>		12,2
<b>GRUPO TARDIO</b>	mais que 136	
IAC 3 <sup>a</sup>		10,2
UFV 1		9,6

<sup>a</sup> Cultivares que não serão mais recomendadas a partir da safra 1982/83, inclusive.

<sup>b</sup> Nova cultivar lançada pela EMBRAPA-UEPAE Dourados.

/id



As variedades Coker 136, Flórida, Missões, São Luiz, Mineira, Industrial e IAC 3 não serão mais recomendadas a partir da safra 1982/83, inclusive, sendo que os agricultores deverão produzir apenas grãos com fins comerciais.

A variedade Tiaraju está sendo recomendada pela primeira vez para cultivo, por apresentar boas características agronômicas e satisfatório rendimento de grãos quando comparada com as variedades de mesmo ciclo.

A densidade de sementeira deve ser calculada visando uma população de 400.000 plantas por hectare, sendo que a época de sementeira deve ser escalonada entre 15 de outubro a 15 de dezembro.