FOLHA - MI - 1525-3-IV



LEGENDA

LA 1 - LATOSSOLO AMARELO Distrocoeso típico A moderado e proeminente textura argilosa muito argilosa fase floresta subperenifólia relevo plano. (Situação: amplas superfícies de tabuleiro com declividade < 3%).

LA 2 - LATOSSOLO AMARELO Distrocoeso típico A moderado e proeminente textura argilosa e muito argilosa fase floresta subperenifólia relevo plano e suave ondulado. (Situação: superfícies de tabuleiro com declividade < 8%).

LA 4 - Associação de: LATOSSOLO AMARELO Distrocoeso típico A moderado e proeminente textura argilosa + ARGISSOLO AMARELO e VERMELHO-AMARELO Distróficos típicos e/ou latossólicos e/ou plínticos + ARGISSOLO AMARELO e VERMELHO-AMARELO Distróficos típicos e/ou plínticos fase endoconcrecionária (ou concrecionária), estes textura média e argilosa/argilosa; todos A moderado e proeminente fase floresta subperenifólia (e partes de cerrado) relevo suave ondulado e ondulado (proporção dos componentes: 50-25-25%).
(Situação: superfícies de tabuleiros irregulares e desgastadas com declividade entre 3 e 20%).

LA 5 - Associação de: LATOSSOLO AMARELO e VERMELHO-AMARELO textura média + ARGISSOLO AMARELO e VERMELHO-AMARELO latossólicos e/ou típicos textura arenosa e média/média e argilosa + ARGISSOLO AMARELO e VERMELHO-AMARELO plínticos textura arenosa e média/média e argilosa, todos Distróficos A moderado e proeminente fase floresta subperenifólia relevo suave ondulado e plano (proporção dos componentes: 40-40-20%). (Situação: plataformas à piemonte, isto é, entre os sopés das encostas e as várzeas, com declividades geralmente menores que 8%).

PA 1 - Associação de: ARGISSOLO AMARELO e VERMELHO-AMARELO típicos e plínticos textura média e argilosa/argilosa + LATOSSOLO AMARELO e VERMELHO-AMARELO textura argilosa + ARGISSOLO AMARELO e VERMELHO-AMARELO plínticos e típicos textura média e argilosa/argilosa fase endoconcrecionária e concrecionária, todos Distróficos A moderado e proeminente fase floresta subperenifólia relevo ondulado e forte ondulado (proporção dos componentes: 35-35-30%). (Situação: superfícies dissecadas dos tabuleiros, encostas com declividade entre 8 e 40%).

PA 2 - Associação de: ARGISSOLO AMARELO e VERMELHO-AMARELO típicos textura média e argilosa/argilosa + LATOSSOLO AMARELO e VERMELHO-AMARELO textura argilosa + ARGISSOLO AMARELO e VERMELHO-AMARELO plínticos e típicos textura média e argilosa/argilosa fase endoconcrecionária (ou concrecionária), todos Distróficos A moderado e proeminente fase floresta subperenifólia relevo forte ondulado e escarpado (proporção dos componentes: 40-30-30%). (Situação: superfícies muito dissecadas dos tabuleiros com declividade entre 20 e >75%).

G 1 - GLEISSOLO HÁPLICO Tb e Ta Eutrófico (e Distrófico) típico textura argilosa, muito argilosa e/ou indiscriminada A moderado fase campo hidrófilo e floresta subperenifólia de várzea relevo plano. (Situação: áreas de várzeas, geralmente estreitas).

G 2 - Associação de: GLEISSOLO HÁPLICO Tb típico textura argilosa e/ou indiscriminada + NEOSSOLO FLÚVICO gleissólico e típicos textura indiscriminada substrato de sedimento argiloso e argiloarenoso, ambos Eutróficos e Distróficos A moderado fase campo hidrófilo e floresta subperenifólia de várzea relevo plano (proporção dos componentes: 70-30%). (Situação: áreas de várzeas, geralmente mais largas e próximas do litoral).

G 4 - Associação de: GLEISSOLO HÁPLICO Tb típico + CAMBISSOLO HÁPLICO Tb gleissólico substrato de sedimento argiloso e argiloarenoso, ambos Eutróficos (e Distróficos) A moderado textura argilosa, muito argilosa e/ou indiscriminada fase campo hidrófilo e floresta subperenifólia de várzea relevo plano [proporção dos componentes: 70-30%). (Situação: áreas de várzeas, geralmente mais largas, localizadas mais para o interior).

CONVENÇÕES

- Limite de unidade
- Limite de bairro
- Limite da área piloto
- Rodovia asfaltada
- Rodovia não asfaltada
- Rio ou riacho
- Lagoa

ARTICULAÇÃO DAS FOLHAS



N
W E
S

1000 0 1000 2000 m

ESCALA GRÁFICA

PROJEÇÃO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR

DATUM VERTICAL : IMBITUBA - S. CATARINA
DATUM HORIZONTAL : SAD-69

ORIGEM DA QUILOMETRAGEM UTM: "EQUADOR E MERIDIANO 33° W. G.R."
ACRESCIDA AS CONSTANTES: 10 000km , RESPECTIVAMENTE

Ministério da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento

Embrapa Solos

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
Secretaria Municipal de Planejamento

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ

ANEXO I - b
LEVANTAMENTO SEMIDETALHADO DE SOLOS

Autores:
- Antônio Cabral Cavalcanti
- Osvaldo Ferreira Lopes
- Roberto da Boa Viagem Parahyba
- Aldo Pereira Leite
- Flávio H. Barreto Batista da Silva
- Manoel Batista de Oliveira Neto

Data: Outubro 2008

Folha: **MI - 1525-3-IV**

Escala: 1:25 000

DIGITALIZAÇÃO E GEOPROCESSAMENTO:
- David Ferreira
- Regina Célia
- Rafael B. S. Santos
- Jackeline Gadé de Araujo
- João Cordeiro da Fonseca

Base cartográfica: Vide relatório