

**Cultura *In Vitro* de Embriões
Zigóticos de Coqueiro
Anão Verde do Brasil de Jiqui**





*Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Embrapa Tabuleiros Costeiros
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento*

ISSN 1678-1961

Setembro, 2007

Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento 23

Cultura *In Vitro* de Embriões Zigóticos de Coqueiro Anão Verde do Brasil de Jiqui

Ana da Silva Lédo
Evandro Almeida Tupinambá
Wilson Menezes de Aragão

Aracaju, SE
2007

Disponível em: <http://www.cpatc.embrapa.br>

Embrapa Tabuleiros Costeiros

Av. Beira Mar, 3250

Aracaju, SE

CEP: 49025-040

Fone: **79-4009-1300

Fax: **79-4009-1369

www.cpatc.embrapa.br

E-mail: sac@cpatc.embrapa.br

Comitê Local de Publicações

Presidente: Edson Diogo Tavares

Secretária-Executiva: Maria Ester Gonçalves Moura

Membros: Emanuel Richard Carvalho Donald, Emanuel Richard Carvalho Donald,

José Henrique de Albuquerque Rangel, Julio Roberto Araujo de Amorim,

Ronaldo Souza Resende, Joana Maria Santos Ferreira

Normalização bibliográfica: Josete Cunha Melo

Supervisora Editorial: Raquel Fernandes de Araújo Rodrigues

Tratamento de ilustrações: Diego Corrêa Alcântara Melo

Foto(s) da capa: Arquivo Embrapa Tabuleiros Costeiros

Editoração eletrônica: Diego Corrêa Alcântara Melo

1ª edição

Todos os direitos reservados.

A reprodução não-autorizada desta publicação, no todo ou em parte, constitui violação dos direitos autorais (Lei no 9.610).

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) Embrapa Tabuleiros Costeiros

Lédo, Ana da Silva

Cultura in vitro de embriões zigóticos de coqueiro anão verde do Brasil de Jequi / Ana Silva Lédo ... [et al] -- Aracaju : Embrapa Tabuleiros Costeiros, 2007.

22 p. : il. - (Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento / Embrapa Tabuleiros Costeiros, ISSN 1678-1961; 23).

Disponível em:

1. Coco. 2. Coco-anão. 3. Genética. I. Lédo, Ana da Silva. II. Tupinanbá, Evandro Almeida. III. Aragão, Wilson Menezes de. IV. Título. V. Série.

CDD-634.61

© Embrapa 2007

Sumário

Resumo	5
Abstract	7
Introdução	8
Material e Métodos	9
Resultados e Discussão	13
Conclusões	17
Agradecimentos	18
Referências Bibliográficas	18

Cultura *In Vitro* de Embriões Zigóticos de Coqueiro Anão Verde do Brasil de Jiqui

A. da S. Léo¹ E. A. Tupinambá² W. M. de Aragão³

Resumo

O objetivo deste trabalho foi ajustar os protocolos de cultivo *in vitro* de embriões zigóticos e de aclimação de plântulas de coqueiro anão verde do Brasil de Jiqui (*Cocos nucifera* L.). Os embriões zigóticos maduros, inoculados assepticamente em meio de cultura líquido Y3 suplementado com 27,8 mg L⁻¹ de Fe₂SO₄.7H₂O e 60 g L⁻¹ de sacarose, apresentaram maior germinação e formação de plântulas normais. As plântulas transferidas para meio indutor de enraizamento Y3, gelificado e suplementado com 1 mg L⁻¹ de ANA, 0,5 mg L⁻¹ de BAP e 2,5 g L⁻¹ de carvão ativado, apresentaram incremento do desenvolvimento radicular e da parte aérea. Na fase de aclimação, o substrato composto por areia lavada e pó de casca de coco seco, na proporção de 1:1, proporcionou maior sobrevivência das plântulas (58,33%), maior crescimento da parte aérea (39,08 cm) e maior número de folhas (6,33). Os resultados indicam que os protocolos estabelecidos para o cultivo *in vitro* de embriões zigóticos e a aclimação de coqueiro anão verde de Jiqui podem ser utilizados no intercâmbio e conservação de germoplasma.

Termos para indexação: *Cocos nucifera*, germinação *in vitro*, meios de cultura, regulador de crescimento.

¹Pesquisadora da Embrapa Tabuleiros Costeiros, Av. Beira Mar, 3250, CEP 49025-040, Caixa Postal 44, CEP 49001-970, Aracaju, SE, analedo@cpatc.embrapa.br

²Pesquisador da Embrapa Tabuleiros Costeiros, tupi@cpatc.embrapa.br

³Pesquisador da Embrapa Tabuleiros Costeiros, aragaowm@cpatc.embrapa.br

In Vitro Culture of Zygotic Embryos of Green Dwarf Coconut Palm

Abstract

In order to improve the protocols for culture and acclimatization of green dwarf coconut palm (*Cocos nucifera* L.). Mature zygotic embryos, cultivated *in vitro* by aseptic inoculation in Y3 liquid medium culture, supplemented with 27.8 mg L⁻¹ of Fe₂SO₄·7H₂O and 60 g L⁻¹ of sucrose, presented higher germination and normal plantlets formation. The plantlets transferred to Y3 semi-solid medium culture supplemented with 1 mg L⁻¹ of ANA, 0.5 mg L⁻¹ of BAP and 2.5 g L⁻¹ of activated charcoal, promoted better root and shoot development. In the acclimatization phase, the 1:1 substrate composed of washed sand and coconut coir dust (1:1) provided higher survival of plantlets survival (58.33%), larger growth of the aerial part (39.08 cm) and larger number of leaves (6.33). The results indicate that the established protocols for *in vitro* culture of zygotic embryos and acclimatization of green dwarf coconut palm plantlets can be applied to germoplasm exchange and conservation.

Index terms: *Cocos nucifera*, culture media, growth regulator, *in vitro* germination.

Introdução

A cultura de embriões tem sido utilizada para coleta e intercâmbio de germoplasma de coqueiro porque suas sementes apresentam grandes dimensões o que aumenta drasticamente o volume de material a ser coletado e conservado (Engelmann & Batugal, 2002). Técnicas *in vitro* simples e eficientes têm sido estabelecidas por vários grupos de pesquisa em diversos países. A cultura de embriões zigóticos também tem sido aplicada na conservação de germoplasma a médio e a longo prazo (Assy-Bah & Engelmann, 1992, 1993). Entretanto, a aplicação dessas técnicas requer o estabelecimento de protocolos eficientes de germinação e desenvolvimento *in vitro* de embriões e aclimação em condições *in vivo* para o desenvolvimento de plantas adaptadas às condições de campo.

O primeiro protocolo de cultura de embriões de coqueiro foi publicado por De Guzman & Del Rosario (1964) para o coqueiro Makapuno e outros foram estabelecidos posteriormente (Assy-Bah et al., 1987; Rillo & Paloma, 1992; Ashburner et al., 1995). Resultados promissores com coqueiro gigante e coqueiro anão têm sido alcançados no Brasil (Siqueira et al., 1998; Silva, 2002; Angelo et al., 2003; Santana & Teixeira, 2004). Entretanto, tem-se observado uma alta variabilidade no desempenho do cultivo *in vitro* de embriões de coqueiro dentro de e entre ecotipos (Angelo et al., 2003), embora ainda não esteja esclarecido quanto dessa variabilidade é genética ou ambiental.

Alguns fatores no cultivo de embriões de coqueiro necessitam de mais estudos, a fim de se obter a formação de um sistema radicular funcional *in vitro* que permita uma maior sobrevivência das plantas na fase de aclimação. Os carboidratos desempenham papel importante na manutenção de uma osmolaridade adequada do meio de cultura e promoção do crescimento embrionário (Hu & Ferreira, 1998). O aumento, a redução ou a eliminação da sacarose no meio de cultivo podem ser determinantes no sucesso do enraizamento *in vitro* para muitas plantas (Calamar & De Klerk, 2002). O ferro, considerado elemento essencial nas transformações energéticas, ocorre em proteínas do grupo heme e não-heme, está diretamente implicado no metabolismo de ácidos nucléicos e atua como ativador enzimático, pode influenciar o desenvolvimento *in vitro* e promover oxidação dos explantes (Caldas et al., 1998; Dechen et al. citado por Utino et al., 2001). Diferentes concentrações de $\text{Fe}_2\text{SO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ têm sido utilizadas em meios nutritivos Y3 e MS para o cultivo *in vitro* de embriões zigóticos de variedades de coqueiro anão e coqueiro gigante, observando-se variação nas

respostas morfogênicas (Engelmann et al., 2002).

A aclimação de plântulas tem sido um grande entrave na micropropagação de muitas espécies, principalmente de palmeiras. A transferência de ambiente protegido, estéril, com açúcares e com umidade saturada, para ambiente não-estéril, sem açúcares e com reduzida umidade, tem levado à perda de plantas, baixa taxa de crescimento e período prolongado na obtenção de plantas completamente aclimatadas (Souza Júnior, 2001). A transferência de plântulas produzidas sob condições controladas para um ambiente sob condições naturais, deve ser progressiva evitando estresses (Silva et al., 1995).

A maioria dos protocolos publicados para o cultivo in vitro de embriões de coqueiro cita a areia esterilizada como substrato na fase de aclimação e os resultados obtidos indicam uma baixa porcentagem de sobrevivência das plantas (Engelmann et al., 2002). Pesquisas têm sido conduzidas com o objetivo de aumentar a taxa de sobrevivência. O cultivo in vitro de plântulas de coqueiro anão amarelo da Malásia em condições de casa de vegetação sob luz natural, promoveu um efeito positivo na taxa de sobrevivência quando estas foram transferidas para condições ex vitro em substrato composto por areia, argila e musgo (Taveleira et al., 2005).

O substrato, por meio de suas características químicas, físicas e biológicas, exerce uma grande influência na adaptação e desenvolvimento inicial das plantas em condições naturais. O uso de pó de casca de coco verde ou maduro na composição de substratos tem sido promissor para a produção de mudas de diferentes espécies (Correia et al., 2003; Terceiro Neto et al., 2004). Além da facilidade de produção, baixo custo e alta disponibilidade é uma alternativa de uso adequado para os resíduos agroindustriais de coco (Carrizo et al., 2002).

O objetivo deste trabalho foi ajustar protocolos de cultivo in vitro de embriões zigóticos e de aclimação de plântulas de coqueiro anão verde do Brasil de Jiqui em condições de telado.

Material e Métodos

As atividades foram conduzidas no Laboratório de Cultura de Tecidos de Plantas da Embrapa Tabuleiros Costeiros. Foram utilizados embriões zigóticos de frutos maduros, com 11 a 12 meses após a fertilização, de coqueiro anão verde do

Brasil de Jiqui proveniente do Banco Ativo de Germoplasma de Coco da Embrapa Tabuleiros Costeiros, localizado no Campo Experimental do Betume, em Neópolis-SE.

Cilindros de endosperma com embriões extraídos de frutos maduros foram submetidos a uma pré-asepsia com imersão em NaClO comercial e lavados em água potável, por três vezes, no local da coleta (Figura 1 A).

Em condições assépticas, os embriões foram excisados das seções de endosperma (Figura 1 B), imersos em álcool etílico a 70% por dois minutos, em seguida, em solução de NaClO comercial por 20 minutos sob agitação e, posteriormente, foram lavados quatro vezes em água destilada e autoclavada. Os embriões zigóticos foram inoculados em tubos de ensaio contendo 10 mL de meio de cultura Y3 líquido (Eeuwens, 1976), na ausência de carvão ativado (Figura 1 C). O pH do meio de cultura foi previamente ajustado para 5,8 e, em seguida, submetido à esterilização em autoclave a 121°C sob pressão de 1,05 kg cm⁻², durante 15 minutos.

O experimento foi instalado em delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial 2x3 (duas concentrações de sacarose x três concentrações de Fe₂SO₄.7H₂O), com cinco repetições. As seguintes combinações foram testadas: S1F1 (sacarose 60 g L⁻¹ + Fe₂SO₄.7H₂O 13,9 mg L⁻¹); S1F2 (sacarose 60 g L⁻¹ + Fe₂SO₄.7H₂O 27,8 mg L⁻¹); S1F3 (sacarose 60 g L⁻¹ + Fe₂SO₄.7H₂O 41,7 mg L⁻¹); S2F1 (sacarose 80 g L⁻¹ + Fe₂SO₄.7H₂O 13,9 mg L⁻¹); S2F2 (sacarose 80 g L⁻¹ + Fe₂SO₄.7H₂O 27,8 mg L⁻¹); S2F3 (sacarose 80 g L⁻¹ + Fe₂SO₄.7H₂O 41,7 mg L⁻¹).

As culturas foram mantidas em sala de crescimento à temperatura de 26±2°C, umidade relativa do ar em torno de 70% e na ausência de luz até a emissão da plúmula e da raiz (Figura 1 D), quando foram transferidas para fotoperíodo de 12 horas de luz branca fria sob 52 μmol.m⁻².s⁻¹ de irradiância e 12 horas de escuro. A renovação do meio de cultura ocorreu em intervalos de 30 a 35 dias.

Aos 70 dias após a inoculação, foram avaliadas a porcentagem de germinação dos embriões zigóticos (% GEZ), porcentagem de plântulas normais (% PN) e comprimento da parte aérea (CPA) e da raiz primária (CR) (Figura 1 E). Como plântulas anormais, foram consideradas aquelas que apresentavam crescimento atrofiado da parte aérea ou do sistema radicular ou do haustório.

Aos 150 dias de cultivo *in vitro* (Figura 1 F), as plântulas foram transferidas para o meio indutor de enraizamento gelificado com Phytigel® 2 g L⁻¹, composto pelos sais e vitaminas do meio Y3, suplementado com ácido naftalenoacético (ANA) 1 mg L⁻¹, 6-benzilaminopurina (BAP) 0,5 mg L⁻¹, carvão ativado 2,5 g L⁻¹ e sacarose 40 g L⁻¹ (Figura 1 G). As plântulas foram mantidas nas mesmas condições da etapa anterior, com a renovação do meio de cultura de igual composição em intervalos de 30 a 35 dias. Aos 60 dias após a transferência, foram avaliados o número médio por plântula de raízes primárias, raízes secundárias e folhas. Como raiz primária foi considerada a raiz oriunda do pólo radicular e, como secundárias, as raízes formadas a partir do periciclo da raiz primária.

Aos 210 dias de cultivo *in vitro*, as plântulas tiveram seu sistema radicular cuidadosamente lavado com água destilada e mergulhado por 5 minutos em solução de fungicida (Benomil 2 g L⁻¹). Em seguida, foram transplantadas em sacos perfurados de polietileno preto nas dimensões 28 cm x 20 cm, com os seguintes substratos: T1- Areia lavada (AL) e T2- Mistura de areia lavada e pó de casca de coco seco (ALPC), na proporção de 1:1, em volume. Os dois substratos foram esterilizados em autoclave a 121° C sob pressão de 1,05 kg cm⁻², durante 15 minutos.

Para avaliação da aclimação utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado com dois tratamentos e quinze repetições, sendo cada unidade experimental constituída de três mudas. As mudas foram mantidas sob telado com 50% de sombreamento (Figura 1 H), e foram cobertas, nos primeiros sete dias, com sacos plásticos transparentes e submetidas regularmente à irrigação e, de dois em dois dias, suplementadas com solução nutritiva PCA-ARC (Engelmann et al., 2002). Aos 60 dias após o transplantio foi avaliada a porcentagem de sobrevivência das mudas e, aos 30 e 120 dias, o número de folhas vivas e a altura da parte aérea (cm). A altura da parte aérea foi mensurada a partir do nível do substrato até a extremidade da maior folha.

As médias das variáveis mensuradas nos experimentos foram submetidas à análise da variância pelo teste F e, quando significativo, foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.




Figura 1. Esquema do cultivo de embriões zigóticos de coqueiro-anão-verde do Brasil de Jiqui. A) discos de endosperma; B) embrião zigótico excisado do disco de endosperma; C) embriões zigóticos inoculados em meio de cultura Y3 líquido; D) emissão da plúmula e da raiz; E) plântulas desenvolvidas aos 70 dias; F) plântulas desenvolvidas aos 150 dias; G) plântulas transferidas para meio de cultura Y3 gelificado para indução de enraizamento; H) mudas em fase de aclimação, aos 120 dias de cultivo sob telado.

Resultados e Discussão

Não houve interação entre as concentrações de sacarose e $\text{Fe}_2\text{SO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ para todas as variáveis analisadas. Houve diferença significativa entre as concentrações de sacarose para a porcentagem de plântulas normais e comprimento da parte aérea aos 70 dias e de $\text{Fe}_2\text{SO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ para porcentagem de germinação de embriões zigóticos aos 30 dias de inoculação.

A concentração de 60 g L^{-1} de sacarose promoveu a formação de 83,33% de plântulas normais e o maior desenvolvimento de parte aérea (1,27 cm) (Tabela 1). Resultados semelhantes foram obtidos por Assy-Bah et al. (1989) que obtiveram maior porcentagem de germinação e melhor desenvolvimento *in vitro* de embriões de *C. nucifera* (híbrido PB 121) em meio MS com 60 g L^{-1} de sacarose e observaram um efeito inibitório do aumento da concentração de sacarose para 120 g L^{-1} na porcentagem de germinação. Silva (2002) também obteve melhor desenvolvimento de embriões nos meios de cultivo MS e Y3 suplementados com de 60 g L^{-1} de sacarose.

Considerando que a elevada pressão osmótica reduz o crescimento das plantas e afeta o metabolismo celular (Caldas et al., 1998), o aumento da concentração de sacarose de 60 g L^{-1} para 80 g L^{-1} no meio de cultura provavelmente promoveu um efeito depressivo no metabolismo das plântulas, resultando em maior porcentagem de plântulas anormais. Altas concentrações de sacarose no meio de cultura também afetam a capacidade da enzima Rubisco induzindo um decréscimo na fotossíntese (Triques et al., 1997). O estabelecimento do metabolismo fotossintético durante o desenvolvimento de plântulas de coqueiro *in vitro* e algumas similaridades entre estas plântulas e plantas adultas, como por exemplo, a presença de cloroplastos ativos, foram observados por Verdeil et al. (1998).

Em meio de cultura contendo $13,9 \text{ mg L}^{-1}$ e $27,8 \text{ mg L}^{-1}$ de $\text{Fe}_2\text{SO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ todos os embriões zigóticos germinaram, com a formação de 40 e 70% de plântulas normais, respectivamente, sendo estes tratamentos estatisticamente superiores àquele com concentração de $41,7 \text{ mg L}^{-1}$ (Tabela 1). A redução em 50% na germinação poder ser atribuída a maior oxidação dos embriões, devido à concentração de ferro mais elevada. Em trabalhos com bananeira-prata, Utino et al. (2001) observaram um efeito linear do ferro sobre o grau de oxidação dos explantes. A maior absorção de ferro pelo explante pode induzir a uma maior

produção de enzimas peroxidase e catalase, as quais apresentam ferro no grupo prostético (Pasqual et al., 1997), e aumentam a sua atividade após a liberação no meio de cultura promovendo o aumento da oxidação.

Tabela 1. Médias da porcentagem de germinação (% GEZ) aos 30 dias, porcentagem de plântulas normais (% PN) e do comprimento da parte aérea (CPA) e da raiz (CR) aos 70 dias após a inoculação de embriões zigóticos de coqueiro anão verde do Brasil de Jiqui cultivados in vitro em função de diferentes concentrações de sacarose e $\text{Fe}_2\text{SO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}^{(1)}$.

Sacarose (mg L^{-1})	GEZ	PN	CPA (cm)	CR (cm)
60	90,00a	83,33a	1,272a	0,670a
80	76,67a	33,33b	0,637b	0,946a
$\text{Fe}_2\text{SO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ (mg L^{-1})	GER	PN	CPA (cm)	CR (cm)
13,9	100,00A	40,00A	1,305A	0,840A
27,8	100,00A	70,00A	0,828A	1,560A
41,7	50,00B	65,00A	0,730A	0,440A

⁽¹⁾ Médias na coluna seguidas por letras iguais, minúsculas ou maiúsculas, não diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade.

Embora não tenha sido detectada diferença significativa entre os valores de comprimento da parte aérea e raiz nas concentrações de $\text{Fe}_2\text{SO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ estudadas, o aumento da concentração de $13,9 \text{ mg L}^{-1}$ para $27,8 \text{ mg L}^{-1}$ incrementou em mais de 45% o comprimento da raiz, observando-se um comportamento inverso em relação ao desenvolvimento da parte aérea (Tabela 1). As plântulas cultivadas em meio com $41,7 \text{ mg L}^{-1}$ de $\text{Fe}_2\text{SO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ apresentaram valores inferiores para todas as variáveis avaliadas. Durante a rizogênese, o crescimento acelerado das raízes pode retardar o desenvolvimento da parte aérea, porque o crescimento ativo do sistema radicular necessita de substâncias orgânicas translocadas da parte aérea para a base, comprometendo, assim, o desenvolvimento do caule e das folhas (Barceló et al., 2001). Estes resultados indicam uma maior influência do ferro na rizogênese na fase de estabelecimento in vitro.

Após a transferência das plântulas para o meio enraizador Y3 gelificado, suplementado com reguladores de crescimento e carvão ativado, observou-se um aumento no desenvolvimento radicular e da parte aérea aos 60 dias após a transferência. O número médio de raízes primárias, de raízes secundárias por plântula e o comprimento médio da raiz principal foram de 1,83; 11,89 e 4,9

cm, respectivamente. O número médio de folhas e comprimento médio da parte aérea foi de 2,26 e 13,34 cm, respectivamente. O carvão ativado, por adsorver substâncias inibitórias do meio ou produtos tóxicos liberados pelos explantes, promove o crescimento de embriões (Ribeiro et al., 2000). De acordo com Grattapaglia & Machado (1998), o carvão ativado em concentrações de 0,1 a 2% pode ser benéfico em alguns casos. Fisicamente, ele simula a condição de escuro, no qual as raízes normalmente se desenvolvem melhor pela redução da incidência de luz na zona de crescimento ativo do sistema radicular.

Na fase de aclimação, houve diferença significativa entre os substratos avaliados para a porcentagem de sobrevivência aos 60 dias e altura da parte aérea e número de folhas aos 120 dias após a transferência das plântulas de coqueiro anão verde do Brasil de Jiqui para condições de telado (Tabela 2). A areia lavada combinada com pó de casca de coco seco proporcionou maior sobrevivência (58,33%) de plântulas regeneradas em condições de telado quando comparado com a areia lavada (23%). Estes resultados foram bem superiores aos obtidos por Samosir et al. (1998), que alcançaram apenas 30% de sobrevivência de plântulas de coqueiro regeneradas *in vitro*. Em estudo comparativo de três protocolos de cultura de embriões de coqueiro, Capote et al. (2002) observaram uma baixa sobrevivência de plântulas em areia esterilizada variando de 5,25 a 31,4%.

Tabela 2. Médias das porcentagens de sobrevivência (% SOB) aos 60 dias e do número de folhas (NFOL) e comprimento da parte aérea (CPA) aos 30 e 120 dias de plântulas de coqueiro anão verde do Brasil de Jiqui regeneradas *in vitro*, após a transferência para substratos constituídos de areia lavada (AL) e areia lavada e pó de casca de coco seco (ALPC) sob telado.⁽¹⁾

Substrato	30 dias		120 dias		60 dias
	NFOL	CPA (cm)	NFOL	CPA (cm)	%SOB
AL	2,38a	15,38a	5,55b	36,00b	23,00b
ALPC (1:1)	2,50a	16,52a	6,33a	39,08a	58,33a

⁽¹⁾ Médias na coluna seguidas por letras iguais não diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade.

O desenvolvimento da parte aérea, nos 30 primeiros dias de aclimação, foi similar nos dois substratos avaliados, observando-se, em média, pequeno incremento do desenvolvimento da parte aérea, quando comparado com a etapa final da fase *in vitro*. A transição da plântula para a condição autotrófica requer adaptações de ordem fisiológica e morfológica que podem retardar a retomada do desenvolvimento celular.

A adição de pó de casca de coco seco à areia lavada, na proporção de 1:1 em volume, induziu às plantas maior crescimento da parte aérea e maior número de folhas aos 120 dias (Tabela 2). O pó da casca de coco seco conferiu ao substrato maior capacidade de retenção de água e, conseqüentemente, melhor sobrevivência e vigor das plantas. Na fase de aclimação, o estresse hídrico das plantas é geralmente o maior problema e a manutenção da umidade relativa alta desde a retirada das plantas do meio de cultura até a retomada do crescimento é um fator chave para a sua sobrevivência inicial (Grattapaglia & Machado, 1998). Resultados semelhantes foram obtidos por Souza Júnior et al. (2001) que observaram valores médios inferiores para variáveis de crescimento de plântulas de abacaxizeiro aclimatadas em substrato composto por areia. Mudanças de violeta africana (*Saintpaulia ionantha* Wendl) apresentaram bom crescimento, na aclimação *ex vitro*, nos substratos comerciais plantagro e bioplant, seguidos pelo pó de casca de coco seco e vermiculita (Terceiro Neto et al., 2004). A adição de pó da casca do coco maduro ou verde, na proporção de 20%, foi eficiente na substituição de solo hidromórfico em substrato para produção de mudas enxertadas de cajueiro anão precoce em tubetes (Correia et al., 2003).

Neste trabalho observou-se que em dois meses ocorreu a completa germinação dos embriões com a emissão da raiz primária, da parte aérea e a formação do haustório (Figura 2). Para incrementar a formação de um sistema radicular funcional, aos cinco meses as plântulas foram transferidas para o meio indutor na presença de carvão ativado, ANA e BAP, onde permaneceram por mais dois meses. A aclimação foi bem sucedida em substrato composto por areia lavada e pó de casca de coco seco esterilizados, 1:1 em volume.




Figura 2. Protocolos: A) cultura *in vitro* de embriões zigóticos e formação de plântulas de coqueiro-anão-verde do Brasil de Jiqui; B) aclimação *ex vitro* de plântulas sob telado.

Conclusões

1. A germinação de embriões zigóticos com formação de plântulas normais de coqueiro anão verde do Brasil de Jiqui é eficiente em meio Y3 líquido com 27,8 mg L⁻¹ de Fe₂SO₄·7H₂O e 60 g L⁻¹ de sacarose.
2. Maior incremento no desenvolvimento do sistema radicular e parte aérea das plântulas são obtidos em meio Y3 gelificado na presença de ANA, BAP e carvão ativado.
3. Substrato composto por areia lavada e pó de casca de coco esterilizados, na proporção de 1:1, em volume, é eficiente para aclimação de plântulas de coqueiro anão verde do Brasil de Jiqui.
4. É possível a conversão *in vitro* de embriões zigóticos de coqueiro anão verde do Brasil de Jiqui, isolados de frutos maduros, em mudas completas e normais.

5. O protocolo estabelecido pode ser utilizado para o intercâmbio e conservação de germoplasma de coqueiro anão verde do Brasil de Jiqui, podendo ser adaptado para outros genótipos de coqueiro.

Agradecimentos

Ao CNPq pelo apoio financeiro e pela concessão de bolsas de iniciação científica e ao Banco do Nordeste do Brasil S. A.e FAP-SE pelo apoio financeiro.

Referências

ANGELO, P.C. da S.; LEAL, M.L.; GOMES, K.K.P. Cultivo *in vitro* de embriões zigóticos provenientes de variedades brasileiras de coco (*Cocos nucifera* L.).

Revista Ciência Rural, v.8, n.1, p.66-72, 2003.

ASHBURNER, G.R., FAURE, M.G.; TOMLINSON, D.R.; THOMPSON, W.K. **A guide to the zygotic embryo culture of coconut palms (*Cocos nucifera* L.)**.

Canberra: ACIAR, 1995. 16p. (ACIAR Technical Report Series, 36)

ASSY-BAH, B.; DURAND-GASSELIN; T.; PANNETIER, C. Use of zygotic embryo culture to collect germplasm of coconut (*Cocos nucifera* L.). **Plant Genetic Resources Newsletter**, v.71, p.4-10, 1987.

ASSY-BAH, B., DURANT-GASSELIN, T., ENGELMANN, F., PANNETIER, C. Culture *in vitro* d'embryons zygotiques de cocotier (*Cocos nucifera* L.).

Oleagineux, v.44, n.11, p.516-523, 1989.

ASSY-BAH, B., ENGELMANN, F. Cryopreservation of mature embryos of coconut (*Cocos nucifera* L.) and subsequent regeneration of plantlets. **Cryoletters**, v.13, p.117-126. 1992.

ASSY-BAH, B., ENGELMANN, F. Medium-term conservation of mature embryos of coconut. **Plant, Cell and Organ Culture**, v.33, p.19-24. 1993.

BARCELÓ C.J.; NICOLÁS R.G.; SABATER, G.B.; SÁNCHEZ T.R. **Fisiología vegetal**. 6.ed. Madri: Pirámide, 2001. 566p.

CALAMAR, A.; DE KLERK, G.J. Effect of sucrose on adventitious root regeneration in apple. **Plant Cell, Tissue and Organ Culture**, v.70, n.2, p. 207-212, 2002.

CALDAS, L.S.; HARIDASAN, P.; FERREIRA, M.E. Meios nutritivos. In: TORRES, A.C.; CALDAS, L.S.; BUSO, J.A.(Ed.). **Cultura de tecidos e transformação genética de plantas**. Brasília: Embrapa-SPI/ Embrapa - CNPH, Parte II, p.87-132, 1998.

CAPOTE, M.; CUETO, J.R.; ZAMORA, V.; RÍOS, A.R.; CHACÓN, R. Increasing the efficiency of the embryo culture technology to promote germoplasm collecting in Cuba. In: ENGELMANN, F.; BATUGAL, P.A.; OLIVER, J. (Ed.). **Coconut embryo *in vitro* culture**: part II. Malaysia: IPGRI-APO, 2002. p.138-145, 2002.

CARRIJO, O.A.; LIZ, R. de S.; MAKISHIMA, N. Fibra da casca de coco verde como substrato agrícola. **Horticultura Brasileira**, v.20, n.4, p.533-535, 2002.

CORREIA, D.; ROSA, M. de F.; NORÕES, E.R. de V.; ARAÚJO, F.B. de. Uso do pó da casca de coco na formulação de substratos para formação de mudas enxertadas de cajueiro anão precoce. **Revista Brasileira de Fruticultura**, v.25, n.3, p.557-558, 2003.

DE GUZMAN E.V., DEL ROSARIO, A.G. The growth and development of Makapuno coconut *in vitro*. **Philippine Agriculturist**, v.48, p.82-94, 1964.

EEUWENS, C.J. Mineral requirements for growth and callus initiation of tissue explants excised from mature coconut palms (*Cocos nucifera*) and cultured *in vitro*. **Physiologia Plantarum**, v.36, p.23-28, 1976.

ENGELMANN, F.; BATUGAL, P.A. Background on the development and implementation of the coconut embryo *in vitro* culture project. In: ENGELMANN, F.; BATUGAL, P.A.; OLIVER, J. (Ed.). **Coconut embryo *in vitro* culture**: part II. Malaysia: IPGRI-APO, 2002. p.1-4, 2002.

GRATTAPAGLIA, D.; MACHADO, M.A. Micropropagação. In: TORRES, A.C.; CALDAS, L.S.; BUSO, J.A. (Ed.). **Cultura de tecidos e transformação genética de plantas**. Brasília: Embrapa-SPI/Embrapa-CNPH, 1998. p.183-260.

HU, C.Y.; FERREIRA, A.G. Cultura de embriões. In: TORRES, A.C.; CALDAS, L.S.; BUSO, J.A. (Ed.). **Cultura de tecidos e transformação genética de plantas**. Brasília: Embrapa-SPI/Embrapa-CNPq, 1998. v.1, p.371-393.

RIBEIRO, V.G.; SANÁBIO, D.; SOUZA, C.N. de; LOPES, P.S.N.; BOCARDO, M.R.; PASQUAL, M. Efeitos de ácido giberélico e carvão ativado no cultivo *in vitro* de *Citrus limonia* Osbeck x *Poncirus trifoliata* (L.) Raf. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, v.35, n.1, p. 27-30, jan. 2000.

PASQUAL, M.; HOFFMANN, A.; RAMOS, J.D. **Cultura de tecidos vegetais: tecnologia e aplicação**. Lavras: UFLA, 1997. 159p.

RILLO, E.P.; PALOMA, M.B.F.. *In vitro* culture of Makapuno coconut embryos. **Coconuts Today**, v.9, p.90-108, 1992.

SAMOSIR, Y.M.S., GODWIN, I.D.; ADKINS, S.W. An improved protocol for somatic embryogenesis in coconut (*Cocos nucifera* L.). **Acta Horticulturae**, v.461, p.467-474, 1998.

SANTANA, M.C.; TEIXEIRA, S.L. Influência do ácido naftalenoacético no crescimento e enraizamento *in vitro* de plântulas de coqueiro (*Cocos nucifera* L.). **Biologia Geral e Experimental**, v.5, n.1, p.30-33, 2004.

SILVA, A.T. da; PASQUAL, M.; ISHIDA, J.S.; ANTUNES, L.E.C. Aclimação de plantas provenientes da cultura *in vitro*. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, v.30, n.1, p.49-53, jan. 1995.

SILVA, V. dos S. **Regeneração *in vitro* de embriões de *Cocos nucifera* L.** 2002. 78p. Dissertação (Mestrado)-Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Piracicaba.

SIQUEIRA, E.R.; RIBEIRO, F.E.; ARAGÃO, W.M.; TUPINAMBÁ, E.A. Melhoria genética do coqueiro. In: FERREIRA, J.M.S; WARWICK, D.R.N.; SIQUEIRA, L.A. (Ed.). **Cultura do coqueiro no Brasil**. Aracaju: EMBRAPA-CPATC, 1998. p.73-95.

SOUZA JÚNIOR, E.E. de; BARBOZA, S.B.S.C.; SOUZA, L.A.C. Efeito de substratos e recipientes na aclimação de plântulas de abacaxizeiro [*Ananas*

comosus (L.) Merrill] cv. pérola. **Pesquisa Agropecuária Tropical**, v.31, n.2, p.147-151, 2001.

TALAVERA, C.; CONTRERAS, F.; ESPADAS, F.; FUENTES, G.; SANTAMARÍA, J.M. Cultivating in vitro coconut palms (*Cocos nucifera*) under glasshouse conditions with natural light, improves in vitro photosynthesis nursery survival and growth. **Plant Cell, Tissue and Organ Culture**, v.83, p.287–292, 2005.

TERCEIRO NETO, C.P.C.; HERNANDEZ, F.F.F.; BEZERRA, F.C.; SOUSA, R.F. de; CAVALCANTI, M.L.F. Efeito de diferentes substratos na aclimação “ex vitro” de mudas de violeta africana (*Saintpaulia ionantha* Wendl). **Revista de Biologia e Ciências da Terra**, v.4, n.2, p., 2004.

TRIQUES, K.; RIVAL, A.; BEULE, T.; PUARD, M.; ROY, J.; NATO, A.; LAVERGNE, D.; HAVAUX, M.; VERDEIL, J.L.; SANGARE, A.; HAMON, S. Photosynthetic ability of in vitro grown coconut (*Cocos nucifera* L.) plantlets derived from zygotic embryos. **Plant Science**, v.127, n.1, p.39-51, 1997.

UTINO, S.; CARNEIRO, I.F.; CHAVEZ, L.J. Crescimento e oxidação de explantes de bananeira-prata (*Musa* AAB) *in vitro*. I. concentrações de sais de ferro, cobre e zinco. **Revista Brasileira de Fruticultura**, v.23, n.2, p.225-229, 2001.

VERDEIL, J.L.; HOCHER, V.; TRIQUES, K.; LYAKURWA, R.; RIVAL, A.; DURAND-GASSELIN, T.; ENGELMANN, F.; HAMON, S. State of research on coconut embryo culture and acclimatization techniques in the IDEFOR (Côte d’Ivoire) and ORSTOM/CIRAD laboratories (France). In: ENGELMANN, F.; BATUGAL, P.A. (Ed.). **Coconut embryo *in vitro* culture**: Malaysia: IPGRI-APO, 1997. p.1-4, 1998.

Embrapa

Tabuleiros Costeiros

Ministério da
Agricultura, Pecuária
e Abastecimento

