

fol 4490

**COMISSÕES REGIONAIS DE AVALIAÇÃO E RECOMENDAÇÃO  
DE CULTIVARES DE SOJA - REGIÕES I E II  
(CRC-Soja I e CRC-Soja II)**

IMPRESSOS

**Quadros Estaduais  
de Cultivares de Soja  
Recomendadas  
para a Safra 1996/97**

Quadros estaduais de

1996

FL-4490



2486-1

**Embrapa**

**Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária  
Centro Nacional de Pesquisa de Soja**

**Londrina-PR  
Setembro de 1996**



fol  
4490

**EMBRAPA**



## INTRODUÇÃO

Através da Portaria Nº 178, de 21 de julho de 1981, o Ministério de Estado da Agricultura instituiu o Sistema Brasileiro de Avaliação e Recomendação de Cultivares. A EMBRAPA-Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária foi designada para coordenar o Sistema.

Oito culturas anuais, de maior expressão econômica para o País, entre as quais a soja, foram eleitas para integrar o Sistema. Comissões Regionais de Avaliação e Recomendação de Cultivares (CRCs) foram instituídas para a operacionalização do Sistema, constituindo colegiados representativos do Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária (SNPA), de Assistência Técnica e Extensão Rural (SIBRATER), dos produtores de sementes (ABRASEM) e do governo federal (SDR/MAARA).

A CRC-Soja I agrange os estados da Região Centro-Sul (RS, SC, PR, SP e MS), de maior tradição na produção e na pesquisa desta cultura, enquanto os demais estados das Regiões Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste estão afetos à CRC-Soja II.

A recomendação de uma nova cultivar, para um estado ou uma região/condição delimitada do mesmo, é proposta pela instituição que a desenvolveu ou introduziu, após referendada em Reunião Regional de Pesquisa de Soja. A aprovação, pela CRC-Soja, é homologada pelo MAARA e publicada no Diário Oficial da União, para que surtam efeitos legais como tecnologia recomendada.



## CULTIVARES DE SOJA RECOMENDADAS PARA O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – 1996/97

Classe	Grupo de Maturação			
	Precoce	Médio	Semitardio	Tardio
Preferencial	FT-2003 <sup>1,3,6</sup> FT-Saray <sup>2,3</sup> Ivorá <sup>1,3</sup> OCEPAR 14 <sup>1,4</sup>	BR-16 <sup>1,3</sup> EMBRAPA 66 <sup>1,3,6</sup> FT-2004 <sup>1,3,6</sup>	FT-Abyara <sup>1,3</sup>	–
Tolerada	CEP 16-Timbó <sup>1</sup> FT-Guaíra <sup>2</sup> IAS 5 <sup>2</sup>	BR-4 <sup>1,5</sup> Bragg CEP 12-Cambará Davis <sup>3</sup> IAS 4 IPAGRO 21 <sup>1</sup> RS 7-Jacuí <sup>3</sup>	BR-1 <sup>1,7</sup> CEP 20-Guajuvira <sup>1</sup> RS 6-Guassupi <sup>1,7</sup> RS 9-Itaúba	Cobb FEPAGRO-RS 10 <sup>1</sup> RS 5-Esmeralda <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Resistente, a campo, ao cancro da haste.

<sup>2</sup> Moderadamente resistente, a campo, ao cancro da haste.

<sup>3</sup> Resistente à podridão parda da haste.

<sup>4</sup> Moderadamente resistente à podridão parda da haste.

<sup>5</sup> BR-4 não é recomendada para solos hidromórficos ("terras de arroz").

<sup>6</sup> Recomendada em 1996.

<sup>7</sup> Será excluída de recomendação em 1997.

**Nota:** - As cultivares tardias não são recomendadas para as Regiões Fisiográficas Litoral Norte, Serra do Nordeste, Planalto Superior, Campanha, Serra do Sudeste e Litoral Sul.

- Foram excluídas de recomendação, em 1996, as cultivares BR-32, CEP 26-Umbú e EMBRAPA 19.

## CULTIVARES DE SOJA RECOMENDADAS PARA O ESTADO DE SANTA CATARINA – 1996/97

Classe	Grupo de Maturação			
	Precoce e Semiprecoce	Médio	Semitardio	Tardio
Preferencial	EMBRAPA 48 <sup>2,3</sup> FT-Guaíra <sup>2</sup> IAS 5 <sup>2</sup> OCEPAR 13 <sup>2</sup>	BR-4 <sup>1</sup> BR-16 <sup>1</sup> BR-36 BR-37 <sup>2</sup> CEP 12-Cambará EMBRAPA 4 (BR-4 RC) IPAGRO 21 <sup>1</sup> RS 7-Jacuí	FT-Abyara <sup>1</sup> RS 5-Esmeralda <sup>1</sup> RS 6-Guassupi <sup>1</sup>	FEPAGRO-RS 10 <sup>1,3</sup> FT-5 (Formosa) FT-10 (Princesa)
Tolerada	Bragg Davis <sup>4</sup> Paraná	IAS 4 <sup>4</sup>	BR-1 <sup>1,4</sup>	Cobb <sup>4</sup> Santa Rosa <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Resistente, a campo, ao cancro da haste.

<sup>2</sup> Moderadamente resistente, a campo, ao cancro da haste.

<sup>3</sup> Recomendada em 1996.

<sup>4</sup> Será excluída de recomendação em 1997.

**Nota:** Foram excluídas de recomendação, em 1996, as cultivares BR-6 (Nova Bragg), FT-2 e FT-8 (Araucária).

## CULTIVARES DE SOJA RECOMENDADAS PARA O ESTADO DO PARANÁ - 1996/97

Classe	Grupo de Maturação				
	Precoce (até 115 dias)	Semiprecoce (116 a 125 dias)	Médio (126 a 137 dias)	Semitardio (138 a 150 dias)	Tardio (> 150 dias)
P r e f e r e n c i a l	COODETEC 202 <sup>1,6</sup>	BR-16 <sup>1</sup>	BR-30 <sup>2</sup>	FT-5 (Formosa)	FT-Estrela <sup>1,5</sup>
	COODETEC 203 <sup>1,6</sup>	BR-36	BR-37 <sup>2</sup>		
	EMBRAPA 1 (IAS 5 RC)	COODETEC 201 <sup>1,6</sup>	BR-38 <sup>2</sup>		
	EMBRAPA 48 <sup>2,6</sup>	EMBRAPA 4 (BR-4 RC)	EMBRAPA 60 <sup>1,6</sup>		
	EMBRAPA 58 <sup>1,6</sup>	EMBRAPA 59 <sup>1,6</sup>	EMBRAPA 61 <sup>1,6</sup>		
	FT-7 (Tarobá) <sup>1</sup>	EMBRAPA 62 <sup>1,6</sup>	FT-10 (Princesa)		
	FT-Cometa <sup>1</sup>	FT-9 (Inaê) <sup>2</sup>	FT-2000 <sup>1</sup>		
	FT-Guaíra <sup>2</sup>	FT-Líder <sup>2</sup>	FT-Abyara <sup>1</sup>		
	FT-Saray <sup>2</sup>	Invicta <sup>2</sup>	FT-Iramaia <sup>2</sup>		
	OCEPAR 3-Primavera <sup>1</sup>	OCEPAR 13 <sup>2</sup>	KI-S 702 <sup>2</sup>		
	OCEPAR 14 <sup>1</sup>	OCEPAR 18 <sup>1</sup>	OCEPAR 16 <sup>1</sup>		
	OCEPAR 17 <sup>1</sup>				
	T o l e r a d a	Campos Gerais <sup>2,4</sup>	BR-4 <sup>1,3</sup>	FT-2 <sup>7</sup>	
FT-Manacá		FT-6 (Veneza) <sup>7</sup>	OCEPAR 9-SS1 <sup>7</sup>		
IAS 5 <sup>2,3</sup>		OCEPAR 4-Iguaçu			
OCEPAR 10		OCEPAR 6 <sup>1</sup>			
Paraná <sup>7</sup>		OCEPAR 8 <sup>7</sup>			

<sup>1</sup> Resistente, a campo, ao cancro da haste.

<sup>2</sup> Moderadamente resistente, a campo, ao cancro da haste.

<sup>3</sup> Suscetível à mancha "olho-de-rã".

<sup>4</sup> Recomendada apenas para a região centro-sul do estado.

<sup>5</sup> Recomendada para solos de baixa fertilidade ou para semeadura entre 15/12 e 15/01.

<sup>6</sup> Recomendada em 1996.

<sup>7</sup> Será excluída de recomendação em 1997.

**Nota:** Foram excluídas de recomendação, em 1996, as cultivares Bragg, BR-6 (Nova Bragg), BR-13 (Maravilha), BR-14 (Modelo), BR-23, BR-24, BR-29 (Londrina), Bossier, Davis, FT-3, FT-4, IAC-4, OCEPAR 2-Iapó, OCEPAR 5-Piquiri e Paranaoiana.



## CULTIVARES DE SOJA RECOMENDADAS PARA O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - 1996/97

Grupo Precoce / Médio				Grupo Semitardio				Grupo Tardio			
Cultivar	Região			Cultivar	Região			Cultivar	Região		
	CN	SO	S		CN	SO	S		CN	SO	S
Bossier <sup>3,6</sup>	T	T	T	CAC-1 <sup>1</sup>	P	P	P	BR-9 (Savana) <sup>1</sup>	P	P	T
BR-6 (Nova Bragg) <sup>4</sup>	-	-	P	Dourados <sup>1</sup>	T	T	P	Doko <sup>1,3,6</sup>	T	T	T
BR-16 <sup>1</sup>	-	T	T	EMBRAPA 65 (Itapoty) <sup>1,5</sup>	-	-	P	EMBRAPA 2 <sup>6</sup>	-	-	T
BR-37 <sup>2</sup>	-	-	P	FT-11 (Alvorada) <sup>6</sup>	T	T	T	EMBRAPA 3 <sup>6</sup>	-	-	T
EMBRAPA 4 (BR-4 RC)	-	T	P	FT-14 (Piracema) <sup>6</sup>	T	T	T	EMBRAPA 20 (Doko RC) <sup>1</sup>	P	P	T
EMBRAPA 25 <sup>6</sup>	-	-	T	FT-18 (Xavante)	T	T	P	EMGOPA-313 <sup>2</sup>	P	T	-
EMBRAPA 26 <sup>6</sup>	-	-	T	FT-19 (Macacha) <sup>6</sup>	T	T	T	FT-Cristalina	T	T	T
EMBRAPA 64 (Ponta Porã) <sup>1,5</sup>	-	-	P	FT-2001 <sup>2</sup>	P	P	P	FT-Seriema	T	T	T
FT-5 (Formosa)	-	T	P	FT-45263 <sup>6</sup>	T	T	T	MS/BR-34 (EMPAER-10)	T	T	T
FT-10 (Princesa)	-	T	P	FT-Estrela <sup>1</sup>	P	P	P	UFV-10 (Uberaba) <sup>6</sup>	T	T	T
FT-20 (Jaú) <sup>2</sup>	-	T	P	FT-Maracaju	-	T	P				
FT-Abyara <sup>1,4</sup>	-	T	P	IAC-8 <sup>3</sup>	T	T	T				
FT-Jatobá <sup>2</sup>	-	T	P	IAC-8-2 <sup>1,5</sup>	T	-	-				
FT-Lider <sup>2</sup>	-	T	P	MS/BR-17 (São Gabriel) <sup>6</sup>	T	T	T				
FT-Manacá <sup>4,6</sup>	-	T	T	MS/BR-39 (Chapadão) <sup>6</sup>	T	T	-				
IAC-12 <sup>1,3,6</sup>	T	-	T	MT/BR-45 (Paiguás) <sup>1</sup>	P	T	T				
IAS 5 <sup>2,3</sup>	-	T	T	Santa Rosa <sup>1</sup>	P	P	P				
MS/BR-19 (Pequi)	P	P	P								
MS/BR-20 (Ipê) <sup>6</sup>	T	T	T								
MS/BR-21 (Buriti) <sup>6</sup>	T	T	T								
OCEPAR 4-Iguaçu	-	-	P								
OCEPAR 7-Brilhante <sup>2</sup>	-	-	P								
OCEPAR 12 <sup>6</sup>	-	-	T								
UFV/ITM-1	P	P	P								

<sup>1</sup> Resistente, a campo, ao cancro da haste.

<sup>2</sup> Moderadamente resistente, a campo, ao cancro da haste.

<sup>3</sup> Suscetível à mancha "olho-de-rã".

<sup>4</sup> Apresenta limitação de altura de planta, devendo ser semeada preferencialmente em novembro, em solos de cultura ou solos corrigidos, com boa fertilidade.

<sup>5</sup> Recomendada em 1996.

<sup>6</sup> Será excluída de recomendação em 1997.

**Notas:** - Foram excluídas de recomendação, em 1996, as cultivares Bragg, FT-Morena, FT 25500-Cristal e CAC/BR-43.

- Classes de recomendação: P = preferencial; T = tolerada; - = não recomendada.

- Regiões: CN= centro-norte; SO= sudoeste; S= sul.

## CULTIVARES DE SOJA RECOMENDADAS PARA O ESTADO DO MATO GROSSO - 1996/97

Grupo Precoce/Semiprecoce		Grupo Médio		Grupo Semitardio/Tardio	
Cultivar	Classe	Cultivar	Classe	Cultivar	Classe
BR-40 (Itiquira) <sup>2,3</sup>	T	BR/IAC-21 <sup>1,10</sup>	P	BR-15 (Mato Grosso) <sup>11</sup>	T
FT-109 <sup>1,10</sup>	P	CAC-1 <sup>1</sup>	P	BR/EMGOPA-314	
FT-489	T	Dois Marcos 247 <sup>1,10</sup>	P	(Garça Branca) <sup>1</sup>	P
FT-Estrela <sup>1,3,7</sup>	P	Dois Marcos-Vitória <sup>1,10</sup>	P	CAC/BR-43 <sup>11</sup>	T
MG/BR-46 (Conquista) <sup>1,9</sup>	P	FT-11 (Alvorada) <sup>8,11</sup>	T	Dois Marcos 339 <sup>1,10</sup>	P
MT/BR-49 (Pioneira) <sup>1,9,10</sup>	P	FT-101 <sup>1,6</sup>	P	EMBRAPA 20 (Doko RC) <sup>1,4</sup>	P
		IAC-8 <sup>5,11</sup>	T	EMGOPA-305 (Caraíba) <sup>4,11</sup>	T
		MT/BR-45 (Paiaguás) <sup>1</sup>	P	EMGOPA-306 (Chapada) <sup>3,5,12</sup>	T
		MT/BR-50 (Parecis) <sup>1,10</sup>	P	EMGOPA-308 <sup>3,11</sup>	T
		MT/BR-51 (Xingu) <sup>1,10</sup>	P	EMGOPA-313 <sup>2,6</sup>	P
				FT-104 <sup>1,10</sup>	P
				FT-106 <sup>1</sup>	P
				FT-107 <sup>1</sup>	P
				FT-108 <sup>1,9</sup>	P
				FT-Canarana <sup>11</sup>	T
				FT-Cristalina <sup>12</sup>	T
				FT-Seriema <sup>11</sup>	T
				MT/BR-47 (Canário) <sup>1</sup>	P
				MT/BR-52 (Curidó) <sup>1,10</sup>	P
				MT/BR-53 (Tucano) <sup>1,10</sup>	P
				Nova IAC-7 <sup>1,11</sup>	T
				UFV-10 (Uberaba) <sup>11</sup>	T

<sup>1</sup> Resistente, a campo, ao cancro da haste.

<sup>2</sup> Moderadamente resistente, a campo, ao cancro da haste.

<sup>3</sup> Exigente em fertilidade do solo.

<sup>4</sup> Recomendada também para cerrado de 1º ano de soja.

<sup>5</sup> Suscetível a quebramento em semeaduras tardias (dezembro), causando redução na produtividade.

<sup>6</sup> Apropriada para término de semeadura (dezembro), devido ao menor decréscimo de produtividade.

<sup>7</sup> 'FT-Estrela' é recomendada apenas para a região sul do estado.

<sup>8</sup> Na região norte do estado, a recomendação da cultivar FT-11 (Alvorada) é restrita à região do Vale do Araguaia, para semeadura na 1ª quinzena de dezembro e em população de 600.000 plantas/ha.

<sup>9</sup> Tolerante solos de baixa fertilidade.

<sup>10</sup> Recomendada em 1996.

<sup>11</sup> Será excluída de recomendação em 1997.

<sup>12</sup> Será excluída de recomendação em 1998.

Notas: - Regiões: sul - latitude > 15° S; norte - latitude < 15° S.  
- Classes de recomendação: P= preferencial; T= tolerada.



**CULTIVARES DE SOJA RECOMENDADAS PARA O ESTADO DE GOIÁS E  
O DISTRITO FEDERAL - 1996/97**

Grupo de Maturação e Cultivar	Cerrado parcialmente corrigido	Cerrado corrigido		Solo naturalmente fértil	Entressafra (Inverno)
		1º e 2º ano de soja	3º ano ou mais de soja		
<b>Região Sul de Goiás (&gt; 15°S) e Distrito Federal</b>					
<b>Precoce (até 125 dias)</b>					
BR-40 (Itiquira) <sup>2</sup>	-	T	P	P	-
Dois Marcos-Rainha <sup>1</sup>	-	-	P	P	-
EMGOPA-302 <sup>1,4</sup>	-	-	P	P	-
EMGOPA-304 (Campeira) <sup>2,4</sup>	-	T	P	P	-
EMGOPA-309 (Goiana) <sup>2</sup>	-	T	P	P	-
EMGOPA-316 (Rio Verde) <sup>1,5</sup>	-	-	P	P	-
FT-2000 <sup>1,5</sup>	-	-	P	P	-
FT-Estrela <sup>1,4</sup>	-	-	P	P	-
FT-Eureka <sup>4</sup>	-	-	P	P	-
MG/BR-48 (Garimpo) <sup>1,5</sup>	-	-	P	P	-
<b>Médio (126 a 140 dias)</b>					
CAC-1 <sup>1,6</sup>	-	-	T	P	-
Dois Marcos-247 <sup>1,5</sup>	-	T	P	P	-
Dois Marcos-Soberana <sup>1</sup>	P	P	T	T	-
EMGOPA-305 (Caraíba)	T	T	T	T	-
EMGOPA-315 (Rio Vermelho) <sup>1,5</sup>	-	T	P	P	-
FT-11 (Alvorada) <sup>7</sup>	-	-	T	T	-
FT-100 <sup>4,7</sup>	-	-	T	T	-
FT-101 <sup>1</sup>	-	T	P	P	-
FT-102 <sup>1,4</sup>	-	-	P	P	-
FT-109 <sup>1,5</sup>	T	P	P	P	-
FT-Cristalina <sup>7</sup>	-	T	T	T	-
FT-Seriema <sup>7</sup>	-	-	T	T	-
IAC-8 <sup>3,7</sup>	T	T	-	-	T
Numbaíra <sup>2</sup>	-	-	P	P	P
UFV-9 (Sucupira) <sup>1</sup>	P	T	-	-	-
<b>Tardio (&gt; de 140 dias)</b>					
BR-9 (Savana) <sup>1</sup>	P	P	P	P	P
BR/EMGOPA-314 (Garça Branca) <sup>1,5</sup>	-	T	P	P	-
Dois Marcos-339 <sup>1</sup>	T	P	P	P	-
Dois Marcos-Nobre <sup>1</sup>	P	P	T	T	-
Dois Marcos-Vitória <sup>1</sup>	-	-	P	P	-
EMBRAPA 20 (Doko RC) <sup>1</sup>	P	P	T	-	P
EMGOPA-306 (Chapada) <sup>7</sup>	-	T	T	T	T
EMGOPA-308 (Serra Dourada)	-	T	T	T	T
EMGOPA-313 (Anhanguera) <sup>2</sup>	T	P	P	-	-
FT-104 <sup>1</sup>	-	P	P	P	-
FT-106 <sup>1,5</sup>	T	P	P	P	-
FT-107 <sup>1,5</sup>	T	P	P	P	-

Continua...

## CULTIVARES DE SOJA RECOMENDADAS PARA O ESTADO DE GOIÁS E O DISTRITO FEDERAL – 1996/97

Grupo de Maturação e Cultivar	Cerrado parcialmente corrigido	Cerrado corrigido		Solo naturalmente fértil	Entressafra (Inverno)
		1º e 2º ano de soja	3º ano ou mais de soja		
...Continuação					
Região Norte de Goiás (< 15°S)					
BR-10 (Teresina) <sup>2,3,7</sup>	–	T	T	T	–
BR-27 (Cariri) <sup>3,7</sup>	–	T	T	T	–
BR/EMGOPA-314 (Garça Branca) <sup>1,5</sup>	–	T	T	T	–
Doko <sup>1,3</sup>	–	T	T	T	T
EMBRAPA 20 (Doko RC) <sup>1</sup>	–	P	P	P	P
EMGOPA-301 <sup>2,3,7</sup>	–	–	–	–	T
EMGOPA-303 <sup>3,7</sup>	T	T	T	T	T
EMGOPA-305 (Caraíba) <sup>7</sup>	T	T	T	T	T
EMGOPA-306 (Chapada)	–	–	–	–	T
EMGOPA-313 (Anhanguera) <sup>1,5</sup>	–	T	T	T	–
FT-101 <sup>1,5</sup>	–	T	T	T	–
FT-106 <sup>1,5</sup>	–	T	T	T	–
GO/BR-25 (Aruanã) <sup>7</sup>	T	T	T	T	T
IAC-8 <sup>3</sup>	T	T	T	–	T
Tropical <sup>3,7</sup>	T	T	–	–	T

<sup>1</sup> Resistente, a campo, ao cancro da haste.

<sup>2</sup> Moderadamente resistente, a campo, ao cancro da haste.

<sup>3</sup> Suscetível à mancha "olho-de-rã".

<sup>4</sup> Quando semeada cedo, propicia a sucessão de cultivares.

<sup>5</sup> Recomendada em 1996.

<sup>6</sup> Recomendada em 1995 em caráter emergencial, devendo permanecer em ensaios de competição por mais dois anos.

<sup>7</sup> Será excluída da recomendação em 1997.

**Notas:** - São recomendadas especificamente para os municípios de Quirinópolis, Gouvelândia e Acreúna, para cultivo em solos férteis, as cultivares IAS 5 e EMBRAPA 1 (IAS 5 RC), em população de 600 a 700 mil plantas/ha, e as cultivares BR-4 e EMBRAPA 4 (BR-4 RC), em população de 500 a 600 mil plantas/ha.

- Foram excluídas de recomendação, em 1996, as cultivares BR-15 (Mato Grosso), EMGOPA-307 (Caiapó), FT 25500-Cristal, FT-Canarana, Nova IAC-7 e UFV-5.

- Classes de recomendação: P = preferencial; T = tolerada; – = não recomendada.

## CULTIVARES DE SOJA RECOMENDADAS PARA O ESTADO DE MINAS GERAIS – 1996/97

Classe	Grupo de Maturação			
	Semiprecoce (101 a 110 dias)	Médio (111 a 125 dias)	Semitardio (126 a 145 dias)	Tardio (> 145 dias)
P r e f	BR-16 <sup>1,3</sup>	FT-Estrela <sup>1</sup>	BR/IAC-21 <sup>1,4</sup>	BR-9 (Savana) <sup>1</sup>
	FT-2000 <sup>1,4</sup>	MG/BR-48 (Garimpo RCH) <sup>1,4</sup>	CAC-1 <sup>1</sup>	EMBRAPA 20 (Doko RC) <sup>1</sup>
	FT-Líder <sup>2,4</sup>	UFV-16 (Capinópolis) <sup>1</sup>	CS-301 <sup>1,4</sup>	FT-104 <sup>1</sup>
	OCEPAR 3-Primavera <sup>1</sup>		FT-102 <sup>1,4</sup>	FT-107 <sup>1,4</sup>
	OCEPAR 19-Cotia <sup>1</sup>		FT-109 <sup>1,4</sup>	UFV-18 (Patos de Minas) <sup>1</sup>
			MG/BR-46 (Conquista) <sup>1</sup>	
		MT/BR-45 (Paiaguás) <sup>1</sup>		
		UFV-17 (Minas Gerais) <sup>1</sup>		
T o l	FT-Eureka	MG/BR-22 (Garimpo)	FT-11 (Alvorada)	FT-Cristalina
		OCEPAR 15-Paracatu	FT-100	FT-Seriema
			IAC-8	UFV-10 (Uberaba)
			MG/BR-42 (Kage)	

<sup>1</sup> Resistente, a campo, ao cancro da haste.

<sup>2</sup> Moderadamente resistente, a campo, ao cancro da haste.

<sup>3</sup> Recomendada para cultivo ao sul do paralelo 18° S.

<sup>4</sup> Recomendada em 1996.

Nota: Foram excluídas de recomendação, em 1996, as cultivares BR-15 (Mato Grosso), CAC/BR-43, Paranaíba, Santa Rosa, UFV-1, UFV-5 e UFV-15 (Uberlândia).  
Classe de recomendação: Pref. = preferencial; Tol. = tolerada

-12-

## CULTIVARES DE SOJA RECOMENDADAS PARA O ESTADO DO TOCANTINS - 1996/97

Grupo de Maturação e Cultivar	Cerrado parcialmente corrigido	Cerrado corrigido		Entressafra
		1º e 2º ano de soja	3º ano ou mais de soja	
<b>Precoce (até 120 dias)</b>				
BR/IAC-21 <sup>1,4</sup>	T	P	P	T
EMGOPA-313 (Anhanguera) <sup>2,4</sup>	T	P	P	-
<b>Médio (121 a 135 dias)</b>				
BR/EMGOPA-314 (Garça Branca) <sup>1,4</sup>	T	P	P	T
EMBRAPA 20 (Doko RC) <sup>1</sup>	-	P	P	P
EMBRAPA 31 (Mina) <sup>4</sup>	-	T	T	-
EMBRAPA 33 (Cariri RC)	-	T	T	T
EMGOPA-303 <sup>3</sup>	T	T	T	T
EMGOPA-305 (Caraíba)	T	T	T	T
EMGOPA 308 (Serra Dourada)	T	T	T	T
<b>Tardio (&gt; 135 dias)</b>				
EMBRAPA 34 (Teresina RC)	T	T	T	-
GO/BR-25 (Aruanã)	T	T	T	T

<sup>1</sup> Resistente, a campo, ao cancro da haste.

<sup>2</sup> Moderadamente resistente, a campo, ao cancro da haste.

<sup>3</sup> Suscetível à mancha "olho-de-rã".

<sup>4</sup> Recomendada em 1996.

**Nota:** - Foram excluídas de recomendação, em 1996, as cultivares EMGOPA-301 e IAC-8.

- Classes de recomendação: P = preferencial; T = tolerada; - = não recomendada.

## CULTIVARES DE SOJA RECOMENDADAS PARA O ESTADO DE RONDÔNIA - 1996/97.

Classe	Grupo de Maturação		
	Precoce (até 110 dias)	Médio (111 a 125 dias)	Tardio (> 125 dias)
Preferencial	-	BR/EMGOPA-314 (Garça Branca) <sup>1,6</sup> EMBRAPA 20 (Doko RC) <sup>1,5</sup> EMGOPA-313 (Anhanguera) <sup>2,6</sup> FT-Cristalina	-
Tolerada	IAC-8 <sup>3,4</sup>	BR-15 (Mato Grosso) <sup>4</sup> Doko <sup>1,3,5,7</sup> Tropical <sup>3,5,7</sup>	BR-10 (Teresina) <sup>3,5,7</sup> BR-11 (Carajás) <sup>3,5,7</sup> Timbira <sup>3,7</sup>

<sup>1</sup> Resistente, a campo, ao cancro da haste.

<sup>2</sup> Moderadamente resistente, a campo, ao cancro da haste.

<sup>3</sup> Suscetível à mancha "olho-de-rã", não devendo ser cultivada em sucessão a tais cultivares.

<sup>4</sup> Apresenta limitação de altura de planta, devendo ser semeada na segunda quinzena de dezembro, em áreas férteis ou de cerrado corrigido e com um ou mais anos de cultivo.

<sup>5</sup> Recomendada também para cerrados de 1º ano de soja (parcialmente corrigidos).

<sup>6</sup> Recomendada em 1996.

<sup>7</sup> Será excluída de recomendação em 1997.



## CULTIVARES DE SOJA RECOMENDADAS PARA O ESTADO DA BAHIA – 1996/97.

Classe	Grupo de Maturação		
	Médio (até 120 dias)	Semitardio (121 a 130 dias)	Tardio (> 130 dias)
Preferencial	CAC-1 <sup>1</sup> CS-301 <sup>1,4</sup> FT-101 <sup>1,4</sup> FT-102 <sup>1</sup> FT-109 <sup>1,4</sup> FT-Bahia MG/BR-46 (Conquista) <sup>1,4</sup> MT/BR-50 (Parecis) <sup>1,4</sup>	BR/EMGOPA-314 (Garça Branca) <sup>1,4</sup> EMBRAPA 20 (Doko RC) <sup>1</sup> FT-103 <sup>1</sup> FT-104 <sup>1</sup>	FT-107 <sup>1,4</sup>
Tolerada	FT-Estrela <sup>1,3</sup> IAC-8 <sup>2,5</sup>	FT-Cristalina <sup>5</sup> Nova IAC-7 <sup>1</sup>	BR-27 (Cariri) <sup>2,5</sup> Paranagoiana <sup>5</sup>

<sup>1</sup> Resistente, a campo, ao cancro da haste.

<sup>2</sup> Suscetível à mancha "olho-de-rã"

<sup>3</sup> Recomendada para sementeira entre 22/11 e 15/12, em áreas irrigadas e solos férteis.

<sup>4</sup> Recomendada em 1996.

<sup>5</sup> Será excluída de recomendação em 1997.

## CULTIVARES DE SOJA RECOMENDADAS PARA O ESTADO DO MARANHÃO – 1996/97.

Classe	Grupo de Maturação		
	Precoce (até 110 dias)	Médio (111 a 125 dias)	Tardio (> 125 dias)
Preferencial	BR-9 (Savana) <sup>1</sup> BR-35 (Rio Balsas) BR/EMGOPA-312 (Potiguar) EMBRAPA 20 (Doko RC) <sup>1</sup> EMGOPA-308 (Serra Dourada) FT-Cristalina	EMBRAPA 30 (Vale do Rio Doce) EMBRAPA 31 (Mina) EMBRAPA 32 (Itaqui) EMBRAPA 33 (Cariri RC) EMBRAPA 63 (Mirador) <sup>1,3</sup>	EMBRAPA 9 (Bays) EMBRAPA 34 (Teresina RC)
Tolerada	FT-Canarana	-	BR-28 (Seridó) <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Resistente, a campo, ao cancro da haste.

<sup>2</sup> Suscetível à mancha "olho-de-rã".

<sup>3</sup> Recomendada em 1996 - altamente resistente ao cancro da haste.

Notas: -As cultivares tardias são recomendadas para regiões onde o período de chuvas seja de, no mínimo, 130 dias.

- Foi excluída de recomendação, em 1996, a cultivar Paranagoiana.

## CULTIVARES DE SOJA RECOMENDADAS PARA O ESTADO DO PIAUÍ - 1996/97.

Classe	Grupo de Maturação		
	Precoce (até 110 dias)	Médio (111 a 125 dias)	Tardio ( > 125 dias)
Preferencial	BR-9 (Savana) <sup>1</sup> BR-35 (Rio Balsas) BR/EMGOPA-312 (Potiguar) FT-Cristalina	EMBRAPA 30 (Vale do Rio Doce) EMBRAPA 31 (Mina) EMBRAPA 33 (Cariri RC) EMBRAPA 63 (Mirador) <sup>1,3</sup>	EMBRAPA 9 (Bays) EMBRAPA 34 (Teresina RC)
Tolerada	-	-	BR-28 (Seridó) <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Resistente, a campo, ao cancro da haste.

<sup>2</sup> Suscetível à mancha "olho-de-rã", não devendo ser cultivada em anos sucessivos, na mesma área.

<sup>3</sup> Recomendada em 1996 - altamente resistente ao cancro da haste.

**Notas:** - As cultivares tardias são recomendadas para regiões onde o período de chuvas seja de, no mínimo, 130 dias.

- Foram excluídas de recomendação, em 1996, as cultivares BR-10 (Teresina), BR-27 (Cariri) e Tropical.

CULTIVARES DE SOJA RECOMENDADAS PARA AS REGIÕES NORTE E NORDESTE DO BRASIL <sup>1</sup> - 1996/97

Classe	Grupo de Maturação	
	Médio (até 125 dias)	Tardio ( > 125 dias)
Preferencial	EMBRAPA 33 (Cariri RC)	EMBRAPA 34 (Teresina RC) Timbira <sup>2</sup>
Tolerada	BR-27 (Cariri) <sup>2</sup> Tropical <sup>2</sup>	BR-28 (Seridó) <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Exceção-se os Estados da Bahia, do Piauí, do Maranhão e de Rondônia, que possuem recomendações específicas.

<sup>2</sup> Suscetível à doença mancha "olho-de-rã", não devendo ser cultivada em sucessão a cultivares suscetíveis.

**Nota:** As cultivares tardias são recomendadas para regiões onde o período de chuvas seja de, no mínimo, 130 dias.



**COMISSÕES REGIONAIS DE AVALIAÇÃO E RECOMENDAÇÃO  
DE CULTIVARES DE SOJA - REGIÕES I E II  
(CRC-Soja I e CRC-Soja II)**

— MEMBROS —

<b>INSTITUIÇÃO</b>	<b>MEMBRO</b>	<b>CRC-SOJA I</b>	<b>CRC-SOJA II</b>
EMBRAPA	Titular	Milton Kaster	Milton Kaster
	Suplente	Orival Gastão Menosso	José Francisco F. de Toledo
PESQUISA	Titular	Nilso Luiz Zuffo	Tuneo Sedyama
	Suplente	—	Gilson J. Campelo
SIBRATER	Titular	Antoninho Maurina	Hortêncio Paro
	Suplente	—	—
ABRASEM	Titular	Antônio E. Loureiro da Silva	Gilberto Flávio Goellner
	Suplente	Gualter B. Gonçalves	—
MAARA/SDR	Titular	Celso Rosal	Celso Rosal
	Suplente	Agwagner Dutra Alarcão	Agwagner Dutra Alarcão



IMPRESSO PELO SETOR DE SERVIÇOS GRÁFICOS DO  
CENTRO NACIONAL DE PESQUISA DE SOJA - CNPSo  
Rod. Carlos João Strass (Londrina/ Warta) Acesso Orlando Amaral  
Fone: (043) 371-6000- Fax: (043) 371-6100- Telex 432208 - Cx. Postal 231  
86.001-970 - Londrina, PR.