

**Comissões Regionais de Avaliação e Recomendação  
de Cultivares de Soja - Regiões I e II  
(CRC-Soja I e CRC-soja II)**

**Quadros Estaduais de  
Cultivares  
de Soja Recomendadas para  
a Safra 1997/98**

**Embrapa**


# Introdução

Através da Portaria nº 178, de 21 de julho de 1981, o Ministério de Estado da Agricultura instituiu o Sistema Brasileiro de Avaliação e Recomendação de Cultivares. A Embrapa - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária foi designada para coordenar o Sistema.

Oito culturas anuais, de maior expressão econômica para o País, entre as quais a soja, foram eleitas para integrar o Sistema. Comissões Regionais de Avaliação e Recomendação de Cultivares (CRCs) foram instituídas para a operacionalização do Sistema, constituindo colegiados representativos do Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária (SNPA), de Assistência Técnica e Extensão Rural (SIBRATER), dos produtores de sementes (ABRASEM) e do governo federal (SDR/MA).

A CRC-Soja I abrange os estados da Região Centro-Sul (RS, SC, PR, SP e MS), de maior tradição na produção e na pesquisa desta cultura, enquanto os demais estados das Regiões Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste estão afetos à CRC-Soja II.

A recomendação de uma nova cultivar, para um estado ou uma região/condição delimitada do mesmo, é proposta pela instituição que a desenvolveu ou introduziu, após referendada em Reunião Regional de Pesquisa de Soja. A aprovação, pela CRC-Soja, é homologada pelo MA e publicada no Diário Oficial da União, para que surtam efeitos legais como tecnologia recomendada.



CULTIVARES DE SOJA RECOMENDADAS PARA O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
- SAFRA 1997/98 -

Grupo de Maturação			
Precoce	Médio	Semitardio	Tardio
CEP 16 – Timbó <sup>1</sup>	BR-4 <sup>5</sup>	CEP 20 – Guajuvira <sup>1</sup>	Cobb
Embrapa 137 <sup>1,3,6</sup>	BR-16 <sup>2,3</sup>	FT-Abyara <sup>1,3</sup>	FEPAGRO - RS 10 <sup>1</sup>
Embrapa 138 <sup>1,3,6</sup>	Bragg	RS 9 - Itaúba	RS 5 - Esmeralda <sup>1</sup>
FT-2003 <sup>1,3</sup>	CEP 12 - Cambará		
FT-Guaira <sup>2</sup>	COODETEC 201 <sup>1,6</sup>		
FT-Saray <sup>2,3</sup>	Davis <sup>3</sup>		
IAS 5 <sup>2</sup>	Embrapa 59 <sup>1,6</sup>		
Ivorá <sup>1,3</sup>	Embrapa 66 <sup>1,3</sup>		
OCEPAR 14 <sup>1,4</sup>	FT-2004 <sup>1,3</sup>		
	FT-2011 <sup>1,6</sup>		
	IAS 4		
	IPAGRO 21 <sup>1</sup>		
	RS 7 - Jacuí <sup>3</sup>		

<sup>1</sup> Resistente, a campo, ao cancro da haste.

<sup>2</sup> Moderadamente resistente, a campo, ao cancro da haste.

<sup>3</sup> Resistente à podridão parda da haste.

<sup>4</sup> Moderadamente resistente à podridão parda da haste.

<sup>5</sup> 'BR-4' não é recomendada para solos hidromórficos ("terras de arroz").

<sup>6</sup> Recomendada em 1997.

**Notas:** - As cultivares tardias não são recomendadas para as regiões fisiográficas Litoral Norte, Serra do Nordeste, Planalto Superior, Campanha, Serra do Sudeste e Litoral Sul.

- Foram excluídas de recomendação, em 1997, as cultivares BR-1 e RS 6 - Guassupi.

CULTIVARES DE SOJA RECOMENDADAS PARA O ESTADO DE SANTA CATARINA – SAFRA 1997/98

Grupo de Maturação			
Precoce / Semiprecoce	Médio	Semitardio	Tardio
COODETEC 203 <sup>1,3</sup>	BR-4	Embrapa 60 <sup>1,3</sup>	FEPAGRO - RS 10 <sup>1</sup>
Embrapa 48 <sup>2</sup>	BR-16 <sup>2</sup>	Embrapa 61 <sup>1,3</sup>	FT-5 (Fomosa)
Embrapa 58 <sup>1,3</sup>	BR-36	FT-Abyara <sup>1</sup>	FT-10 (Princesa)
FT-Guaira <sup>2</sup>	BR-37 <sup>2</sup>		Santa Rosa <sup>1</sup>
IAS 5 <sup>2</sup>	CEP 12 – Cambará		
OCEPAR 13 <sup>2</sup>	Embrapa 4 (BR-4 RC)		
Paraná	Embrapa 59 <sup>1,3</sup>		
	Embrapa 62 <sup>1,3</sup>		
	FT-2000 <sup>1,3</sup>		

<sup>1</sup> Resistente, a campo, ao cancro da haste.

<sup>2</sup> Moderadamente resistente, a campo, ao cancro da haste.

<sup>3</sup> Recomendada em 1997.

**Nota:** - Foram excluídas de recomendação, em 1997, as cultivares BR-1, Bragg, Cobb, Davis, IAS 4, IPAGRO 21, RS 5-Esmeralda, RS 6-Guassupi e RS 7-Jacuí.

CULTIVARES DE SOJA RECOMENDADAS PARA O ESTADO DO PARANÁ  
- SAFRA 1997/98 -

Classe	Grupo de Maturação				
	Precoce (até 115 dias)	Semiprecoce (116 a 125 dias)	Médio (126 a 137 dias)	Semitardio (138 a 150 dias)	Tardio (> 150 dias)
Preferencial	COODETEC 202 <sup>1</sup>	BR-16 <sup>2</sup>	BR-30 <sup>2</sup>	FT-5 (Formosa)	FT-Estrela <sup>1,5</sup>
	COODETEC 203 <sup>1</sup>	BR-36	BR-37 <sup>2</sup>		
	Embrapa 1 (IAS 5 RC)	COODETEC 201 <sup>1</sup>	BR-38 <sup>2</sup>		
	Embrapa 48 <sup>2</sup>	Embrapa 4 (BR-4 RC)	Embrapa 60 <sup>1</sup>		
	Embrapa 58 <sup>1</sup>	Embrapa 59 <sup>1</sup>	Embrapa 61 <sup>1</sup>		
	Embrapa 132 <sup>1,6</sup>	Embrapa 133 <sup>1,6</sup>	Embrapa 62 <sup>1</sup>		
	FT-7 (Tarobá) <sup>1</sup>	FT-9 (Inaê) <sup>2</sup>	Embrapa 134 <sup>1,6</sup>		
	FT-2005 <sup>2,6</sup>	FT-2002 <sup>1,6</sup>	Embrapa 135 <sup>1,6</sup>		
	FT-2008 <sup>1,6</sup>	FT-Lider <sup>2</sup>	Embrapa 136 <sup>1,6</sup>		
	FT-2009 <sup>1,6</sup>	Invicta <sup>2</sup>	FT-10 (Princesa)		
	FT-2010 <sup>2,6</sup>	KI-S 604 <sup>1,6</sup>	FT-2000 <sup>1</sup>		
	FT-Cometa <sup>1</sup>	KI-S 605 <sup>1,6</sup>	FT-2006 <sup>1,6</sup>		
	FT-Guaira <sup>2</sup>	OCEPAR 13 <sup>2</sup>	FT-2007 <sup>1,6</sup>		
	FT-Saray <sup>2</sup>	OCEPAR 18 <sup>1</sup>	FT-Abyara <sup>1</sup>		
	OCEPAR 3-Primavera <sup>1</sup>		FT-Iramaia <sup>2</sup>		
	OCEPAR 14 <sup>1</sup>		KI-S 702 <sup>2</sup>		
OCEPAR 17 <sup>1</sup>		OCEPAR 16 <sup>1</sup>			
Toler.	Campos Gerais <sup>2,4</sup>	BR-4 <sup>3</sup>	-	-	FT-Cristalina
	FT-Manacá	OCEPAR 4-Iguaçu			
	IAS 5 <sup>2,3</sup>				
	OCEPAR 10				

<sup>1</sup> Resistente, a campo, ao cancro da haste.

<sup>2</sup> Moderadamente resistente, a campo, ao cancro da haste.

<sup>3</sup> Suscetível à mancha "olho-de-rã".

<sup>4</sup> 'Campos Gerais' é recomendada apenas para a Região Centro-Sul do estado.

<sup>5</sup> 'FT-Estrela' é recomendada para solos de baixa fertilidade ou para semeadura entre 15/12 e 15/01.

<sup>6</sup> Recomendada em 1997.

Nota: - Foram excluídas de recomendação, em 1997, as cultivares FT-2, FT-6 (Veneza), OCEPAR 6, OCEPAR 8, OCEPAR 9-SS1 e Paraná.

CULTIVARES DE SOJA RECOMENDADAS PARA O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
- SAFRA 1997/98 -

Grupo Precoce/Médio			Grupo Semitardio			Grupo Tardio					
Cultivar	Região		Cultivar	Região		Cultivar	Região				
	CN	SO		S	CN		SO	S	CN	SO	S
BR-6 (Nova Bragg) <sup>4</sup>	-	-	P	CAC-1 <sup>1</sup>	P	P	P	BR-9 (Savana) <sup>2</sup>	P	P	T
BR-16 <sup>2</sup>	-	T	T	Dourados <sup>1</sup>	T	T	P	BR/EMGOPA-314			
BR-37 <sup>2</sup>	-	-	P	Embrapa 65 (Itapoty) <sup>1</sup>	-	-	P	(Garça Branca) <sup>1,5</sup>	P	-	-
COODETEC 201 <sup>1,5</sup>	-	-	P	FT-18 (Xavante)	T	T	P	Embrapa 20 (Doko RC) <sup>1</sup>	P	P	T
Embrapa 4 (BR-4 RC)	-	T	P	FT-2001 <sup>2</sup>	P	P	P	EMGOPA-313			
Embrapa 64 (Ponta Porã) <sup>1</sup>	-	-	P	FT-Estrela <sup>1</sup>	P	P	P	(Anhanguera) <sup>2</sup>	P	T	-
FT-5 (Formosa)	-	T	P	FT-Maracaju	-	T	P	FT-101 <sup>5</sup>	P	-	-
FT-10 (Princesa)	-	T	P	IAC-8 <sup>3</sup>	T	T	T	FT-106 <sup>1,5</sup>	P	-	-
FT-20 (Jaú) <sup>2</sup>	-	T	P	IAC-8-2 <sup>1</sup>	T	-	-	FT-107 <sup>1,5</sup>	P	-	-
FT-2000 <sup>1,5</sup>	P	P	P	MS/BR-59 (Mandi) <sup>1,5</sup>	P	T	-	FT-Cristalina	T	T	T
FT-Abyara <sup>1,4</sup>	-	T	P	MT/BR-45 (Paiaguás) <sup>1</sup>	P	T	T	FT-Cristalina RCH	P	-	-
FT-Jatobá <sup>2</sup>	-	T	P	Santa Rosa <sup>1</sup>	P	P	P	FT-Seriema	-	-	-
FT-Lider <sup>2</sup>	-	T	P					MS/BR-34 (EMPAER-10)	T	T	T
IAS 5 <sup>2,3</sup>	-	T	T					MS/BR-61 (Surubi) <sup>1,5</sup>	P	T	-
MS/BR-19 (Pequi)	P	P	P								
MS/BR-57 (Lambari) <sup>1,5</sup>	P	P	P								
OCEPAR 4-Iguaçu	-	-	P								
OCEPAR 7-Brilhante <sup>2</sup>	-	-	P								
UFV/ITM-1	P	P	P								

<sup>1</sup> Resistente, a campo, ao cancro da haste.

<sup>2</sup> Moderadamente resistente, a campo, ao cancro da haste.

<sup>3</sup> Suscetível à mancha "olho-de-rã".

<sup>4</sup> Apresenta limitação de altura de planta, devendo ser semeada preferencialmente em novembro, em solos de cultura ou solos corrigidos, com boa fertilidade.

<sup>5</sup> Recomendada em 1997.

**Notas:** - Foram excluídas de recomendação, em 1997, as cultivares Bossier, Doko, Embrapa 2, Embrapa 3, Embrapa 25, Embrapa 26, FT-11 (Alvorada), FT-14 (Piracema), FT-19 (Macacha), FT-45263, FT-Manacá, IAC-12, MS/BR-17 (São Gabriel), MS/BR-20 (Ipê), MS/BR-21 (Buriiti), MS/BR-39 (Chapadão), OCEPAR 12 e Ufv-10 (Uberaba).

- Classes de recomendação: P = preferencial; T = tolerada; - = não recomendada.

- Regiões: CN = Centro-Norte; SO = Sudoeste; S = Sul.

CULTIVARES DE SOJA RECOMENDADAS PARA O ESTADO DO MATO GROSSO - SAFRA 1997/98

Grupo Precoce/Semiprecoce		Grupo Médio		Grupo Semitardio/Tardio	
Cultivar	Classe	Cultivar	Classe	Cultivar	Classe
DOIS MARCOS-118 <sup>1,8</sup>	P	BR/IAC-21 <sup>1</sup>	P	BR/EMGOPA-314 (Garça Branca) <sup>1</sup>	P
DOIS MARCOS-Soberana <sup>1,8</sup>	P	CAC-1 <sup>1</sup>	P	DOIS MARCOS-339 <sup>1</sup>	P
FT-109 <sup>1</sup>	P	DOIS MARCOS-247 <sup>1</sup>	P	Embrapa 20 (Doko RC) <sup>1,4</sup>	P
FT-110 <sup>1,8</sup>	P	DOIS MARCOS-Vitória <sup>1</sup>	P	EMGOPA-313 (Anhanguera) <sup>2,5</sup>	P
FT-489 <sup>2</sup>	T	FT-101 <sup>5</sup>	P	FT-103 <sup>1,8</sup>	P
FT-2000 <sup>1,8</sup>	P	FT-105 <sup>1,8</sup>	P	FT-104 <sup>1</sup>	P
FT-Estrela <sup>1,3,6</sup>	P	FT-111 <sup>1,8</sup>	P	FT-106 <sup>1</sup>	P
MG/BR-46 (Conquista) <sup>1</sup>	P	MT/BR-45 (Paiguás) <sup>1</sup>	P	FT-107 <sup>1</sup>	P
MT/BR-49 (Pioneira) <sup>1</sup>	P	MT/BR-50 (Parecis) <sup>1</sup>	P	FT-108 <sup>1,7</sup>	P
		MT/BR-51 (Xingu) <sup>1</sup>	P	FT-114 <sup>1,8</sup>	P
				FT-Cistalina RCH <sup>1,7,8</sup>	P
				MT/BR-47 (Canário) <sup>1</sup>	P
				MT/BR-52 (Curió) <sup>1</sup>	P
				MT/BR-53 (Tucano) <sup>1</sup>	P
				MT/BR-55 (Uirapuru) <sup>1,8</sup>	P

<sup>1</sup> Resistente, a campo, ao cancro da haste.

<sup>2</sup> Moderadamente resistente, a campo, ao cancro da haste.

<sup>3</sup> 'FT-Estrela' é exigente em fertilidade do solo.

<sup>4</sup> 'Embrapa 20 (Doko RC)' é recomendada também para cerrado de 1º ano de soja.

<sup>5</sup> Apropriada para término de semeadura (dezembro), devido ao menor decréscimo de produtividade.

<sup>6</sup> 'FT-Estrela' é recomendada apenas para a Região Sul do estado (latitude > 15°).

<sup>7</sup> Tolera solos de baixa fertilidade.

<sup>8</sup> Recomendada em 1997.

**Notas:** - Foram excluídas de recomendação, em 1997, as cultivares BR-15 (Mato Grosso), BR-40 (Itiquira), CAC/BR-43, EMGOPA-305 (Caraíba), EMGOPA-306 (Chapada), EMGOPA-308 (Serra Dourada), FT-11 (Alvorada), FT-Canarana, FT-Cristalina, FT-Seriema, IAC-8, Nova IAC-7 e UFV-10 (Uberaba).

- Classes de recomendação: P = preferencial; T = tolerada.

Grupo de Maturação e Cultivar	Cerrado parcialmente corrigido	Cerrado corrigido		Solo naturalmente fértil	Entressafra (Inverno)
		1º e 2º ano de soja	3º ano ou mais de soja		
..Continuação					
FT-107 <sup>1</sup>	T	P	P	P	-
FT-108 <sup>1,5</sup>	P	P	P	P	-
<b>Região Norte de Goiás (latitude &lt; 15º)</b>					
BR/EMGOPA-314 (Garça Branca) <sup>1</sup>	-	T	T	T	-
Embrapa 20 (Doko RC) <sup>1</sup>	-	P	P	P	P
EMGOPA-313 (Anhanguera) <sup>2</sup>	-	T	T	T	-
DOIS MARCOS-339 <sup>1,5</sup>	-	T	T	T	-
FT-101	-	T	T	T	-
FT-106 <sup>1</sup>	-	T	T	T	-
IAC-8 <sup>3</sup>	T	T	T	-	T

<sup>1</sup> Resistente, a campo, ao cancro da haste.

<sup>2</sup> Moderadamente resistente, a campo, ao cancro da haste.

<sup>3</sup> 'IAC-8' é suscetível à mancha "olho-de-rã".

<sup>4</sup> Quando semeada cedo, propicia a sucessão de cultivares.

<sup>5</sup> Recomendada em 1997.

**Notas:** - São recomendadas especificamente para os municípios de Quirinópolis, Gouvelândia e Acreúna, para cultivo em solos férteis, as cultivares IAS 5 e Embrapa 1 (IAS 5 RC), em população de 600 a 700 mil plantas/ha, e as cultivares BR-4 e Embrapa 4 (BR-4 RC), em população de 500 a 600 mil plantas/ha.

- Foram excluídas de recomendação, em 1997, as cultivares BR-10 (Teresina), BR-27 (Cariri), Doko, EMGOPA-301, EMGOPA-303, EMGOPA-305 (Caraíba), EMGOPA-306 (Chapada), EMGOPA-308 (Serra Dourada), FT-11 (Alvorada), FT-100, FT-Cristalina, FT-Seriema, GO/BR-25 (Aruanã), IAC-8 (latitude > 15º) e Tropical.

- Classes de recomendação: P = preferencial; T = tolerada; - = não recomendada.

CULTIVARES DE SOJA RECOMENDADAS PARA O ESTADO DE MINAS GERAIS – SAFRA 1997/98

Semiprecoce (101 a 110 dias)	Grupo de Maturação		
	Médio (111 a 125 dias)	Semitardio (126 a 145 dias)	Tardio (> 145 dias)
BR-16 <sup>2,4</sup>	Capinópolis (UFV-16) <sup>1</sup>	BR/IAC-21 <sup>1</sup>	BR-9 (Savana) <sup>2</sup>
Florestal (UFV-20) <sup>1,5</sup>	FT-Estrela <sup>1</sup>	CAC-1 <sup>1</sup>	Embrapa 20 (Doko RC) <sup>1</sup>
FT-2000 <sup>1</sup>	MG/BR-48 (Garimpo RCH) <sup>1</sup>	CS-301 <sup>1</sup>	FT-104 <sup>1</sup>
FT-Lider <sup>2</sup>	MG/BR-54 (Renascença) <sup>1,3,4,5</sup>	FT-102 <sup>1</sup>	FT-107 <sup>1</sup>
MG/BR-56 (Confiança) <sup>1,5</sup>	Triângulo (UFV-19) <sup>1,5</sup>	FT-109 <sup>1</sup>	Patos de Minas (UFV-18) <sup>1</sup>
OCEPAR 3-Primavera <sup>1</sup>		FT-115 <sup>1,5</sup>	
OCEPAR 19-Cotia <sup>1</sup>		MG/BR-46 (Conquista) <sup>1</sup>	
		MG/BR-58 (Segurança) <sup>1,5</sup>	
		Minas Gerais (UFV-17) <sup>1</sup>	
		MT/BR-45 (Paiguás) <sup>1</sup>	

<sup>1</sup> Resistente, a campo, ao cancro da haste.

<sup>2</sup> Moderadamente resistente, a campo, ao cancro da haste.

<sup>3</sup> 'MG/BR-54 (Renascença)' é resistente ao nematóide de cisto - Raça 3.

<sup>4</sup> Recomendada para cultivo ao sul do paralelo 18°.

<sup>5</sup> Recomendada em 1997.

**Nota:** - Foram excluídas de recomendação, em 1997, as cultivares FT-11 (Alvorada), FT-100, FT-Cristalina, FT-Eureka, FT-Seriema, IAC-8, MG/BR-22 (Garimpo), MG/BR-42 (Kage), OCEPAR 15 (Paracatu) e UFV-10 (Uberaba).

CULTIVARES DE SOJA RECOMENDADAS PARA O ESTADO DO TOCANTINS – SAFRA 1997/98

Grupo de maturação e cultivar	Cerrado parcialmente corrigido	Cerrado corrigido		Entressafra
		1º e 2º ano de soja	3º ano ou mais de soja	
<b>Precoce (até 120 dias)</b>				
BR/IAC-21 <sup>1</sup>	T	P	P	T
EMGOPA-313 (Anhanguera) <sup>2</sup>	T	P	P	-
<b>Médio (121 a 135 dias)</b>				
BR/EMGOPA-314 (Garça Branca) <sup>1</sup>	T	P	P	T
Embrapa 20 (Doko RC) <sup>1</sup>	-	P	P	P
EMGOPA-305 (Caraíba)	T	T	T	T
EMGOPA-308 (Serra Dourada)	T	T	T	T

<sup>1</sup> Resistente, a campo, ao cancro da haste.

<sup>2</sup> Moderadamente resistente, a campo, ao cancro da haste.

**Notas:** - Foram excluídas de recomendação, em 1997, as cultivares Embrapa 31 (Mina), Embrapa 33 (Cariri RC), Embrapa 34 (Teresina RC), EMGOPA-303 e GO/BR-25 (Aruaná).

- Classes de recomendação: P = preferencial; T = tolerada; - = não recomendada.





CULTIVARES DE SOJA RECOMENDADAS PARA O ESTADO DE RONDÔNIA – SAFRA 1997/98

Classe	Grupo de Maturação		
	Precoce (até 110 dias)	Médio (111 a 125 dias)	Tardio ( > 125 dias)
<b>Preferencial</b>	MG/BR-46 (Conquista) <sup>1,4</sup> MT/BR-49 (Pioneira) <sup>1,4</sup>	BR/EMGOPA-314 (Garça Branca) <sup>1</sup> Embrapa 20 (Doko RC) <sup>1,3</sup> MT/BR-50 (Parecis) <sup>1,4</sup> MT/BR-51 (Xingu) <sup>1,4</sup> MT/BR-53 (Tucano) <sup>1,4</sup>	MT/BR-47 (Canário) <sup>1,4</sup>
<b>Tolerada</b>	—	EMGOPA-313 (Anhanguera) <sup>2</sup>	—

<sup>1</sup> Resistente, a campo, ao cancro da haste.

<sup>2</sup> Moderadamente resistente, a campo, ao cancro da haste.

<sup>3</sup> 'Embrapa 20 (Doko RC)' é recomendada também para cerrado de 1º ano de soja (parcialmente corrigido).

<sup>4</sup> Recomendada em 1997.

**Nota:** - Foram excluídas de recomendação, em 1997, as cultivares BR-10 (Teresina), BR-11 (Carajás), BR-15 (Mato Grosso), Doko, FT-Cristalina, IAC-8, Timbira e Tropical.

CULTIVARES DE SOJA RECOMENDADAS PARA O ESTADO DA BAHIA – SAFRA 1997/98

Classe	Grupo de Maturação		
	Médio (até 120 dias)	Semitardio (121 a 130 dias)	Tardio ( > 130 dias)
<b>Preferencial</b>	CAC-1 <sup>1</sup> CS-301 <sup>1</sup> FT-101 FT-102 <sup>1</sup> FT-109 <sup>1</sup> FT-2000 <sup>1,4</sup> MG/BR-46 (Conquista) <sup>1</sup> MT/BR-50 (Parecis) <sup>1</sup>	BR/EMGOPA-314 (Garça Branca) <sup>1</sup> Embrapa 20 (Doko RC) <sup>1,3</sup> FT-103 <sup>1</sup> FT-104 <sup>1</sup> FT-Cristalina RCH <sup>1,4</sup>	FT-106 <sup>1,4</sup> FT-107 <sup>1</sup>
<b>Tolerada</b>	FT-Bahia FT-Estrela <sup>1,2</sup>	Nova IAC-7 <sup>1</sup>	—

<sup>1</sup> Resistente, a campo, ao cancro da haste.

<sup>2</sup> 'FT-Estrela' é recomendada para semeadura entre 22/11 e 15/12, em áreas irrigadas e em solos férteis.

<sup>3</sup> 'Embrapa 20 (Doko RC)' é recomendada também para cerrado de 1º ano de soja (parcialmente corrigido).

<sup>4</sup> Recomendada em 1997.

**Nota:** - Foram excluídas de recomendação, em 1997, as cultivares BR-27 (Cariri), FT-Cristalina, IAC-8 e Paranagoiana.

CULTIVARES DE SOJA RECOMENDADAS PARA O ESTADO DO MARANHÃO – SAFRA 1997/98

Classe	Grupo de Maturação		
	Precoce (até 110 dias)	Médio (111 a 125 dias)	Tardio ( > 125 dias)
Preferencial	Embrapa 20 (Doko RC) <sup>1</sup>	Embrapa 63 (Mirador) <sup>1</sup> MA/BR-64 (Parnaíba) <sup>1,4</sup> MA/BR-65 (Sambaíba) <sup>1,4</sup>	–
Tolerada	BR-9 (Savana) <sup>2</sup> BR-35 (Rio Balsas) EMGOPA-308 (Serra Dourada) FT-Cristalina	Embrapa 30 (Vale do Rio Doce)	BR-28 (Seridó) <sup>3</sup> Embrapa 9 (Bays)

- <sup>1</sup> Resistente, a campo, ao cancro da haste.  
<sup>2</sup> Moderadamente resistente, a campo, ao cancro da haste.  
<sup>3</sup> 'BR-28 (Seridó)' é suscetível à mancha "olho-de-rã".  
<sup>4</sup> Recomendada em 1997.

**Notas:** - As cultivares tardias são recomendadas para regiões onde o período de chuvas é de, no mínimo, 130 dias.  
 - Foram excluídas de recomendação, em 1997, as cultivares BR/EMGOPA-312 (Potiguar), Embrapa 31 (Mina), Embrapa 32 (Itaqui), Embrapa 33 (Cariri RC), Embrapa 34 (Teresina RC) e FT-Canarana.

CULTIVARES DE SOJA RECOMENDADAS PARA O ESTADO DO PIAUÍ – SAFRA 1997/98

Classe	Grupo de Maturação		
	Precoce (até 110 dias)	Médio (111 a 125 dias)	Tardio ( > 125 dias)
Preferencial	–	Embrapa 63 (Mirador) <sup>1</sup>	–
Tolerada	BR-9 (Savana) <sup>2</sup> BR-35 (Rio Balsas) FT-Cristalina	Embrapa 30 (Vale do Rio Doce)	BR-28 (Seridó) <sup>3</sup> Embrapa 9 (Bays)

- <sup>1</sup> Resistente, a campo, ao cancro da haste.  
<sup>2</sup> Moderadamente resistente, a campo, ao cancro da haste.  
<sup>3</sup> Suscetível à mancha "olho-de-rã", não devendo ser cultivada em anos sucessivos na mesma área.

**Notas:** - As cultivares tardias são recomendadas para regiões onde o período de chuvas é de, no mínimo, 130 dias.  
 - Foram excluídas de recomendação, em 1997, as cultivares BR/EMGOPA-312 (Potiguar), Embrapa 31 (Mina), Embrapa 33 (Cariri RC) e Embrapa 34 (Teresina RC).

CULTIVARES DE SOJA RECOMENDADAS PARA AS REGIÕES NORTE E NORDESTE DO BRASIL (\*)  
- SAFRA 1997/98 -

Classe	Grupo de Maturação	
	Médio (até 125 dias)	Tardio ( > 125 dias)
Preferencial	Embrapa 63 (Mirador) <sup>1,3</sup>	-
Tolerada	-	BR-28 (Seridó) <sup>2</sup>

(\*) Excetua-se os Estados de Tocantins, Bahia, Piauí, Maranhão e Rondônia, que possuem recomendações específicas.

<sup>1</sup> Resistente, a campo, ao cancro da haste.

<sup>2</sup> Suscetível à doença mancha "olho-de-rã", não devendo ser cultivada em anos sucessivos na mesma área.

<sup>3</sup> Recomendada em 1997.

**Notas:** - A cultivar tardia é recomendada para regiões onde o período de chuvas é de, no mínimo, 130 dias.

- Foram excluídas de recomendação, em 1997, as cultivares BR-27 (Cariri), Embrapa 33 (Cariri RC), Embrapa 34 (Teresina RC), Timbira e Tropical.

## **Comissões Regionais de Avaliação e Recomendação de Cultivares de Soja - Regiões I e II (CRC-Soja I e CRC-Soja II)**

### **- Membros -**

<b>Instituição</b>	<b>Membro</b>	<b>CRC-Soja I</b>	<b>CRC-Soja II</b>
Embrapa	Titular	Milton Kaster	Milton Kaster
	Suplente	Orival Gastão Menosso	José Francisco Ferraz de Toledo
Pesquisa	Titular	Nilsso Luiz Zuffo	Tuneo Sedyama
	Suplente	-	Gilson J. Campelo
SIBRATER	Titular	Antoninho Maurina	Hortêncio Paro
	Suplente	-	-
ABRASEM	Titular	Antônio E. Loureiro da Silva	Gilberto Flávio Goellner
	Suplente	Gualter B. Gonçalves	-
MA/SDR	Titular	Agwagner Dutra Alarcão	Agwagner Dutra Alarcão
	Suplente	-	-