



Pasto para cavalos e vacas

Qual é a melhor pastagem para cavalos e gado leiteiro criados juntos?

Luci Guimarães

Rio de Janeiro, RJ

R: O mais indicado seria um dos cultivares de cynodon disponíveis no mercado. Apresentam elevada capacidade de produção, boa resposta à adubação nitrogenada e boa qualidade. O gênero Cynodon, originário do continente africano,

tem poucas áreas de pastagens representativas no Brasil, em comparação às terras cobertas com os gêneros Panicum e Brachiara. No entanto, podem ser encontrados no mercado nacional vários cultivares, como o capim-coastcross e o capim-tifton 85. Esses capins, de modo geral, não produzem sementes e precisam ser plantados por mudas.

CONSULTORA: PATRICIA MENEZES SANTOS, engenheira agrônoma, pesquisadora da Embrapa Pecuária Sudeste, Rod. Washington Luis, km 234, Caixa Postal 339, São Carlos, SP, tel. (16) 3361-5611, patricia@cnpse.embrapa.br

30385



Uvas imaturas

As uvas das minhas parreiras não amadurecem. O que pode estar acontecendo?

Jamerson Ramalho

Maceió, AL

R: As informações que nós temos infelizmente são insuficientes para uma avaliação e parecer mais preciso sobre o que está acontecendo com as suas parreiras. É necessário observar alguns fatores que possam estar levando a frutífera a esse estado. Verifique se há ou não a formação de cachos, se as bagas estão se desenvolvendo, se as uvas apodrecem ou ainda se há alguns sintomas de doenças e pragas.

Existem casos em que as bagas não amadurecem porque a videira cultivada é, na realidade, uma cultivar de porta-enxerto. Ela apresenta características vegetativas, como troncos, ramos e folhas, semelhantes às cultivares produtoras. Porém, não produz cachos ou, quando produz, as bagas não se desenvolvem e, por isso, não chegam à maturação.

CONSULTOR: HERMES PEIXOTO SANTOS FILHO, pesquisador em fitossanidade de citros da Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical, Caixa Postal 007, CEP 44.380-000, Cruz das Almas, BA, tel. (75) 3621-8038, hermes@cnpmf.embrapa.br