

## **Indicadores Biológicos Associados ao Ciclo do Fósforo em Solos de Cerrado Utilizando Plantio Direto e Plantio Convencional**





*Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária  
Embrapa Cerrados  
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento*

ISSN 1676-918X

Abril, 2004

# ***Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento*** 121

## **Indicadores Biológicos Associados ao Ciclo do Fósforo em Solos de Cerrado Utilizando Plantio Direto e Plantio Convencional**

Roberto Guimarães Carneiro  
Ieda de Carvalho Mendes  
Paulo Emílio Lovato  
Arminda Moreira de Carvalho  
Lúcio J. Vivaldi

Planaltina, DF  
2004

Exemplares desta publicação podem ser adquiridos na:

**Embrapa Cerrados**

BR 020, Km 18, Rod. Brasília/Fortaleza

Caixa Postal 08223

CEP 73310-970 Planaltina - DF

Fone: (61) 388-9898

Fax: (61) 388-9879

<http://www.cpac.embrapa.br>

[sac@cpac.embrapa.br](mailto:sac@cpac.embrapa.br)

**Comitê de Publicações**

Presidente: *José de Ribamar N. dos Anjos*

Editor Técnico: *Carlos Roberto Spehar*

Secretária-Executiva: *Maria Edilva Nogueira*

Supervisão editorial: *Maria Helena Gonçalves Teixeira*

Revisão de texto: *Maria Helena Gonçalves Teixeira*

Normalização bibliográfica: *Hozana Alvares de Oliveira*

Capa: *Iêda de Carvalho Mendes*

Foto da capa: *Iêda de Carvalho Mendes*

Editoração eletrônica: *Jussara Flores de Oliveira*

Impressão e acabamento: *Divino Batista de Souza /  
Jaime Arbués Carneiro*

Impresso no Serviço Gráfico da Embrapa Cerrados

**1ª edição**

1ª impressão (2004): tiragem 100 exemplares

**Todos os direitos reservados.**

A reprodução não autorizada desta publicação, no todo ou em parte, constitui violação dos direitos autorais (Lei nº 9.610).

CIP-Brasil. Catalogação na publicação.  
Embrapa Cerrados.

---

139      Indicadores biológicos associados ao ciclo do fósforo em solos de Cerrado utilizando plantio direto e plantio convencional / Roberto Guimarães Carneiro ... [et al.]. – Planaltina, DF : Embrapa Cerrados, 2004.

23 p. – (Boletim de pesquisa e desenvolvimento / Embrapa Cerrados, ISSN 1676-918X ; n. 121)

1. Biologia do solo. 2. Solo – cerrado – fósforo. 3. Microbiologia do solo. I. Carneiro, Roberto Guimarães. II. Série.

---

631.46 - CDD 21

© Embrapa 2004

# Sumário

Resumo .....	5
Abstract .....	6
Introdução .....	7
Material e Métodos .....	8
Resultados e Discussão .....	12
Conclusões .....	20
Agradecimentos .....	20
Referências Bibliográficas .....	20

# Indicadores Biológicos Associados ao Ciclo do Fósforo em Solos de Cerrado Utilizando Plantio Direto e Plantio Convencional<sup>1</sup>

Roberto Guimarães Carneiro<sup>2</sup>; Iêda de Carvalho Mendes<sup>3</sup>; Paulo Emílio Lovato<sup>4</sup>; Arminda Moreira de Carvalho<sup>5</sup>; Lúcio J. Vivaldi<sup>6</sup>

**Resumo** – O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência dos sistemas plantio direto, plantio convencional e de plantas de cobertura sobre indicadores biológicos associados ao ciclo do fósforo (P). O trabalho foi realizado em três áreas adjacentes em um Latossolo Vermelho-Amarelo: área I com dois anos de experimentação comparando esses sistemas de plantio; área II com seis anos de experimentação e área III com Cerrado nativo. Em julho/1998 e janeiro/1999, avaliaram-se: biomassa-P, populações de fungos e bactérias totais e solubilizadores de fosfato e a atividade da fosfatase ácida, nas profundidades de 0 a 5 cm e de 5 a 20 cm. A atividade da fosfatase e a ocorrência de fungos e bactérias solubilizadoras nas áreas com plantio direto foram significativamente superiores às das áreas com plantio convencional, na profundidade de 0 a 5 cm. O tempo de estabelecimento acentuou as diferenças entre plantio direto e convencional quanto aos indicadores avaliados. A biomassa-P diminuiu no tratamento plantio direto – nabo-forrageiro (*Raphanus sativus*) – da área II. Os fungos solubilizadores aumentaram na presença de guandu (*Cajanus cajan*) e nabo-forrageiro, e as bactérias solubilizadoras aumentaram na presença de guandu. O solo com vegetação nativa apresentou maior atividade da fosfatase em relação às áreas cultivadas, evidenciando a importância da mineralização do P orgânico nesse ecossistema.

Termos para indexação: P-biomassa microbiana, fosfatase ácida, microrganismos solubilizadores de fosfato, culturas de cobertura.

<sup>1</sup> Extraído da dissertação de Mestrado apresentada pelo primeiro autor à Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Florianópolis, SC. Financiado pelo PCOPG/CNPq.

<sup>2</sup> Eng. Agrôn., M.Sc., Emater DF, Parque Estação Biológica – Ed. Emater, Asa Norte, CEP 70770-220, geagr@emater.df.gov.br.

<sup>3</sup> Eng. Agrôn., Ph.D, Embrapa Cerrados, mendesi@cpac.embrapa.br.

<sup>4</sup> Eng. Agrôn., Ph.D., UFSC, Dep. de Engenharia Rural CCA/UFSC Florianópolis, SC, plovato@mbox1.ufsc.br

<sup>5</sup> Eng. Agrôn., M.Sc., Embrapa Cerrados, arminda@cpac.embrapa.br.

<sup>6</sup> Eng. Agrôn., Ph.D., Departamento de Estatística da Universidade de Brasília, Campus Universitário Darci Ribeiro, ICC Centro – Mod. 15 subsolo CEP 70910-900, Brasília, DF.

# Soil Biological Indicators Associated to the P Cycle in a Cerrado Soil under No-till and Conventional Tillage Systems

---

**Abstract** – *The objective of this work was to evaluate the effects of no-till, conventional tillage and cover crops on some biological indicators associated to the P cycle. The work was carried out on three adjacent areas on a Red-Yellow Oxisol: area I, a two-year experiment comparing the two management systems; area II a six-year experiment and area III, native Cerrado vegetation. The soil was sampled at two depths (0 to 5 cm and 5 to 20 cm) in July/1998 and January/1999. The biological indicators evaluated were microbial biomass-P, acid phosphatase activity, phosphate-solubilizing and total soil fungi and bacteria. Acid phosphatase activity and numbers of phosphate-solubilizing microorganisms, at the 0 to 5 cm depth, were significantly greater in the NT soil, as compared to the CT. The differences between the tillage systems, regarding the biological indicators evaluated, were more pronounced in area II in which the no-till system had been established for a longer period of time. Microbial-P decreased in the NT- Raphanus sativus treatment. P-solubilizing fungi increased in the presence of Cajanus cajan and Raphanus sativus, whereas the P-solubilizing bacteria increased in the presence of C. cajan. The highest activities of acid phosphatase were detected in the soil under native vegetation, evidencing the importance of organic P mineralization in this ecosystem.*

*Index terms: P-microbial biomass, acid phosphatase, phosphate solubilizing microorganisms, cover crops.*

## Introdução

Os microrganismos do solo desempenham papel fundamental no ciclo biogeoquímico do fósforo (P) e na sua disponibilidade para as plantas, mediante o fluxo de P pela biomassa microbiana, da solubilização do P-inorgânico, da mineralização do P-orgânico e da associação entre plantas e fungos micorrízicos ([PAUL; CLARK, 1996](#)).

O P imobilizado na biomassa microbiana pode ser liberado pela ruptura das células microbianas promovida por variações climáticas e de manejo de solo e, também, por causa das interações com a microfauna que, ao se alimentar de microrganismos, libera diversos nutrientes no solo ([BUCHANAN; KING, 1992](#)). O P contido na biomassa funciona, portanto, como uma proteção desse nutriente, diminuindo sua fixação por períodos prolongados em minerais do solo ([PAUL; CLARK, 1996](#)) e aumentando a eficiência da adubação fosfatada pela imobilização de parte do P fertilizante na biomassa ([TISDALE et al., 1993](#); [GUERRA et al., 1995](#); [HE et al., 1997](#)). Dessa forma, o conteúdo e o fluxo de P por meio da biomassa microbiana desempenham importante papel como reservatório desse nutriente, podendo atingir valores equivalentes ou, às vezes, superiores à absorção desse nutriente pelas plantas ([BROOKES et al., 1984](#); [SINGH et al., 1989](#)).

Bactérias, fungos e actinomicetos, envolvidos nos processos de solubilização do P-inorgânico, excretam ácidos orgânicos que atuam dissolvendo diretamente o material fosfático ou quelando os cátions que acompanham o ânion fosfato ([KUCEY, 1983](#)). A população de microrganismos solubilizadores de fosfato e sua capacidade de solubilização estão intimamente relacionadas ao tipo e ao manejo do solo ([KUCEY, 1983](#); [NAHAS et al., 1994b](#)).

Além do P da biomassa microbiana, da atuação dos microrganismos solubilizadores de fosfato e dos fungos micorrízicos, a produção de enzimas, como as fosfatases ácidas e alcalinas, por microrganismos é responsável pela mineralização do P-orgânico ([DICK; TABATABAI, 1993](#)). Os microrganismos e as plantas são responsáveis pela produção das fosfatases ácidas, enquanto as alcalinas parecem ser produzidas somente por microrganismos ([TABATABAI, 1994](#)). De acordo com [Dick e Tabatabai \(1993\)](#), os microrganismos seriam as fontes mais expressivas de fosfatases no solo, por causa da sua grande biomassa, alta atividade metabólica e curto tempo de vida, com várias gerações por ano, permitindo a produção e a liberação de quantidades elevadas de enzimas extracelulares em comparação com as plantas.

No Bioma Cerrado, além da pesquisa em relação aos fungos micorrízicos (MIRANDA; MIRANDA, 1997), pouco se conhece de outros processos microbiológicos associados ao ciclo do P e do impacto de diferentes sistemas de manejo do solo nesses processos.

O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência do plantio direto (PD), do preparo convencional do solo (PC) e de plantas de cobertura sobre indicadores biológicos associados ao ciclo do fósforo.

## Material e Métodos

O estudo foi realizado em um Latossolo Vermelho-Amarelo argiloso, no Distrito Federal, com clima Tropical Estacional (Aw) conforme classificação de Köppen. Nas estações seca (julho de 1998) e chuvosa (janeiro de 1999), foram coletadas amostras de solo em duas profundidades (0 a 5 cm e 5 a 20 cm), em três áreas adjacentes: área I, com dois anos de experimentação comparando os sistemas de PD e PC; área II, com seis anos de experimentação e área III, com vegetação nativa do Bioma Cerrado. As áreas I e II foram desmatadas em 1978 e cultivadas durante oito anos com culturas anuais, usando o preparo de solo convencional. De 1986 até a instalação dos experimentos (em 1992/1993 na área II e em 1997/1998 na área I), elas foram deixadas em pousio sendo que anualmente as gramíneas (vegetação predominante nas duas áreas) eram manejadas com roçadeiras.

Na área I, o experimento teve início em 1997 e consistia no estudo dos efeitos do sistema de plantio direto (PD), recém-estabelecido, em relação ao plantio com preparo de solo convencional (PC), constando de uma sucessão de milho e culturas de cobertura. O delineamento experimental foi de blocos casualizados com três repetições com parcelas subdivididas. As parcelas (12 x 30 m) eram constituídas pelas espécies vegetais de cobertura: guandu (*Cajanus cajan*), mucuna-cinza (*Mucuna pruriens*) e vegetação espontânea (testemunha) e as subparcelas (12 x 15 m) pelos sistemas de manejo: PD e PC (aração e gradagem).

Visando ao estabelecimento de uma cronoseqüência com diferentes tempos de estabelecimento do plantio direto, foram feitas, também, avaliações numa área experimental adjacente (área II) onde desde 1992 o sistema de PC comumente praticado no Bioma Cerrado (uma aração e duas gradagens, sem o uso de culturas de cobertura na entressafra) é comparado a sistemas de plantio direto



com culturas de cobertura. Essa área consiste de duas faixas com 320 m de comprimento por 50 m de largura, uma com plantio direto (PD) e outra com plantio em sistema convencional de preparo do solo (PC). A faixa de PD é subdividida em parcelas de 1700 m<sup>2</sup> nas quais várias culturas de cobertura são instaladas no final da estação chuvosa, em sucessão ao milho ou à soja. As faixas de PC são mantidas em pousio até o preparo do solo (uma aração e duas gradagens) para a safra seguinte. Foram coletadas amostras de solo nos tratamentos de sucessão milho/nabo-forrageiro (*Raphanus sativus*)/soja em PD (nabo-forrageiro-PD), milho/milheto (*Pennisetum americanum*)/soja em PD (milheto-PD) e milho/soja em preparo de solo convencional (PC). A terceira área avaliada correspondeu a um solo com vegetação nativa do Bioma Cerrado, utilizado como referência.

As amostras na profundidade 0 a 5 cm foram coletadas com uma pá, com abertura de uma minitrincheira da qual foram retiradas fatias de solo com 5 cm de espessura por 30 cm de largura. Na profundidade 5 a 20 cm, as amostras foram coletadas com trado tipo holandês, no mesmo local da amostragem de 0 a 5 cm. Nas áreas I (experimento iniciado em 1997), II (iniciado em 1992) e na área III (Cerrado nativo), as amostras compostas de solo foram obtidas pela mistura de 10, 30 e 20 subamostras, respectivamente, as quais foram mantidas a 4 °C até o momento das análises. As propriedades químicas dos solos dessas áreas são apresentadas na [Tabela 1](#).

Nas análises microbiológicas, as amostras foram passadas através de uma peneira com malha de 4,0 mm, removendo-se resíduos de plantas e raízes. Avaliaram-se o conteúdo de P da biomassa microbiana (biomassa-P), as populações de fungos e bactérias totais e solubilizadores de fosfatos (solubilizadores de P) e a atividade da enzima fosfatase ácida. A biomassa-P foi determinada pelo método da fumigação e extração ([BROOKES et al., 1982](#)). Amostras de 5,0 g de solo foram distribuídas em frascos de vidro num total de oito por tratamento. Metade das amostras foi fumigada por 48 horas num dessecador de 5,0 litros contendo 25 mL de clorofórmio. A extração do P foi realizada pela adição de 50 mL de uma solução de NaHCO<sub>3</sub> 0,5M (pH 8,5) e sua quantificação pelo método colorimétrico do molibdato-ácido ascórbico. Para corrigir a fixação de P-inorgânico (Pi) durante a extração, foi estimada a taxa de recuperação de uma quantidade conhecida de P adicionado ao solo juntamente com o extrator NaHCO<sub>3</sub>. No cálculo da biomassa P, adotou-se o fator de correção (Kp) de 0,4 ([BROOKES et al., 1982](#)).

**Tabela 1.** Características químicas dos solos na área I, com dois anos de avaliação dos sistemas plantio direto e convencional; área II, com seis anos de avaliação e na área III, sob vegetação nativa de Cerrado, nas profundidades de 0 a 5 cm e 5 a 20 cm.

Tratamento <sup>1</sup>	pH		Al		H + Al		Ca + Mg		P		K	
	..... (cmol <sub>c</sub> dm <sup>-3</sup> ) .....											
	Profundidade (cm)											
	0-5	5-20	0-5	5-20	0-5	5-20	0-5	5-20	0-5	5-20	0-5	5-20
<b>Área I</b>												
Vegetação espontânea-PD	5,7	5,6	0,1	0,1	4,6	4,6	2,9	2,8	6,9	3,1	114,0	39,7
Vegetação espontânea-PC	5,7	5,7	0,1	0,1	4,9	4,4	3,1	3,0	5,6	4,4	143,0	40,0
Guandu-PD	5,7	5,6	0,1	0,1	4,7	4,6	3,1	3,0	7,6	3,6	120,0	44,0
Guandu-PC	5,7	5,7	0,1	0,1	4,4	4,3	2,9	2,7	5,0	3,3	140,0	42,7
Mucuna-PD	5,5	5,8	0,1	0,1	4,7	4,7	3,2	3,1	6,2	2,8	127,0	40,3
Mucuna-PC	5,8	5,8	0,1	0,1	4,3	4,2	3,1	3,3	4,3	2,7	163,0	44,0
<b>Áreas II e III</b>												
Milheto PD	5,9	5,6	0,0	0,1	4,5	5,2	3,6	2,4	22,4	4,8	238,0	58,5
Nabo-forrageiro-PD	6,2	5,7	0,0	0,2	3,8	5,6	4,4	2,5	13,8	4,7	233,0	66,0
PC	5,7	5,9	0,1	0,1	4,5	4,3	3,1	3,0	7,7	6,4	90,0	35,0
Cerrado nativo	4,9	4,9	0,9	0,5	7,2	6,4	0,2	0,2	1,0	0,9	31,0	24,0

<sup>1</sup> PD: Plantio direto; PC: Preparo convencional

A contagem das populações de fungos e bactérias totais e solubilizadores de fosfato foi realizada por diluições seriadas (três placas por diluição) em meio BDAL (batata, dextrose, ágar e extrato de levedura). Nos meios de cultura de bactérias e fungos, antes da autoclavagem, o pH foi corrigido para 7,0 e 5,5 respectivamente. No meio de cultura dos fungos, acrescentaram-se 70 mg L<sup>-1</sup> de rosa-bengala e 30 mg L<sup>-1</sup> de sulfato de estreptomicina. A contagem dos microrganismos solubilizadores de P foi realizada segundo Kucey (1983). Após a autoclavagem, foram adicionadas aos meios de cultura, soluções estéreis de K<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> (30 mL L<sup>-1</sup>) e CaCl<sub>2</sub> (60 mL L<sup>-1</sup>) na concentração de 10% (p/v) para promover a formação de um precipitado de fosfato de cálcio. O aparecimento de um halo transparente em volta das colônias caracterizou a presença de solubilizadores de fósforo.

A atividade da fosfatase ácida foi determinada conforme [Tabatabai \(1994\)](#), baseada na determinação colorimétrica do *p*-nitrofenol liberado a partir da ação das fosfatases, depois da incubação do solo em solução tamponada de *p*-nitrofenilfosfato 0,05M.

Na área I, foi realizada a análise de variância. As profundidades e as épocas de amostragem foram consideradas como subsubparcelas e subsubsubparcelas respectivamente, de acordo com [Milliken e Johnson \(1992\)](#). Foram consideradas significativas as interações e os efeitos que apresentaram no teste F nível de significância igual ou inferior a 10%. Utilizou-se o teste t (a 1%, 5% e 10% de probabilidade) na comparação de médias. Os graus de liberdade do resíduo (composto) foram calculados pela fórmula de [Satterthwaite \(1946\)](#), e as variâncias dos contrastes, conforme [Cochran e Cox \(1957\)](#). Na análise da contagem dos microrganismos solubilizadores de fosfato e totais, os valores ( $x + 0,5$ )<sup>0,5</sup>.

A inclusão das áreas II e III (Cerrado nativo) nas avaliações teve caráter observativo, pois constituía oportunidade única de estudo, especialmente, no Bioma Cerrado onde existem poucos experimentos de longa duração com sistema de PD. Uma vez que a ausência de um delineamento experimental apropriado, incluindo as três áreas, não permitia aplicação dos testes estatísticos usuais, os valores obtidos nessas áreas foram utilizados para auxiliar na interpretação dos valores dos indicadores biológicos obtidos na área I. Para isso, várias medidas foram adotadas (avaliações em parcelas grandes e homogêneas e uso de amostras compostas formadas por elevado número de subamostras) visando reduzir o erro experimental e aumentar a representatividade das amostras de solo coletadas nas áreas II e III.

## Resultados e Discussão

O conteúdo de P na biomassa microbiana (biomassa-P) variou de 2 a 20  $\mu\text{g P g}^{-1}$  solo ([Tabelas 2 e 3](#)), assemelhando-se aos valores de 7 a 14  $\mu\text{g P g}^{-1}$  solo e de 8,7 a 25,0  $\mu\text{g P g}^{-1}$  solo constatados por [Guerra et al. \(1995\)](#) no Rio de Janeiro e [Conte et al. \(2002\)](#), no Rio Grande do Sul respectivamente.

Na área I, as amostras da estação chuvosa (janeiro) tiveram média (9,9  $\mu\text{g P g}^{-1}$  solo) significativamente superior (teste t,  $p < 0,05$ ) à da estação seca (3,4  $\mu\text{g P g}^{-1}$  solo). A interação entre profundidade e época também foi significativa. Na amostragem realizada em julho (estação seca), os teores de biomassa-P nas profundidades 0 a 5 cm e 5 a 20 cm não diferiram significativamente entre si. Na amostragem de janeiro (estação chuvosa), a biomassa-P, na profundidade de 5 a 20 cm (12,3  $\mu\text{g P g}^{-1}$  solo), foi superior (teste t,  $p < 0,1$ ) à da profundidade 0 a 5 cm (7,4  $\mu\text{g P g}^{-1}$  solo). Como na semeadura do milho o adubo fosfatado foi colocado 7 cm abaixo da superfície do solo, é possível que esse efeito esteja relacionado à imobilização de parte do P do fertilizante na biomassa microbiana conforme [Tisdale et al. \(1993\)](#) e [Conte et al. \(2002\)](#).

Nas análises dos dados referentes à estação chuvosa, em algumas repetições analíticas, houve interferência nas determinações de biomassa-P na profundidade de 5 a 20 cm causada pelos adubos fosfatados utilizados na adubação do milho. Entretanto, as variações de biomassa-P ocorridas entre as duas épocas de amostragem, equivalentes a 13 kg P ha<sup>-1</sup> nos primeiros 20 cm de solo, no caso do Cerrado nativo, indicam que a biomassa microbiana pode representar importante reservatório de P-lábil em relação às plantas nas condições do Cerrado. [Buchanan e King \(1992\)](#) observaram incrementos na biomassa-P no outono e no inverno e decréscimos nesses valores no final da primavera, implicando liberação de mais de 29 kg ha<sup>-1</sup> de P no solo, o que representou um pouco mais do que foi extraído pela cultura do milho.

Sistemas agrícolas com menor perturbação do solo conseguem manter maiores teores de P na biomassa microbiana ([BROOKES et al., 1984](#); [RHEINHEIMER et al., 2000](#)), como verificado nas amostras do PD, na área I, onde a interação entre manejo e época foi significativa ([Tabela 4](#)). Na época chuvosa e com grande atividade biológica, o P contido na biomassa microbiana do solo no PD (média de 11,4  $\mu\text{g P g}^{-1}$  solo) foi significativamente superior (teste t,  $p < 0,1$ ) ao do PC, (média de 8,3  $\mu\text{g P g}^{-1}$  solo). O manejo do solo pode ser, portanto, fator determinante no fluxo de P por intermédio da biomassa microbiana, sendo necessária melhor compreensão de sua dinâmica e contribuição para a nutrição das plantas.

**Tabela 2.** Fósforo na biomassa microbiana (Biomassa-P), fungos totais (FT), fungos solubilizadores de fosfato (FSF), bactérias totais (BT), bactérias solubilizadoras de fosfato (BSF), atividade da fosfatase ácida e matéria orgânica (MO) nas amostras coletadas em julho de 1998 e janeiro de 1999, na profundidade 0 a 5 cm, das três áreas avaliadas<sup>1</sup>.

Tratamento	Biomassa-P		FT (x10 <sup>4</sup> )		FSF (x10 <sup>3</sup> )		BT (x 10 <sup>5</sup> )		BSF (x 10 <sup>4</sup> )		Fosfatase		MO	
	Julho	Janeiro	Julho	Janeiro	Julho	Janeiro	Julho	Janeiro	Julho	Janeiro	Julho	Janeiro	Julho	Janeiro
<b>Área I</b>														
Veg. Espont.-PD	7,1	7,5	3,6	14,9	6,5	10,2	4,4	162,0	2,2	120,0	397	882	29	31
Veg. Espont.-PC	3,0	4,8	5,5	13,2	1,8	5,8	3,6	112,0	1,9	127,0	421	667	30	29
Guandu-PD	2,6	6,8	10,4	13,7	27,3	8,8	11,0	191,0	0,0 <sup>2)</sup>	246,0	439	887	29	33
Guandu-PC	3,4	7,8	3,6	11,1	4,8	10,0	9,9	88,8	4,0	56,4	425	660	30	29
Mucuna-PD	2,5	10,5	4,0	20,6	10,8	8,8	8,8	150,0	2,3	54,4	415	921	30	33
Mucuna-PC	3,3	7,0	4,3	11,5	5,9	10,2	9,5	94,7	3,9	65,4	435	665	29	29
Média PD	4,1a	8,3a	6,0a	16,4a**	14,8a**	9,3a	8,1a	167,7a***	1,5a	140,0a***	417a	897a***	29a	33a***
Média PC	3,2a	6,5a	4,5a	11,9b	4,2b	8,7a	7,7a	98,5b	3,3a	82,9b	427a	664b	30a	28b
<b>Área II</b>														
Milheto-PD	12,1	16,3	18,9	15,3	16,9	17,5	15,5	219,0	31,1	263,0	566	802	34	35
Nabo-forrag.-PD	4,9	2,8	10,3	24,6	39,0	22,0	16,1	211,0	24,9	220,0	570	787	38	38
PC	4,1	15,6	3,7	11,4	2,7	16,9	12,5	146,0	2,9	127,0	301	489	28	30
<b>Área III</b>														
Cerrado nativo	8,3	19,3	6,7	10,9	12,3	2,1	4,9	21,0	6,5	58,8	834	1165	36	44

<sup>1</sup> Biomassa-P em µg de P por g de solo; FT, FSF, BT e BSF em ufc por g de solo; Fosfatase ácida em µg de p-nitrofenol por g de solo por hora; Matéria orgânica em g por kg.

<sup>2</sup> não houve formação de colônias nas diluições utilizadas para contagem.

\*, \*\* e \*\*\*: significativos a 10%, 5% e 1% pelo teste t.

**Tabela 3.** Fósforo na biomassa microbiana (Biomassa-P), fungos totais (FT), fungos solubilizadores de fosfato (FSF), bactérias totais (BT), bactérias solubilizadoras de fosfato (BSF), atividade da fosfatase ácida e matéria orgânica (MO), nas amostras coletadas em julho de 1998 e janeiro de 1999, na profundidade 5 a 20 cm, das três áreas avaliadas <sup>1</sup>.

Tratamento	Biomassa-P		FT (x10 <sup>4</sup> )		FSF (x10 <sup>3</sup> )		BT (x 10 <sup>5</sup> )		BSF (x 10 <sup>4</sup> )		Fosfatase		MO	
	Julho	Janeiro	Julho	Janeiro	Julho	Janeiro	Julho	Janeiro	Julho	Janeiro	Julho	Janeiro	Julho	Janeiro
<b>Área I</b>														
Veg. Espont.-PD	1,5	17,2	2,6	10,3	2,2	4,3	3,5	94,0	0,0	50,6	323	576	28	27
Veg. Espont.-PC	5,5	7,0	2,3	11,2	2,0	2,9	2,8	103,0	0,8	128,0	385	628	27	27
Guandu-PD	2,0	18,1	2,4	11,2	0,8	2,9	3,2	101,0	2,2	74,5	421	587	28	28
Guandu-PC	4,0	9,8	2,2	15,1	1,2	11,7	4,0	113,0	2,8	167,0	410	585	28	29
Mucuna-PD	3,5	8,1	1,2	10,3	1,0	0,0 <sup>(2)</sup>	3,4	80,4	0,8	83,0	411	601	28	28
Mucuna-PC	2,0	13,6	2,1	14,3	0,4	10,4	6,1	80,1	2,2	63,7	419	648	27	28
Média PD	2,3a	14,5a*	2,1a	10,6a	1,3a	2,4b**	3,4a	91,8a	1,0a	69,4b**	385a	588a	2,8a	2,8a
Média PC	3,8a	10,1b	2,2b	13,5a	1,2a	8,3a	4,3a	98,7a	1,9a	119,6a	405a	620a	2,8a	2,8a
<b>Área II</b>														
Milheto-PD	3,6	4,4	4,7	7,9	5,9	0,4	12,4	65,7	23,6	56,9	419	426	29	28
Nabo-forrag.-PD	4,6	2,4	5,3	6,6	19,2	4,4	13,2	61,4	20,6	219,0	368	415	29	30
PC	2,8	9,7	4,1	6,9	5,8	0,0 <sup>(2)</sup>	9,0	94,4	1,2	25,8	369	458	28	25
<b>Área III</b>														
Cerrado nativo	6,0	10,8	0,8	5,6	0,0 <sup>(2)</sup>	2,2	0,5	21,5	0,0	8,6	727	912	28	27

<sup>1</sup> Biomassa-P em µg de P por g de solo; FT, FSF, BT e BSF em ufc por g de solo; Fosfatase ácida em µg de p-nitrofenol por g de solo por hora; Matéria orgânica em g por kg.

<sup>2</sup> Não houve formação de colônias nas diluições utilizadas para contagem.

\*, \*\* e \*\*\*: significativos a 10%, 5% e 1% pelo teste t.

**Tabela 4.** Resumo da análise de variância para espécies vegetais de cobertura/adubos verdes (Cob), sistemas de manejo do solo (Man), profundidades (Prof) e épocas de amostragem (Ep) no experimento com dois anos de estabelecimento do plantio direto (área I).

Fontes de variação	Níveis de probabilidade (P > F) <sup>1</sup>						
	Biomassa - P	FSF	FT	BSF	BT	Fosfatase	MO
Cob	0,8120	0,5116	0,7145	0,1350	0,6697	0,4664	0,9815
Man	0,3225	0,9069	0,6528	0,1618	0,1781	0,0002	0,0166
Cob x Man	0,5447	0,5629	0,7562	0,1304	0,9322	0,0422	0,2417
Prof	0,0321	0,0001	0,0001	0,4595	0,0297	0,0001	0,0001
Cob x Prof	0,5814	0,2467	0,6925	0,4491	0,9390	0,6430	0,6881
Man x Prof	0,9624	0,0142	0,0039	0,0681	0,0943	0,0001	0,1682
Cob x Man x Prof	0,2712	0,2128	0,0574	0,0909	0,8422	0,7274	0,7819
Ep	0,0001	0,0723	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,3870
Cob x Ep	0,4759	0,8912	0,1908	0,0531	0,3275	0,6156	0,8314
Man x Ep	0,0954	0,0159	0,9367	0,7290	0,0778	0,0112	0,0465
Cob x Man x Ep	0,2380	0,1000	0,0607	0,1690	0,7657	0,9735	0,5602
Prof x Ep	0,0093	0,2773	0,0419	0,8102	0,3040	0,0016	0,0035
Cob x Prof x Ep	0,4962	0,2989	0,1353	0,4683	0,5568	0,8582	0,7818
Man x Prof x Ep	0,2176	0,9865	0,1049	0,0339	0,0467	0,0055	0,0401

<sup>1</sup> FSF: Fungos solubilizadores de fosfato; FT: Fungos totais; BSF: Bactérias solubilizadoras fosfato; BT: Bactérias totais; Biomassa-P: conteúdo de P na biomassa microbiana; Fosfatase: atividade da fosfatase ácida; MO: teor de matéria orgânica.

Na área I, não houve efeitos das espécies vegetais avaliadas (quandu e mucuna) em relação à biomassa-P, conforme também verificado por [Rheinheimer et al. \(2000\)](#), no Sul do Brasil. Na área II, o tratamento nabo-forrageiro PD apresentou, na profundidade 0 a 5 cm, baixos valores de biomassa-P em comparação ao tratamento milho PD nas duas épocas avaliadas. Na estação chuvosa, esses valores foram inferiores, inclusive, aos do PC nas duas profundidades avaliadas ([Tabela 2](#)). Como o nabo-forrageiro é uma espécie que não se associa com fungos micorrízicos arbusculares ([SMITH; READ, 1997](#)), é possível que a diminuição do conteúdo de P na biomassa microbiana, nesse tratamento, possa estar associada à diminuição da população de fungos micorrízicos.

[Conte et al. \(2002\)](#), no Rio Grande do Sul e [Srivastava e Singh \(1991\)](#), na Índia, observaram maiores teores de biomassa-P em áreas nativas do que em áreas cultivadas. [Gijsman et al. \(1997\)](#) não observaram diferenças na biomassa-P entre áreas de savanas nativas na Colômbia e áreas há cinco anos com monocultura de arroz. Neste trabalho, as diferenças na biomassa-P entre a área com vegetação nativa e as áreas cultivadas não foram consistentes. Como a aplicação de fertilizantes fosfatados pode estimular o acúmulo de P na biomassa microbiana ([CONTE et al., 2002](#)), os dados do presente trabalho sugerem que, provavelmente, esse efeito também possa variar em razão da época e da profundidade da coleta das amostras, assim como do sistema de manejo e da planta de cobertura.

Nas contagens de fungos solubilizadores de fosfato (FSF) houve interação entre manejo e época na área I ([Tabela 4](#)). Na estação seca (julho), o número de FSF no PD foi de  $8,1 \times 10^3$  ufc  $g^{-1}$  de solo, significativamente superior (teste t,  $p < 0,1$ ) ao do PC ( $2,7 \times 10^3$  ufc  $g^{-1}$  de solo). Na estação chuvosa, não houve diferenças significativas entre esses sistemas de manejo. A interação entre manejo e profundidade também foi significativa ([Tabela 4](#)). Na profundidade de 0 a 5 cm, a diferença entre PD e PC foi significativa (teste t,  $p < 0,1$ ) com o PD propiciando a ocorrência de maiores populações de fungos totais ( $11,2 \times 10^4$  ufc  $g^{-1}$  solo) e solubilizadores de fosfato ( $12,1 \times 10^3$  ufc  $g^{-1}$  solo) em relação ao PC ( $8,2 \times 10^4$  ufc  $g^{-1}$  solo de fungos totais e  $6,4 \times 10^3$  ufc  $g^{-1}$  solo de fungos solubilizadores). A maior influência do PD ocorre próximo à superfície do solo onde a palhada permanece depois do ciclo das plantas de cobertura e da cultura principal. Esse ambiente é propício aos fungos, decompositores primários de resíduos vegetais na superfície do solo, especialmente, em condições de baixa umidade ([HENDRIX et al., 1986](#)). Os resultados da área II (seis anos de PD) confirmaram os obtidos na área I. Na estação seca e na profundidade de 0 a 5 cm, o PD, independentemente da cultura de cobertura, propiciou aumento



médio de dez vezes no número de FSF e de quatro vezes no número de FT em relação ao PC ([Tabela 2](#)).

Apesar do curto período de utilização de plantas de cobertura na área I, as contagens de FT e FSF foram influenciadas pelas espécies vegetais em razão do manejo de solo adotado e da época de amostragem, ou seja, a interação plantas de cobertura, manejo e época foi significativa ([Tabela 4](#)). Na estação seca, o guandu influenciou significativamente (teste t,  $p < 0,1$ ) as contagens de FT no sistema PD, apresentando uma população ( $6,4 \times 10^3$  ufc  $g^{-1}$  solo) superior à dos tratamentos com vegetação espontânea ( $3,1 \times 10^3$  ufc  $g^{-1}$  solo) e mucuna-cinza ( $2,6 \times 10^3$  ufc  $g^{-1}$  solo) que não diferiram entre si. Na estação chuvosa, nos tratamentos sob PC, o guandu influenciou a população de FSF (teste t,  $p < 0,1$ ), apresentando contagem significativamente superior ( $10,8 \times 10^3$  ufc  $g^{-1}$  solo) à do tratamento com vegetação espontânea, ( $4,4 \times 10^3$  ufc  $g^{-1}$  solo). [Abboud \(1986\)](#) também verificou maiores populações de FSF em parcelas com guandu, quando comparadas a outros cinco adubos verdes, sugerindo como possível explicação, a composição dos exudatos liberados na rizosfera do guandu. Na área II, as maiores contagens de FSF foram observadas no tratamento nabo-forrageiro PD, principalmente, na época seca ([Tabelas 2 e 3](#)), sugerindo uma associação entre nabo-forrageiro e FSF, de forma a compensar as desvantagens nutricionais proporcionadas pela ausência de associação micorrízica nessa espécie vegetal ([SMITH; READ, 1997](#)).

Em relação às contagens de bactérias solubilizadoras de fosfato (BSF) e de bactérias totais (BT) na área I, a interação entre manejo, profundidade e época de amostragem foi significativa ([Tabela 4](#)). Na amostragem de julho, não houve influência dos sistemas de manejo em nenhuma profundidade. Entretanto, em janeiro, na profundidade 0 a 5 cm, as contagens de BT e BSF no PD foram superiores em relação ao PC ([Tabela 2](#)). Na profundidade 5 a 20 cm, em relação ao número de BSF, o resultado foi oposto, com superioridade do PC em relação ao PD ([Tabela 3](#)). Resultados semelhantes foram obtidos por [Doran \(1980\)](#) que atribuiu o comportamento inverso das contagens de bactérias, nas duas profundidades, aos efeitos relacionados à incorporação dos resíduos vegetais nas áreas de PC. Na área II, desde a amostragem de julho já havia diferenciação entre os tratamentos sob PD e PC nas duas profundidades. Nessa amostragem, na profundidade 0 a 5 cm, as contagens de BSF nos tratamentos milho PD e nabo-forrageiro PD foram 11 e 9 vezes superiores em relação ao PC e na profundidade 5 a 20 cm essa diferença foi de 20 e 17 vezes, respectivamente ([Tabela 4](#)). Na estação chuvosa, embora menos acentuada, essa diferença persistiu nas duas profundidades.

Na área I, com dois anos de estabelecimento do PD, a interação entre plantas de cobertura e época foi significativa em relação às bactérias solubilizadoras de fosfato ([Tabela 4](#)). Independentemente do sistema de manejo e da profundidade, na amostragem de janeiro, o guandu proporcionou aumento significativo (teste t,  $p < 0,01$ ) nas contagens de BSF ( $136 \times 10^4$  ufc  $g^{-1}$  solo) em relação à mucuna ( $66,6 \times 10^4$  ufc  $g^{-1}$  solo) demonstrando seu potencial como planta condicionadora de maiores populações dessas bactérias. As contagens de BSF nos tratamentos com vegetação espontânea ( $106 \times 10^4$  ufc  $g^{-1}$  solo), também, foram menores, todavia, a diferença não foi significativa.

Em geral, os resultados das contagens de fungos e bactérias solubilizadoras de fosfato e de fungos e bactérias totais, na área de Cerrado nativo, foram inferiores aos das áreas cultivadas. Tais diferenças podem estar relacionadas à calagem e à adubação do solo que, ao aumentarem o pH e a disponibilidade de nutrientes nas áreas cultivadas, podem favorecer o desenvolvimento desses organismos ([NAHAS et al., 1994a](#)). Entretanto, a interpretação desses resultados também deve levar em conta as limitações do método de contagem em placas, o qual seleciona as espécies que formam colônias e se desenvolvem bem no meio de cultura escolhido (cultiváveis), em detrimento de outras que não se adaptam ou simplesmente não crescem no mesmo meio ([KUCEY, 1983](#)). De acordo com [Torsvik et al. \(1990\)](#), apenas pequena parte dos microrganismos do solo (0,1% a 0,5%) cresce em meios de cultura. É possível, portanto, que, no Cerrado nativo, haja, em maior número, microrganismos que não crescem em meio de cultura comparado às áreas cultivadas.

Na área I, a interação entre manejo, profundidade e época foi significativa em relação à atividade da fosfatase ácida ([Tabela 4](#)). Não houve diferença de atividade da fosfatase entre os sistemas de manejo na estação seca (julho) em nenhuma das profundidades de amostragem ([Tabelas 2 e 3](#)). Entretanto, na estação chuvosa, a atividade da fosfatase no sistema PD foi significativamente superior à do PC na profundidade 0 a 5 cm ([Tabela 2](#)). Na área II, com seis anos de estabelecimento do PD, os tratamentos milho PD e nabo-forrageiro PD apresentaram, em média, na profundidade 0 a 5 cm, níveis de atividade da fosfatase 89% e 62% superiores aos observados no PC nas amostragens de julho e janeiro respectivamente ([Tabela 2](#)). Na profundidade 5 a 20 cm, não foram constatadas diferenças entre os sistemas de manejo em nenhuma das duas épocas de amostragem ([Tabela 3](#)).

O tempo de estabelecimento acentuou as diferenças entre os sistemas de plantio direto e plantio com preparo convencional do solo em relação à atividade da

fosfatase ácida e às populações de microrganismos solubilizadores de fosfato. As maiores populações de fungos e bactérias (solubilizadores e totais) e as maiores atividades da fosfatase ácida, na profundidade de 0 a 5 cm, nos tratamentos com PD (áreas I e II) estão relacionadas à ausência de revolvimento do solo e ao conseqüente acúmulo de matéria orgânica no PD. Na área I, a interação entre manejo, profundidade e época foi significativa em relação à matéria orgânica ([Tabela 4](#)), indicando que, nas amostras coletadas em janeiro, os teores de matéria orgânica da profundidade 0 a 5 cm nos tratamentos com PD foram superiores em relação aos obtidos nas áreas de PC ([Tabela 2](#)). Na área II, foram observados maiores teores de matéria orgânica na profundidade de 0 a 5 cm nos tratamentos sob PD, em comparação ao PC, nas duas épocas de amostragem ([Tabela 2](#)). Resultados semelhantes também foram obtidos por [Doran \(1980\)](#); [Dick et al. \(1988\)](#); [Nahas et al. \(1994b\)](#); [Deng e Tabatabai \(1997\)](#) e [Mendes et al. \(2003\)](#). Além de estimular os microrganismos e ser ao mesmo tempo fonte de energia e nutrientes, a matéria orgânica também atua protegendo e mantendo as enzimas do solo em suas formas ativas, pela formação de complexos enzima-compostos húmicos ([DENG; TABATABAI, 1997](#)). No caso da fosfatase ácida, as maiores atividades nos tratamentos sob PD da Área II, na profundidade 0 a 5 cm, também podem estar relacionadas à aplicação localizada dos fertilizantes fosfatados. Embora essa aplicação localizada resulte na maior concentração de P nos 5 cm iniciais do PD ([Tabela 1](#)), a inibição das fosfatases não é tão acentuada como no PC onde os fertilizantes são misturados ao solo ([CONTE et al., 2002](#); [MENDES et al., 2003](#)).

Embora o tipo de vegetação, por meio da quantidade e qualidade de seu material orgânico possa influir na atividade enzimática do solo ([DICK et al., 1988](#); [DICK; TABATABAI, 1993](#)), não houve, no presente trabalho, efeito significativo das espécies vegetais de cobertura na atividade da fosfatase ácida nas áreas cultivadas. Na área I, apesar de a interação entre espécies de cobertura e manejo ter sido significativa ([Tabela 4](#)), as diferenças entre as espécies de cobertura foram pouco expressivas ([Tabelas 2 e 3](#)), o que pode estar relacionado à baixa produção de matéria seca por essas espécies.

No presente trabalho, os elevados níveis de atividade da fosfatase no Cerrado nativo, associados aos baixos teores de P (Mehlich I) que variaram de 1,0 a 0,3 ppm nas profundidades 0 a 5 cm e 5 a 20 cm, respectivamente ([Tabela 1](#)), evidenciam que a mineralização do P orgânico nas áreas nativas é um importante processo de disponibilização desse elemento, conforme também verificado por [Conte et al. \(2002\)](#) no Sul do Brasil.

O estabelecimento de índices e parâmetros sensíveis no acompanhamento do impacto do uso do solo em relação à sua fertilidade e à sua qualidade como um todo têm sido objeto de vários estudos ([DICK, 1994](#); [TRASAR-CEPEDA et al., 1998](#)). Entre os indicadores avaliados neste trabalho, a atividade da fosfatase ácida merece destaque por causa da sua sensibilidade em detectar alterações provocadas no solo pelos sistemas de manejo e sazonalidade do clima e, portanto, poderá ser útil em programas de avaliação da qualidade do solo, ampliando o enfoque sobre fertilidade do solo com a inclusão do componente biológico.

## Conclusões

1. O sistema de plantio direto proporciona um ambiente mais favorável à atividade da fosfatase ácida e à ocorrência de fungos e bactérias solubilizadores de fosfato e totais, na profundidade de 0 a 5 cm.
2. O gandu estimula a ocorrência de fungos e bactérias solubilizadores de fosfato.

## Agradecimentos

Ao técnico agrícola Osmar Teago de Oliveira; aos funcionários do laboratório de Microbiologia do Solo da Embrapa Cerrados: Emílio J. Taveira, Maria das Dores Silva, Odete J. dos Santos e Vilderete C. Alves, pelo apoio na realização das amostragens de solo e análises de laboratório.

## Referências Bibliográficas

ABBOUD, A. C. S. **Eficiência da adubação verde associada a fosfato natural de Patos de Minas**. 1986. 298 f. Dissertação (Mestrado Agronomia) – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1986.

BROOKES, P. C.; POWLSON, D. S.; JENKINSON, D. S. Measurement of microbial biomass phosphorus in soil. **Soil Biology and Biochemistry**, Oxford, v.14, p. 319-329, 1982.

BROOKES, P. C.; POWLSON, D. S.; JENKINSON, D. S. Phosphorus in the soil microbial biomass. **Soil Biology and Biochemistry**, Oxford, v.16, p.169-175, 1984.

BUCHANAN, M.; KING, L. D. Seasonal fluctuations in soil microbial biomass carbon, phosphorus, and activity in no-till and reduced-chemical-input maize agroecosystems. **Biology and Fertility of Soils**, Berlin, v. 13, p. 211-217, 1992.

COCHRAN, W. G.; COX, G. M. **Experimental designs**. New York: John Wiley, 1957. 611 p.

CONTE, E.; ANGHINONI, I.; RHEINHEIMER, D. S. Fósforo da biomassa microbiana e atividade de fosfatase ácida após aplicação de fosfato em solo no sistema plantio direto. **Revista Brasileira de Ciência do Solo**, Viçosa, v. 26, p. 925-930, 2002.

DENG, S. P.; TABATABAI, M. A. Effect of tillage and residue management on enzyme activities in soils: 3. phosphatases and arylsulfatase. **Biology and Fertility of Soils**, Berlin, v. 24, n. 2, p. 141-146, 1997.

DICK, R. P. Soil enzyme activities as indicators of soil quality. In: DORAN, J. W.; COLEMAN, D. C.; BEZDICEK, D. F.; STEWART, B. A. (Ed.). **Defining soil quality for a sustainable environment**. Madison: Soil Science Society of America, 1994. p. 107-124.

DICK, R. P.; RASMUSSEN, P. E.; KERLE, E. A. Influence of long term residue management on soil enzyme activities in relation to soil chemical properties of a wheat-fallow system. **Biology and Fertility of Soils**, Berlin, v. 6, p. 159-164, 1988.

DICK, W. A.; TABATABAI, M. A. Significance and potential uses of soil enzymes. In: METTING JUNIOR, F. B. (Ed.). **Soil microbial ecology applications in agricultural and environmental management**. New York: Marcel Dekker, 1993. p. 95-127.

DORAN, J. W. Soil microbial and biochemical changes associated with reduced tillage. **Soil Science Society of America Journal**, Madison, v. 44, p. 765-771, 1980.

GIJSMAN, A. J.; OBERSON, A.; FRIESEN, D. K.; SANZ, J. I.; THOMAS, R. J. Nutrient cycling through microbial biomass under rice-pasture rotations replacing native savanna. **Soil Biology and Biochemistry**, Oxford. v. 29, n. 9, p.1433-1441, 1997.

GUERRA, J. G. M.; FONSECA, M. C.; ALMEIDA, D. L.; DE-POLLI, H.; FERNANDES, M. S. Conteúdo de fósforo da biomassa microbiana de um solo

cultivado com *Brachiaria decumbens* stapf. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, Brasília, v. 30, n. 4, p. 543-551, 1995.

HE, Z. L.; WU, J.; O'DONNELL, A. G. O.; SYERS, J. K. Seasonal responses in microbial biomass carbon, phosphorus and sulphur in soils under pasture.

**Biology and Fertility of Soils**, Berlin, v. 24, p. 421-428, 1997.

HENDRIX, P. F.; PARMELEE, R.W.; CROSSLEY JR., D. A.; COLEMAN, D. C.; ODUM, E. P.; GROFFMAN, P. M. Detritus food webs in convencional and no-tillage agroecosystems. **Bioscience**, Washington, v. 36, p. 374-380, 1986.

KUCEY, R. M. N. Phosphate-solubilizing bacteria and fungi in various cultivated and virgin Alberta soils. **Canadian Journal of Soil Science**, Ottawa, v. 63, p. 671-678, 1983.

MENDES, I. C.; SOUZA, L. V.; RESCK, D. V. S.; GOMES, A. C. Propriedades biológicas em agregados de um LE sob plantio convencional e direto no Cerrado. **Revista Brasileira de Ciência do Solo**, Viçosa, v. 27, p. 435-443, 2003.

MILLIKEN, G. A.; JOHNSON, D. E. **Analysis of messy data: designed experiments**. New York: Chapman & Hall, 1992. v. 1.

MIRANDA, J. C. C. de; MIRANDA, L. N. Micorriza arbuscular. In: VARGAS, M. A. T.; HUNGRIA, M. (Ed.). **Biologia dos solos dos Cerrados**. Planaltina, DF: Embrapa-CPAC, 1997. p. 67-111.

NAHAS, E.; CENTURION, J. F.; ASSIS, L. C. Efeito de características químicas dos solos sobre os microrganismos solubilizadores de fosfato e produtores de fosfatases. **Revista Brasileira de Ciência do Solo**, Campinas, v. 18, p. 49-53, 1994a.

NAHAS, E.; CENTURION, J. F.; ASSIS, L. C. Microrganismos solubilizadores de fosfato e produtores de fosfatases de vários solos. **Revista Brasileira de Ciência do Solo**, Campinas, v. 18, p. 43-48, 1994b.

PAUL, E. A.; CLARK, F. E. **Soil microbiology and biochemistry**. San Diego: Academic Press, 1996. 340 p.

RHEINHEIMER, D. S.; ANGHINONI, I.; CONTE, E. Fósforo da biomassa microbiana em solos sob diferentes sistemas de manejo. **Revista Brasileira de Ciência do Solo**, Viçosa, v. 24, p. 589-597, 2000.

SATTERTHWAITE, F. E. An approximate distribution of estimates of variance components. **Biometrics Bulletin**, Fort Collins, v. 2, p. 110-114, 1946.

SINGH, J. S.; RAGHUBANSHI, A. S.; SINGH, R. S.; SRIVASTAVA, S. C. Microbial biomass acts as a source of plant nutrients in dry tropical forest and savanna. **Nature**, London, v. 338, p. 499-500, 1989.

SMITH, S. F.; READ, D. J. Mycorrhizal symbiosis. 2nd ed. Cambridge, Inglaterra: Academic Press, 1997. 605 p.

SRIVASTAVA, S. C.; SINGH, J. S. Microbial C, N and P in dry tropical forest soils: effects of alternative land-uses and nutrient flux. **Soil Biology and Biochemistry**, Oxford, v. 23, p. 117-124, 1991.

TABATABAI, M. A. Soil enzymes. In: WEAVER, R. W.; ANGLE, J. S.; BOTTOMLEY, P. S. **Methods of soil analysis: microbiological and biochemical properties**. Madison: Soil Science Society of America, 1994. p. 775-883.

TISDALE, S.; NELSON, W. L.; BEATON, J. D.; HAVLIN, J. H. **Soil fertility and fertilizers**. New York: Macmillan, 1993. 634 p.

TORSVIK, V.; GORSOYR, J.; DAEE, F. L. High diversity in DNA soil bacteria. **Applied and Environmental Microbiology**, Washington, v. 56, p. 782-787, 1990.

TRASAR-CEPEDA, C.; LEIRÓS, C. GIL-SOTRES, F.; SEOANE, S. Towards a biochemical quality index for soils: An expression relating several biological and biochemical properties. **Biology and Fertility of Soils**, Berlin, v. 26, p. 100-106, 1998.