



**Pesquisa com Guaranazeiro
na Embrapa Amazônia
Ocidental: Status Atual e
Perspectivas**



*José Clério Rezende Pereira
Murilo Rodrigues de Arruda*
Editores Técnicos

Embrapa

**Pesquisa com Guaranazeiro
na Embrapa Amazônia
Occidental: Status Atual e
Perspectivas**

*Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Embrapa Amazônia Ocidental
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento*

Pesquisa com Guaranazeiro na Embrapa Amazônia Ocidental: Status Atual e Perspectivas

*José Clério Rezende Pereira
Murilo Rodrigues de Arruda
Editores Técnicos*

*Embrapa Amazônia Ocidental
Manaus, AM
2007*

Exemplares desta publicação podem ser adquiridos na:

Embrapa Amazônia Ocidental

Rodovia AM-010, km 29, Estrada Manaus/Itacoatiara

Caixa Postal 319, CEP 69010-970 - Manaus-AM

Fone: (92) 3621-0300

Fax: (92) 3621-0320

www.cpa.embrapa.br/sac/

Comitê de Publicações da Unidade

Presidente: *Celso Paulo e Azevedo*

Secretária: *Gleise Maria Teles de Oliveira*

Membros: *Cintia Rodrigues de Souza*

João Ferdinando Barreto

Luadir Gasparotto

Marcos Vinícius Bastos Garcia

Maria Augusta Abtíbol Brito

Maria Perpétua Beleza Pereira

Nelcimar Reis Sousa

Paula Cristina da Silva Ângelo

Roger Crescêncio

Rogério Perin

Revisor de texto: *Síglia Regina dos Santos Souza*

Normalização bibliográfica: *Maria Augusta Abtíbol Brito*

Diagramação e arte: *Gleise Maria Teles de Oliveira*

Animação: *Doralice Campos Castro*

Fotos da Capa: *Murilo Rodrigues de Arruda*

1ª edição

Todos os direitos reservados.

A reprodução não autorizada desta publicação, no todo ou em parte, constitui violação dos direitos autorais (Lei nº 9.610).

Cip-Brasil. Catalogação-na-publicação.

Embrapa Amazônia Ocidental.

Pereira, José Clério Rezende

Pesquisa com guaranazeiro na Embrapa Amazônia Ocidental: status atual e perspectivas [recurso eletrônico] / editado por José Clério Rezende Pereira e Murilo Rodrigues de Arruda. Manaus: Embrapa Amazônia Ocidental, 2007, 246 p.

1 CD-Book : color. ; 4 ¾ pol.

ISBN 978-85-89111-08-9

1. Guaraná. 2. Pesquisa. I. Arruda, Murilo Rodrigues de. II. Título.

CDD 633.7

Enraizamento de Estacas de Clones de Guaranazeiro Tratados com Ácido Indol-3-Butírico (AIB)

A. L. Atroch¹; M. da S. Cravo²; J. A. dos Santos²

Introdução

O guaranazeiro (*Paullinia cupana* var. *sorbilis*) pode ser propagado pelas vias sexuada e assexuada, por estaquia. Segundo Carvalho et al. (1982), a propagação do guaranazeiro por sementes é dificultada devido às suas características de perder rapidamente a viabilidade, não suportando desidratação acentuada nem baixa temperatura, enquadrando-se no grupo de sementes recalcitrantes. Além disso, a constituição genética altamente heterozigótica do guaranazeiro faz com que as características desejáveis sejam perdidas imediatamente, se forem propagadas por sementes, devido à segregação dos genes. Daí a importância da propagação vegetativa por estaquia, que apresenta como vantagens, sob o ponto de vista agrônomo, segundo Fachinello et al. (1995), a obtenção de muitas plantas a partir de uma única planta matriz em curto espaço de tempo; é uma técnica de baixo custo e de fácil execução. Afirmam, inclusive, que a propagação por estacas praticamente não apresenta problemas. Entretanto, Almeida et al. (1979), relatam que a estaquia produz plantas menos vigorosas do que as de pé franco ou enxertados, em consequência do sistema radicular fasciculado, o qual é inadequado a algumas condições climáticas, como por exemplo em regiões de seca prolongada.

Sob o ponto de vista do melhoramento genético, a propagação vegetativa oferece uma série de vantagens, por exemplo, as plantas que apresentam características desejáveis podem ser selecionadas e fixadas geneticamente (clonadas) e reproduzidas indefinidamente em qualquer fase do programa de melhoramento genético, seja qual for o método de melhoramento utilizado, com expressivo ganho de tempo, principalmente nas espécies de ciclo longo. Outra vantagem é a exploração do vigor heterótico de híbridos artificiais ou naturais, pois essas combinações genéticas são fixadas pelo processo de propagação vegetativa.

A principal desvantagem da propagação vegetativa, sob o ponto de vista genético, é a tendência de redução da variabilidade genética, pela não utilização de níveis intermediários de variabilidade genética, pois o melhorista

¹Pesquisador da Embrapa Amazônia Ocidental, Manaus-AM, andre.atroch@cpaa.embrapa.br

²Pesquisador da Embrapa Amazônia Oriental, Belém-PA.

procura sempre o máximo de expressão dos caracteres em uma única planta para fazer a clonagem.

A ação das auxinas nas estacas é descrita por Tizio (1980) e Chaussat & Courduroux (1980), em duas etapas: estimulação do crescimento e, com o aumento das auxinas, haveria síntese de etileno que inibe o enraizamento. Para uma estaca emitir raízes são necessários fatores endógenos e condições ambientais adequadas. Dentre os fatores endógenos os reguladores de crescimento são os mais importantes. Nesse caso as auxinas apresentam maior efeito na formação de raízes em estacas. Algumas auxinas são comuns nas plantas, como o ácido indol-3-acético (AIA), outras substâncias são de origem exógena (sintéticas), como o ácido indolbutírico (AIB), que apresenta uma eficiência maior do que o AIA. Entretanto, o excesso de auxina exógena pode inibir a formação de raízes (Fachinello et al., 1995).

Desse modo, a utilização do AIB no enraizamento de estacas é bastante controvertido. Resultados obtidos por Shiembo et al. (1996) concluíram que não houve efeito do AIB na porcentagem de enraizamento e no número de raízes em *Irvingia gabodensis*, embora o desenvolvimento radicular tenha sido mais rápido em altas concentrações de AIB. Biasi et al. (1997), com videira, indicam que não é necessário o uso de auxinas para estimular o enraizamento. Pasinato et al. (1998) concluíram que o AIB não aumentou o percentual de enraizamento de estacas de ameixeira (*Prunus spp.*). Negash (2002) relata que, em *Juniperus procera*, a porcentagem de estacas enraizadas e o número de raízes declina rapidamente quando as estacas são tratadas com AIB a 0,4%. Por outro lado, Rufato & Kersten (2000) assinalaram efeitos benéficos do AIB no enraizamento de estacas de pessegueiro. E Biasi et al. (2000) indicam que o AIB aumentou o enraizamento de estacas das cultivares de pessegueiro Coral e Ouro e de nectarina Sun Red, mas não foi eficiente para a estaquia semilenhosa do pessegueiro Ágata.

No guaranazeiro Correa & Stolberg (1981) justificam a propagação por estaquia com uso de fitormônio (AIB) pela facilitação da seleção de indivíduos superiores e manutenção dos caracteres desejados.

Esse trabalho teve como objetivo avaliar o comportamento quanto ao enraizamento de clones de guaranazeiro submetidos a diversas concentrações do ácido indolbutírico.

Metodologia

O experimento foi conduzido no ano de 1999 pela Embrapa Amazônia Ocidental, nos viveiros do Campo Experimental de Manaus e do Campo Experimental de Maués. O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado, em um arranjo fatorial de 11 clones de guaranazeiro e 6 doses do fitormônio AIB, com 4 repetições. A parcela foi formada por 10 estacas herbáceas oriundas do ramo do ano, com duas gemas e um par de meio folíolo, retiradas de matriz sadia e de bom desenvolvimento vegetativo. Foram utilizados, os clones de guaranazeiro CMU619, BRS-Amazonas, BRS-CG611 (Testemunha), CIR196, BRS-CG608, CMU723, CMU375, CMU606, BRS-CG505, CMA514 e CIR203. As doses de ácido indolbutírico (AIB) foram 0, 2000, 4000, 6000, 8000 e 10000 ppm. As estacas foram coletadas e preparadas conforme Embrapa (1998) e ficaram em viveiro sob irrigação intermitente por nebulização e tela sombrite, com 70% de sombreamento. Após 90 dias foi realizada a avaliação da porcentagem de enraizamento. Os dados foram transformados segundo $\sqrt{\chi + 0,5}$. O software SANEST foi utilizado para realização das análises de variância e de regressão polinomial. A fonte de variação local foi confundida com o erro, que foi estimado por meio da testemunha comum, similarmente à análise de variância com alguns tratamentos comuns.

Resultados e Discussão

A Tabela 1 contém o resumo da análise de variância para a característica porcentagem de enraizamento de clones de guaranazeiro submetidos a diferentes concentrações de AIB.

Tabela 1. Resumo da análise de variância conjunta para a característica porcentagem de enraizamento de clones de guaranazeiro submetidos a diferentes concentrações de AIB. Embrapa Amazônia Ocidental, Manaus, 2002.

Fonte de Variação	GL	QM
Clones Ajust.	10	58,3799**
AIB Ajust.	5	2,9736NS
- Regressão Linear	1	14,1442**
- Regressão Quadrática	1	0,3411NS
- Desvios da Regressão	3	5,4114NS
Clones x AIB Ajust.	50	2,5225NS
Residuo	216	2,4148
CV(%)		21,56

Houve variação genética para o caráter porcentagem de enraizamento. O efeito do AIB foi linear, sendo o modelo de regressão adequado para explicar a variação entre os níveis de AIB. A interação entre clones e doses de AIB foi não significativa, indicando que os clones se comportam da mesma forma de um nível para outro de AIB, ou seja, não existe troca de classificação entre os clones quando se muda o nível do hormônio. Devido à interação clones x doses de AIB ter sido não significativa, não existe necessidade de realizar uma regressão dos níveis de AIB para cada clone.

A Figura 1 contém a linha de tendência da resposta da porcentagem de enraizamento das estacas dos clones de guaranzeiro em função do aumento dos níveis de AIB. Verifica-se que a porcentagem de enraizamento diminui com o aumento das doses de AIB. O ajuste linear foi de média magnitude ($R^2 = 0,4605$), mostrando que somente 46% da variação na porcentagem de enraizamento observada deveu-se à variação dos níveis de AIB, porém os desvios da regressão não foram significativos, indicando que os pontos podem ser ajustados de acordo com o modelo linear.




Fig. 1. Regressão linear para a variável porcentagem de enraizamento em estacas de guaranzeiro em função dos níveis de AIB. Embrapa Amazônia Ocidental, Manaus, 2002.

A Tabela 2 contém as médias transformadas segundo $\sqrt{\chi + 0,5}$ e médias originais da porcentagem de enraizamento dos clones, independente da dose de AIB, bem como o teste de Scott & Knott (1974) a 5% de probabilidade, agrupando os clones em quatro classes, de acordo com a facilidade de enraizamento, em classe 1, de fácil enraizamento; classe 2, de enraizamento mediano; classe 3, de difícil enraizamento e classe 4 de péssimo enraizamento.

Tabela 2. Médias transformadas para $\sqrt{\chi} + 0,5$ e médias originais da porcentagem de enraizamento de estacas de guaranazeiro e agrupamento dos clones segundo a facilidade de enraizamento. Embrapa Amazônia Ocidental, Manaus, 2002.

Clones	Médias Transf.	Médias Orig.	Scott e Knott a 5%*	Classe
CMU619	9,26	85,17	A	1
BRS-Amazonas	9,05	81,41	A	1
BRS-CG611	8,27	67,89	B	2
CIR196	7,85	61,15	B	2
BRS-CG608	7,75	59,65	B	2
CMU723	7,63	57,78	B	2
CMU375	7,28	52,51	B	2
CMU606	6,26	38,77	C	3
BRS-CG505	6,14	37,18	C	3
CMA514	5,61	31,02	C	3
CIR203	4,14	16,63	D	4

*Médias seguidas pelas mesmas letras não diferem entre si pelo teste de Scott & Knott a 5% de probabilidade.

Um dos principais fatores de sucesso na implantação de um plantio com espécies perenes é a disponibilidade de mudas de alto padrão genético e fitossanitário. No caso da utilização de hormônios estimuladores do enraizamento, de custo elevado, deve-se ter o máximo de cuidado para não inviabilizar o empreendimento, além disso, a utilização de materiais genéticos que possuem dificuldades de enraizamento, mesmo submetidos a elevadas doses de hormônios deve ser evitada, pois esses dois fatores ocorrendo juntos levaria à falência qualquer viveirista.

Na cultura do guaranazeiro a utilização do hormônio AIB em escala comercial é recente, porém, a quantidade de mudas formadas anualmente vem aumentando significativamente.

As pesquisas com a cultura do guaranazeiro em relação a utilização do AIB na formação de mudas são poucas e não conclusivas. Castro & Ferreira (1973) afirmaram que nada poderiam concluir sobre as vantagens ou não do uso do AIB. Correa & Stolberg (1981) também não concluíram nada sobre a utilização do AIB, apenas afirmaram ser possível a obtenção de mudas de guaranazeiro pelo processo de estaquia e que os tipos de estacas e matrizes influenciaram no percentual de enraizamento. Rodrigues & Lucchesi (1987) citam que estacas herbáceas de guaranazeiro capeadas sem a utilização de

AIB apresentaram maior percentual de enraizamento, entretanto a adição de AIB aumentou o número de raízes nessas estacas.

A idade das estacas é fator de grande importância para o enraizamento. Correa e Stolberg (1981), trabalhando com estacas de guaranazeiro herbáceas, semi-lenhosas e lenhosas oriundas do ramo do ano, com duas gemas e um par de meio folíolo, tratadas por via seca com uma mistura de Seradix (com 2% de ácido indolbutírico) e Captam 50%, em proporção de 1:2, concluíram preliminarmente que as estacas dos tipos herbáceas e semi-lenhosas enraizaram mais que as do tipo lenhosa, sendo mais apropriadas para a propagação vegetativa do guaranazeiro. Kato et al. (1983), utilizando a mistura de ácido indolbutírico com Captam 50% na proporção de 1:2, obtiveram 66% de enraizamento com estacas herbáceas. Correa et al. (1983), utilizando ácido indolbutírico nas concentrações de 2.000, 4.000 e 6.000 ppm em estacas herbáceas de guaranazeiro com uma e duas gemas obtiveram 100, 87 e 90% de enraizamento, para as estacas com uma gema e 93, 80 e 87% de enraizamento, para as estacas com duas gemas.

Depreende-se então que a utilização de AIB na formação de mudas de guaranazeiro ainda não foi esclarecida pelas pesquisas realizadas e que mais trabalhos têm que ser desenvolvidos para a total compreensão da propagação vegetativa do guaranazeiro por estaquia.

De acordo com os resultados obtidos nesse trabalho é possível afirmar que o uso do AIB em altas dosagens inibe o enraizamento de estacas de clones de guaranazeiro. Também é possível afirmar que clones que apresentam dificuldades de enraizamento não respondem ao aumento da dosagem de AIB, e clones de fácil enraizamento dispensam a utilização de AIB.

Literatura Consultada

ALMEIDA, J.I.L.; BARROS, L.M.; LIMA, V.P.M.S. Estaquia como método de propagação vegetativa para o cajueiro *Anacardium occidentale* L. In: Empresa de Pesquisa Agropecuária do Ceará. **RELATÓRIO ANUAL DE PESQUISA**, Fitotecnia, Fortaleza, 1978. p.199-204.

BIASI, L.A.; POMMER, C.V.; PINO, P.A.G.S. Propagação de porta-enxertos de videira mediante estaquia semilenhosa. **Bragantia**, Campinas, v.52, n.2, 1997.

BIASI, L.A.; STOLTE, R.E.; SILVA, M.F. Estaquia de ramos semilenhosos de pessegueiro e nectarina. . **Revista Brasileira de Fruticultura**, Jaboticabal, v.22, n.3, p.421-425, dez., 2000.

CARVALHO, J.E.U.; FRAZÃO, D.A.C.; FIGUEIREDO, F.J.C.; OLIVEIRA, R.P. **Conservação da viabilidade de sementes de guaranazeiro *Paullinia cupana* var. *sorbilis* (MART.) DUCKE**. Belém: EMBRAPA-CPATU, 1982.12p. (EMBRAPA-CPATU, Circular Técnica, 35).

CASTRO, A.M.G.; FERREIRA, M.A. **Enraizamento de estacas de guaranazeiro**. Manaus: Serviço de Extensão Rural Associação de Crédito e Assistência Rural do Amazonas, 1973. 25p.

CHAUSSAT, R.; COURDUROUX. Régulateurs de croissance et multiplication végétative. In: Chaussat, R.; Bigot, B. **La multiplication végétative des plants supérieures**. Paris: Gauthiers Villars, 1980. p..31-50.

CORREA, M.P.F.; STOLBERG, A.G.Z. **Propagação vegetativa do guaranazeiro**. Manaus: EMBRAPA-UEPAE DE MANAUS, 1981.4p. (EMBRAPA-UEPAE DE MANAUS, Pesquisa em Andamento, 23).

CORREA, M.P.F.; ESCOBAR, J.R.; FONSECA, C.E.L.; DANTAS, J.C.R. Propagação vegetativa do guaranazeiro (*Paullinia cupana* (Mart.) Ducke). In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DO GUARANÁ, 1, Manaus, outubro, 1982. **Resumos**. Manaus: EMBRAPA UEPAE DE MANAUS, 1983.

EMBRAPA. Centro de Pesquisa Agroflorestal da Amazônia Ocidental. **SISTEMA DE PRODUÇÃO PARA GUARANÁ**. 3. ed. Manaus, 1998. 34p. (EMBRAPA-CPAA, Documentos, 13).

FACHINELLO, J.C.; HOFFMANN, A.; NACHTIGAL, J.C.; KERSTEN, E.; FORTES, G.R..L. **Propagação de plantas frutíferas de clima temperado**. 2.ed. Pelotas: Editora UFPEL, 1995. 179p.

KATO, A. K.; MULLER, C.H.; CARVALHO, J.E.U. Efeito da planta matriz no enraizamento de estacas de guaraná (*Paullinia cupana* var. *sorbilis* (Mart.) Ducke). In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DO GUARANÁ, 1, Manaus, outubro, 1982. **Resumos**. Manaus: EMBRAPA UEPAE DE MANAUS, 1983.

NEGASH, L. Successful vegetative propagation techniques for the threatened African pencil cedar (*Juniperus procera* Hoehchst. ex Endl). **Forest Ecology and Management**, n.161, p.53-64, 2002.

PASINATO, V.; NACHTIGAL, J.C.; KERSTEN, E. Enraizamento de estacas lenhosas de cultivares de ameixeira (*Prunus* spp.), em condições de campo. **Scientia Agricola**, Piracicaba, v.55, n.2, May/Aug., 1998.

RODRIGUES, J.E.L.F.; LUCCHESI, A.A. Propagação vegetativa do guaranazeiro (*Paullinia cupana* (Mart.) Ducke) através de estacas induzidas (capeadas) e com ácido indolilbutírico. In: E.S.A. "Luiz de Queiroz". **Anais...**, Piracicaba: : E.S.A. "Luiz de Queiroz", 1987. v.54, p.1-21.

RUFATO, L.; KERSTEN, E. Enraizamento de estacas de pessegueiro (*Prunus persica* (L.) Batsch, cvs Esmeralda e BR2, submetidas à estratificação e ao ácido indolbutírico. **Revista Brasileira de Fruticultura**, Jaboticabal, v.22, n.2, p.191-194, ago., 2000.

SCOTT, A.J.; KNOTT, M. A cluster analysis method for grouping means in the analysis of variance. **Biometrics**, n. 30, p.507-512, Sep., 1974.

SHIEMBO, P.N.; NEWTON, A.C.; LEAKEY, R.R.B. Vegetative propagation of *Irvingia gabodensis*, a West African fruit tree. **Forest Ecology and Management**, n.87, p.185-192, 1996.

TIZIO, R.M. Aplicaciones agronómicas de los reguladores de crecimiento. In: Sívori, E.M.; Montaldi, E.; Caso, O. **Fisiología vegetal**. Buenos Aires: Hemisferio Sur, 1980.p. 553-559.