

FL 970824
Ovinos barriga negra.

0

FL-1997.00124



CPAF-RR-2633-1

EMBRAPA
OITAVA

EMBRAPA
CPAF-Roraima
Setor de Difusão de Tecnologia
BR-174, Km 8 - Distrito
Industrial
69.301-970 - Boa Vista - RR

OVINOS BARRIGA NEGRA

EMBRAPA - SID / CPAF / RR.

Origem: Os ovinos Barriga Negra de Barbados (Barbados Blackbelly Sheep) são originários da Ilha de Barbados no caribe. São resultantes de cruzamentos de raças deslanadas africanas, trazidas para Barbados nos navios negreiros provenientes da Costa Oeste Africana, com raças lanadas europeias, introduzidas por colonizadores ingleses em 1624, e que durante mais de três séculos sofreram miscigenação e adaptação as condições locais, originando o ovino de características uniformes que hoje constitui a raça Barriga Negra.

Características: A cor da pelagem varia de marron-avermelhada-escura à marron clara nas regiões superiores e laterais do corpo, com pontos escuros ao redor dos olhos, enquanto que a parte inferior da barriga, da mandíbula e das patas é completamente preta. Os machos adultos apresentam um colarinho e uma crina de pelos longos, duros e grossos.

O tamanho dos ovinos barriga negra é médio, sendo que os machos adultos tem altura média que varia de 75 a 81 cm, enquanto que as fêmeas tem 60 a 70 cm.

O peso varia de 50 a 70 kg nos machos adultos, e de 32 a 43 kg nas fêmeas.

Há ausência de chifres em ambos sexos e a cauda é longa, geralmente com a ponta branca.

Fertilidade: A característica mais importante da raça Barriga Negra é a alta fertilidade das ovelhas, sendo comum a ocorrência de partos duplos e triplos, o que não ocorre com a maioria das raças ovinas tropicais, nas quais o comum é apenas um cordeiro por parto. O intervalo entre partos é de oito meses, sendo possível a ocorrência de três partos a cada dois anos.

Adaptabilidade: Os ovinos Barriga Negra são resistentes e bem adaptados ao ambiente tropical semi-árido, no qual tem sido criado nos últimos séculos. Toleram variações moderadas de temperatura e com o tempo mostram algum grau de adaptação fisiológica.

Os ovinos Barriga Negra se adaptam bem às condições edafoclimáticas do cerrado de Roraima, que apresenta temperatura média anual de 27° C e pastagem nativa de baixo valor nutritivo, condições bastante semelhantes às da Ilha de Barbados.

Os ovinos Barriga Negra foram introduzidos em Roraima, provavelmente pela fronteira com os países vizinhos, Guyana e Venezuela, sendo comum encontrar-se animais com características da raça em diversas fazendas localizadas no Estado. Este fato levou a Embrapa a avaliar o comportamento produtivo e reprodutivo de animais da raça, comparando-os com raças deslanadas provenientes do nordeste brasileiro, quais sejam, Morada Nova e Santa Inês. Pelas condições do estudo, em pastagem nativa, é possível afirmar que essa raça é uma excelente alternativa para criações de animais de médio porte. Além desses resultados a pesquisa também dispõe de informações sobre épocas adequadas para a vermifugação estratégica de ovinos nas condições de lavrado de Roraima.

Sérgio Círio Pereira de Siqueira
Zootecnista, pesquisador da Embrapa/CPAF-
Roraima