



Embrapa

*Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Centro Nacional de Pesquisa de Trigo
Rodovia BR 285, km 294 – Caixa Postal 451
99001-970 Passo Fundo, RS
Fone: 54 3316 5800 Fax 54 3316 5801
E-mail: sac@cnpt.embrapa.br*

*Embrapa Transferência de Tecnologia
Escritório de Negócios de Passo Fundo, RS
e-mail: enpfb.snt@embrapa.br
Fone: 54 3311 3666*

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

BRS Taura RR



Destaques

- Bom crescimento e desenvolvimento em semeadura antecipada.
- Resistente a campo à podridão radicular de fitóftora.
- Moderadamente resistente a *Meloidogyne javanica*.
- Tolerante a glifosato.

Produzido pela equipe de Comunicação Empresarial da Embrapa Trigo
Responsabilidade Técnica: Paulo Fernando Bertagnolli, Leila Maria Costamilan e Lisandra Lunardi
2008 - Tiragem: 2.000 exemplares

Ministério da
Agricultura, Pecuária
e Abastecimento



FUNDAÇÃO
PRÓ-SEMENTES

Embrapa
Trigo

Lançamento

BRS Taura RR

A soja BRS Taura RR é uma nova opção de ciclo médio para o agricultor. Filha de BRS 154, possui ampla adaptação e ótima sanidade.

Ciclo

- Médio - RS e SC
- Semiprecoce - PR e SP
- Grupo de maturidade - 7.3

Área de adaptação

□ RS, SC, PR e SP

Teor de óleo

□ 21,2%

Teor de proteína

□ 36,7%

Peso de 100 sementes

□ 17,0g

Altura de planta

□ 93 cm em média no RS (variando de 70 cm em regiões mais quentes a 1 m em regiões mais frias).

Cor

| Flor | Pubescência | Hilo |
|--------|-------------|-------|
| Branca | Marrom | Preto |

Produtividade média de grãos

| (kg/ha) | | | |
|---------|-------|-------|-------|
| RS | SC | PR | SP |
| 2.879 | 3.780 | 4.446 | 4.325 |


Época de semeadura

Indicada - 11/out. a 20/dez.

Preferencial - 20/out. a 30/nov.

Distância entre linhas

1. Em altitude acima de 600 m, no RS, em SC e no sul do PR, recomenda-se espaçamento entre linhas de 0,60 a 0,70 m, mantendo uma população de 150.000 a 200.000 plantas/ha.
2. Em altitude acima de 600 m, em SP, recomenda-se espaçamento entre linhas de 0,60 a 0,70 m, mantendo uma população de 200.000 a 250.000 plantas/ha.
3. Em áreas de altitude abaixo de 600 m, no RS e em SC, recomenda-se espaçamento entre linhas de 0,45 a 0,60 m, aumentando a população para 200.000 a 250.000 plantas/ha.
4. Em áreas de altitude abaixo de 600 m, no PR e em SP, recomenda-se espaçamento entre linhas de 0,45 a 0,50 m, aumentando a população para 250.000 a 300.000 plantas/ha.



Reação a doenças

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Cancro da haste * | Resistente |
| Mancha olho-de-rã | Resistente |
| Mosaico comum | Resistente |
| Nematóide de cisto | Suscetível |
| Nematóides de galhas | |
| (<i>M. incognita</i>) | Suscetível |
| (<i>M. javanica</i>) | Mod. Resistente |
| Oídio | Mod. Resistente |
| Podridão parda da haste | Resistente |
| Podridão radicular de fitóftora * | Resistente |
| Podridão vermelha da raiz | Sem Informação |
| Pústula bacteriana | Resistente |

* campo