

FD  
00938

43976

# Unidade de Observação



## Avaliação de produção de Matéria Seca e persistência de Planta de Cobertura (Panicum maximum - Massai)

Fazenda Menole - 2010  
Belterra - Pará



Amazônia Oriental

### Equipe Técnica

Eduardo J. Maklouf Carvalho  
Luis Wagner Rodrigues Alves

UNIDADE de observação: ...  
2010 FD-PP-00938



CPATU- 43976-1



Amazônia Oriental

Ministério da  
Agricultura, Pecuária  
e Abastecimento



## Apresentação

A atividade rural na região Amazônica principiou com o extrativismo da madeira seguido pela implantação de pastagens e, no presente, a região busca alternativas que suplantem a necessidade de incorporação de novas áreas ao sistema produtivo. O cultivo de grãos, em áreas antropizadas, integrado ou não com a pecuária, mostrou-se de grande potencial como opção econômica para a recuperação da agropecuária na região e, para não incorrer nos erros anteriores, há que se experimentar tecnologia de que propicie sustentabilidade.

A tecnologia Plantio Direto objetiva produção sustentável de grãos, com potencial melhoria das condições de fertilidade e estrutura dos solos. Para sua introdução ressalta-se a importância da rotação de cultura, incluindo as espécies de plantas para a cobertura do solo. Estas devem ser selecionadas em função da opção de mercado e utilização diversificada, facilidade de obtenção de sementes; capacidade de desenvolvimento vigoroso do sistema radicular; não ser hospedeira de pragas e doenças, propriedade de reciclar ou incorporar nutrientes no solo, facilidade de manejo, tanto quanto a compatibilidade de ciclo com as demais espécies do sistema, a velocidade e uniformidade do desenvolvimento vegetativo e, especialmente, do potencial de produção de fitomassa, capaz de se manter sobre o solo por um maior espaço de tempo possível.

## Objetivo

Testar e selecionar espécie de planta para cobertura de solo e/ou sucessão de cultura, adequada para as condições edafoclimáticas do Estado do Pará.

## Metodologia

A Unidade de Demonstração foi implantada na Fazenda Menole (Belterra PA). Implantou-se parcela de observação com *Panicum maximum* - *Massai*, em consórcio com a cultura de milho, utilizando 12 kg de sementes/ha.

Após a maturidade fisiológica a planta de cobertura permaneceu por sobre o solo até a próxima safra, quando foi dessecada com 5 L/ha de glifosato. O estudo da estabilidade da matéria orgânica sobre o solo foi efetuado utilizando o sistema descrito por Palm e Sanchez (1990), em que o material manejado foi coletado e acondicionado em bolsas de tela de polietileno, seco em estufa a 60°C até peso constante, determinou-se sua massa e, posteriormente, depositado sobre o mesmo local do qual foi retirado. A primeira avaliação foi efetuada após a dessecação e as avaliações seguintes ocorreram a 30 e 60 dias após o tratamento. Pesou-se cada amostra e seu peso transformado para equivalente hectare.

## Resultados Parciais

O *Panicum maximum* - *Massai*, por ocasião da dessecação, produziu 13,9 toneladas de matéria seca por hectare, suficiente para realizar boa cobertura do solo. Após o encerramento da estação das chuvas a planta persistiu cobrindo 100% do solo, por todo o período, até o próximo plantio.