# MAPA DE SOLOS DO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ - PARÁ [1]

SUDAM
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA
SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS REGIONAIS

Embrapa
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Amazônia Oriental
Ministério da Agricultura e do Abastecimento

Projeção:UTM,SAD69

ESCALA1:100.000

1999

w48°10' w48°00'

s01°10' s01°20' s01°30'

STO. ANTONIO DO TAUÁ

BENEVIDES

CASTANHAL

INHANGAPI

BUJARU

RIO GUAMÁ

SANTA IZABEL

PAd1 PAd2 PAd3 LAd RUbd GXbd1 GXbd2 RQ

Rio Igaú
Travessa Ferreira Pena
Quinta Travessa Boturite
Sexta Travessa Arataninha
Sétima Travessa
Mocambo
Faz. Sta.Clara
Faz. Cipobras
BR-316
Quatro Bocas
Floriano Peixoto
São Luis
Faz. Olho d'agua
Faz. Sta.Joana
Americano
Caraparu
Santa Lucia
Xiteua
Rio Maguari
Porto de Minas
Galho Grande
Faz.Itá
Faz. Macunhambá
São Francisco
Conceição do Itá
Macapá
Rio Itá
Vila do Carmo
Macunhambá
Tapera
Maravilha
Faz.Cajual
Trindade
Peixe Seco
Rio Apeteua
Engenho Parand
Caraparu
Boca de Pernambuco
Centrinho
Apeteua
Pupunhateua
Rio Caraparu
Centro da Piracema
Tacajás
Sta.Quiteria

N.V.

LOCALIZAÇÃODO MUNICÍPIO




CONVENÇÕES

- Rodovia Pavimentada
- Rodovia não Pavimentada
- Drenagem
- Área Urbana
- Limite municipal
- Fazendas, vilas, lugarejos

| SÍMBOLO DAS UNIDADES | CLASSIFICAÇÃODOS SOLOS/UNIDADES DE MAPEAMENTO | QUANTIFICAÇÃO ÁREA (Km²) | % |
|---|---|---|---|
| LAd | **LATOSSOLOAMARELO** LATOSSOLO AMARELO Distrófico A moderado textura média concrecionário floresta equatorial subperenifólia relevo suave ondulado. | 51,85 | 7,59 |
| PAd1 | **ARGISSOLOAMARELO** ARGISSOLO AMARELO Distrófico típico A moderado textura arenosa/média floresta equatorial subperenifólia relevo plano+ LATOSSOLO AMARELO Distrófico A moderado textura argilosa floresta equatorial subperenifólia relevo plano. | 417,16 | 61,60 |
| PAd2 | ARGISSOLO AMARELO Distrófico típico A moderado textura média/argilosa floresta equatorial subperenifólia relevo plano ondulado+ LATOSSOLO AMARELO A moderado textura média floresta equatorial subperenifólia relevo plano. | 35,00 | 5,12 |
| PAd3 | ARGISSOLO AMARELO Distrófico típico A moderado textura arenosa/média cascalhenta floresta equatorial subperenifólia relevo suave ondulado + LATOSSOLO AMARELO Distrófico A moderado textura média cascalhenta floresta equatorial subperenifólia relevo suave ondulado. | 15,40 | 2,25 |
| RQ | **NEOSSOLOQUARTZARÊNICO** NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Órtico A fraco floresta equatorial subperenifólia relevo plano. | 6,53 | 0,96 |
| GXbd1 | **GLEISSOLO HÁPLICO** GLEISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico típico A moderado textura argilosa floresta equatorial higrófila de várzea relevo plano+ NEOSSOLO FLÚVICO Tb Distrófico A moderado textura indiscriminada floresta equatorial higrófila de várzea relevo plano. | 69,08 | 10,11 |
| GXbd2 | GLEISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico típico A moderado textura média floresta equatorial higrófila de várzea relevo plano+ Gleissolo HÁplico Tb Distrófico típico A moderado texura indiscriminada floresta equatorial higrófila de várzea relevo plano. | 39,95 | 5,85 |
| RUbd | **NEOSSOLOFLÚVICO** NEOSSOLO FLÚVICO Tb Distrófico típico A moderado textura média floresta equatorial higrófila de várzea relevo plano+ Gleissolo HÁplico Tb Distrófico típico textura média floresta equatorial higrófila de várzea relevo plano. | 48,23 | 7,06 |
| | **TOTAL** | **683,20** | **100,00** |

[1] -LEVANTAMENTODERECONHECIMENTODEALTAINTENSIDADE

Mapa elaborado a partir da interpretação analógica em imagens LANDSAT5-TM WRS 223,061A de21.06.94e223/061Cde08.06.95, composição colorida 5R4G3B, mosaico semicontrolados de Radar. Base cartográfica obtida mediante uso de cartas plano-altimétrica da Diretoria de Serviços Geográficos-DSG. Geoprocessado no Laboratório de Sensoriamento Remoto do CHSRA/SUDAM.

Geoprocessamento e plotagem: A. Guilherme S. Campos