

## Autores

### Silvio Steinmetz

Engenheiro-agrônomo,  
D.Sc. em Agrometeorologia,  
pesquisador da Embrapa Clima  
Temperado, Pelotas, RS, silvio.  
steinmetz@embrapa.br

### Santiago Vianna Cuadra

Meteorologista, D.Sc. em  
Meteorologia Agrícola,  
pesquisador da Embrapa Clima  
Temperado,  
santiago.cuadra@embrapa.br

### Cristóvão Basílio Pereira

Analista de Sistemas, Pós-  
Graduado, analista da Embrapa  
Clima Temperado, cristovao.  
pereira@embrapa.br

### Emerson Langie dos Santos

Cientista da Computação, Pós-  
Graduado, analista da Embrapa  
Clima Temperado,  
emerson.langie@embrapa.br

### Ivan Rodrigues de Almeida

Geógrafo, D.Sc. em  
Geoprocessamento,  
pesquisador da Embrapa  
Clima Temperado,  
ivan.almeida@embrapa.br

# GD Arroz: Programa Baseado em Graus-dia para Estimar a Data de Diferenciação da Panícula Visando a Adubação Nitrogenada em Cobertura

## Introdução

O Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz do Brasil, tendo contribuído, na média das últimas três safras (2011/2012 – 2013/2014), com 67% da produção nacional (CONAB, 2014). Embora os níveis de produtividade sejam relativamente altos (7,3 t ha<sup>-1</sup>) acredita-se que estes possam ser ainda maiores se forem melhorados alguns aspectos relacionados com o manejo da cultura.

Dentre as práticas de manejo importantes para a produtividade do arroz irrigado, destaca-se a segunda adubação nitrogenada em cobertura (ANC), que deve ser realizada no início da fase reprodutiva, no estágio de iniciação da panícula (IP ou R0) (SOSBAI, 2012). Porém, esse estágio (R0) é difícil de ser visualizado diretamente na planta, em condições de lavoura. Assim, pode-se usar, como referência, o estágio de diferenciação da panícula (DP ou R1), conhecido como “ponto de algodão” (ilustrado nas próximas seções), visível a olho nu, que ocorre, em média, quatro dias após a IP ou R0 (DE CARLI, 2013). Portanto, devido à ordem inversa entre o estágio de interesse (R0), quando deve ser aplicada a ANC, e o estágio R1, possível de ser observado a olho nu, precisa ser considerado um método alternativo para definir o momento mais apropriado para realizar a aplicação da ANC.

Uma dificuldade, neste contexto, é que a ocorrência do estágio R1 é variável por ser dependente da temperatura (STANSEL, 1975; STEINMETZ et al., 2009). Em anos mais quentes e mais frios, este estágio ocorre, respectivamente, mais cedo e mais tarde do que na média dos anos. Da mesma forma, é retardado nas sementeiras do cedo e antecipado nas sementeiras tardias (STEINMETZ et al., 2009). Por isso, é preferível estimar a data de ocorrência da DP em dias após a emergência (DAE) usando-se o método de graus-dia, ou soma térmica, do que pelo número médio de DAE do calendário (SLATON et al., 1996; STEINMETZ et al., 2010). Baseando-se nesse princípio, Steinmetz et al. (2010) estimaram a data de ocorrência da DP, para seis subgrupos de cultivares, em 17 localidades do Rio Grande do Sul (RS), usando séries históricas (30 anos) de temperatura média diária do ar (T<sub>m</sub>) e, posteriormente, validaram essas informações em condições de lavoura (STEINMETZ et al., 2013).

Em função do exposto deduz-se que, além das datas estimadas de DP, baseadas nas séries históricas de T<sub>m</sub>, é importante disponibilizar ao produtor como essas estimativas são afetadas pela T<sub>m</sub> do ano da safra corrente. Além disso, é importante dispor-se de um programa, disponível na internet, em que o produtor, ou o agente de assistência técnica que o orienta, possa acompanhar a evolução dessas estimativas em função das características da(s) sua(s) lavoura(s), tais como, localização, data(s) de emergência e cultivar(es) utilizada(s). O objetivo desta publicação é explicar os fundamentos e a forma de utilização de um programa operacional, baseado em graus-dia, para estimar a data de ocorrência de diferenciação da panícula (DP), visando otimizar a adubação nitrogenada em cobertura.

## Fundamentos do programa

O programa (disponível em: <http://www.cpact.embrapa.br/agromet>) utilizou as mesmas séries de dados de temperatura do ar e os mesmos parâmetros, critérios e subgrupos de cultivares utilizados por Steinmetz et al. (2010). Entretanto, em vez do VBA (Visual Basic for Applications), usado dentro da planilha Excel, as equações foram escritas em um programa numérico, na linguagem Fortran, possibilitando a computação automática dos valores transcorridos entre a emergência e a diferenciação da panícula (E-DP), "Nº dias (E-DP)", assim como a provável data de diferenciação da panícula "Data DP". O programa considera como informações de entrada a série histórica (30 anos) das temperaturas máximas e mínimas diárias do ar, assim como as temperaturas da safra do ano corrente, como descrito a seguir. Além disso, foi incluído o sétimo subgrupo, relativo às cultivares de ciclo tardio. As exigências térmicas desse subgrupo para atingir a DP, bem como dos outros seis, encontram-se na Tabela 1.

Aos dados obtidos, relativos à duração média (30 anos) do período da emergência à diferenciação da panícula (E-DP), aplicaram-se equações de regressão geradas no processo de validação do método de graus-dia em condições de lavoura (STEINMETZ et al., 2013). Para os quatro primeiros subgrupos, envolvendo as cultivares de ciclos muito precoce e precoce, foi utilizada a equação:

$$Y_p = 1,007X - 1,338$$

em que:

X = número de dias após a emergência em que ocorre a DP;

Y<sub>p</sub> = número de dias após a emergência em que ocorre a DP, corrigido.

Para os dois subgrupos seguintes, envolvendo as cultivares de ciclo médio, foi utilizada a equação:

$$Y_m = 0,719X + 16,11$$

em que:

X = número de dias após a emergência em que ocorre a DP;

Y<sub>m</sub> = número de dias após a emergência em que ocorre a DP, corrigido.

A partir da correção do período E-DP, foram corrigidas as datas em que ocorre a DP.

Ao subgrupo tardio não se aplicou o fator de correção pelo fato de as cultivares desse subgrupo não terem participado do processo de validação do método de graus-dia em condições de lavoura.

Os dados relativos ao ano da safra foram calculados, para cada um dos sete subgrupos de cultivares, usando-se as exigências térmicas médias dos subgrupos indicadas na Tabela 1. Entretanto, nesse caso, utilizaram-se os dados diários de T<sub>m</sub> repassados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), diariamente.

Os valores do número de dias do período E-DP e a respectiva data de DP do ano da safra, assim como do desvio (dias) entre os períodos E-DP calculados com a T<sub>m</sub> diária do ano da safra e a T<sub>m</sub> diária da média dos anos (30 anos), são atualizados diariamente através da computação automática pelo programa, em função dos dados recebidos do Inmet. O programa recalcula diariamente os referidos valores, em função dos dados diários recebidos, que substituem os dados históricos conforme a data corrente. O número de dias da temperatura média diária do ano corrente utilizado varia de zero, quando a data da consulta é anterior ou igual à data da emergência selecionada (i.e., ainda não há observações para a safra corrente), ao número total de dias entre a emergência e a DP, quão mais próxima a consulta é feita da data da DP prevista. Finalmente, o programa atualiza automaticamente os valores armazenados no banco de dados que alimenta a página web.

## Utilização do programa

Para acessar ao programa entre no endereço do Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa Clima Temperado (<http://www.cpact.embrapa.br/agromet>) e clique em "Graus-dia (Arroz)". Para obter a informação desejada, o usuário necessita entrar com algumas informações, como descrito a seguir.

## Informações de entrada no programa

### Localidade

Selecione uma das seguintes 17 localidades: Alegrete; Bagé; Cachoeirinha; Capão do Leão (Pelotas); Eldorado do Sul (Guaíba); Encruzilhada do Sul; Maquiné (Osório); Quaraí; Rio Grande; Santa Maria; Santana do Livramento; Santa Vitória do Palmar; São Borja; São Gabriel; Taquari; Torres; Uruguaiana.

Caso a sua localidade não seja uma das 17, selecione a que for mais próxima, ou a que, pela sua experiência, apresente características de temperatura do ar semelhantes à da sua localidade.

As 17 localidades indicadas são as que dispunham de séries longas de dados diários de temperatura média do ar ( $T_m$ ) sendo que, para a maioria delas, foram usadas séries de 30 anos (1976-2005).

### Subgrupo

Selecione um dos sete subgrupos no qual se enquadra a cultivar a ser utilizada. Os subgrupos e o ciclo das cultivares (da emergência à maturação) em cada subgrupo são os seguintes:

- 1-Muito Precoce 1 (MP1) (<100 dias)
- 2-Muito Precoce 2 (MP) (100-105 dias)
- 3-Precoce 1 (P1) (106-110 dias)
- 4-Precoce 2 (P2) (111-120 dias)
- 5-Médio 1 (M1) (121-130 dias)
- 6-Médio 2 (M2) (131-135 dias)
- 7-Tardio (T) (136-150 dias)

### Cultivar

Selecione a cultivar a ser utilizada. A relação das cultivares incluídas em cada subgrupo, bem como o seu ciclo e a soma térmica necessária para atingir a DP, está indicada na Tabela 1.

Deve-se ressaltar que a data da DP de uma

determinada cultivar é estimada para o subgrupo a que ela pertence e não para a cultivar propriamente dita. Entretanto, pelo fato de as cultivares terem sido enquadradas em sete subgrupos, a data da DP de um determinado subgrupo é muito próxima da que seria esperada para qualquer uma das cultivares pertencentes ao subgrupo. Assim, estima-se que a data da DP para a cultivar BRS Pampa, por exemplo, ocorreria cerca de dois dias antes da data estimada para o subgrupo a que ela pertence (Precoce 2). A razão disso é que a exigência térmica da BRS Pampa (648 °C dia) é menor do que a do subgrupo a que ela pertence (673 °C dia) (Tabela 1). Dividindo-se essa diferença de -25 °C dia por 11 °C dia<sup>-1</sup>, que corresponde ao valor médio diário de graus-dia da emergência à DP dessa cultivar, obtém-se o valor de -2,3 dias (Tabela 1). Pelo mesmo raciocínio, é de se esperar que a data da DP para a cultivar BRS 7 “Taim” ocorra cerca de dois dias após a data da DP do subgrupo a que ela pertence (Médio 2) (Tabela 1).

Na Tabela 1 existem dois subgrupos de cultivares, ou seja, aquelas em que as exigências térmicas para atingir o estágio de DP (R1) foram determinadas a campo e algumas indicadas nas recomendações técnicas da SOSBAI (2012) em que essas avaliações não foram feitas. Essas últimas foram incluídas nos subgrupos de acordo com o seu ciclo. Para essas cultivares, é possível que as datas estimadas de DP sejam menos precisas pelo fato de as suas exigências térmicas não terem sido determinadas a campo.

### Data de emergência

Selecione a data da emergência, disponível para o período de 1º de setembro a 31 de dezembro. Considere a data de 50% de emergência, ou seja, quando cerca de 50% das plântulas da lavoura tenham emergido (plântulas até 2 cm de altura).

**Tabela 1.** Graus-dia médio da emergência à diferenciação da panícula (E-DP) para seis subgrupos de cultivares e por cultivar, diferença entre a cultivar e o subgrupo, graus-dia médio diário por cultivar no período E-DP e diferença entre a cultivar e o subgrupo, em dias. Embrapa Clima Temperado, Pelotas, 2014.

Subgrupo (ciclo)	GD (°C dia)	Cultivar (ciclo)	GD (°C dia)	Diferença cultivar/subgrupo (°C dia)	GD / Nº dias E-DP (°C dia dia <sup>-1</sup> )	Diferença cultivar/subgrupo (dias)
Muito Precoce 1 (MP1) (<100 dias)	459	IRGA 421 (95)	459	0	11	0
Muito Precoce 2 (MP2) (100-105 dias)	512	BRS Atalanta (100)	514	2	12	0,2
		BRS Ligeirinho	509	-3	12	-0,3
Precoce 1 (P1) (106-110 dias)	617	BRS 6 "Chuí" (110)	608	-9	12	-0,8
		BRS Querência (110)	625	8	12	0,7
		<u>Epagri 106 (106)</u>	-	-	-	-
Precoce 2 (P2) (111-120 dias)	673	BRS Pampa (118)	648	-25	11	-2,3
		BRS Firmeza(120)	(647)	-26	12	-2,2
		<u>BR-IRGA 414 (115)</u>	-	-	-	-
		IRGA 417 (115)	694	21	12	1,8
		IRGA 422 CL (120)	(691)	18	11	1,6
		IRGA 423 (120)	683	10	11	0,9
		Inov (CL) (120)	671	-2	12	-0,2
		Avaxi (CL) (120)	679	6	12	0,5
Puitá Inta CL (120)	(708)	35	12	2,9		
Médio 1 (M1) (121-130 dias)	718	BRS Pelota (125)	728	10	12	0,8
		BRS Sinuelo CL (130)	717	-1	11	-0,1
		BRSCIRAD 302 (128)	(707)	-11	12	-0,9
		BR-IRGA 409 (126)	(738)	20	12	1,7
		BR-IRGA 410 (123)	700	-18	12	-1,5
		Arize QM 1003 (125)	719	1	11	0,1
		Arize QM 1010 (135)	(698)	-20	11	-1,8
		<u>Guri Inta CL (125)</u>	-	-	-	-
Médio 2 (M2) (131-135)	735	BRS Fronteira (135)	728	-7	12	-0,6
		BRS 7 "Taim (130)	742	24	12	2,0
		BRS Bojuru (135)	731	-4	12	-0,3
		IRGA 424 (132)	759	24	12	2,0
		<u>SCS 115 CL (135)</u>	-	-	-	-
		El Paso L. 144	740	5	12	0,4
Tardio (T) (136-150)	937	SCS BRS Tio Taka (141)	905	-32	12	-2,7
		<u>Epagri 108 (142)</u>	-	-	-	-
		Epagri 109 (142)	968	31	12	2,6
		<u>SCS 112 (138)</u>	-	-	-	-
		<u>SCS 114 Andosan (140)</u>	-	-	-	-
		<u>SCS 116 Satoru (144)</u>	-	-	-	-
		<u>SCS 117 CL (144)</u>	-	-	-	-

Obs.: 1) Os valores de graus-dia entre parênteses não foram considerados no cálculo dos graus-dia médios do subgrupo;

2) As cultivares sublinhadas não dispõem de informações de graus-dia e foram incorporadas nos subgrupos de acordo com o grupo de maturação indicado nas recomendações técnicas da SOSBAI (2012);

3) As cultivares BRS Firmeza e IRGA 422 CL foram reenquadradas em outro subgrupo em relação a Steinmetz et al. (2010).

## Informações de saída do programa

### Consulta por localidades

Para exemplificar, selecionaram-se as seguintes variáveis: Localidade: Alegrete; Subgrupo: 3- Precoce 1 (106-110 dias); Cultivar: 5- BRS Querência; Data de emergência: 01/10. Após preencher os campos indicados, selecione **"Consulta por localidades"** (Figura 1).

Os primeiros quatro campos repetem as informações de entrada selecionadas (Figura 1). Em **"Média (30 anos)"**, o campo **"Nº dias (E-DP)"** indica que essa cultivar, da mesma forma que as demais cultivares do subgrupo precoce 1, na média de trinta anos de dados diários de Tm, necessitou de 63 dias após a emergência para atingir a diferenciação da panícula. O campo **"Data (DP)"** indica que 63 dias após a emergência (01/10) corresponde ao dia 03/12. Isso indica a data média em que a DP ocorreu nesses trinta anos.

Deve-se ressaltar que os dados do campo **"Média (30 anos)"** podem ser diferentes daqueles de Steinmetz et al. (2010) pelo fato de terem sido corrigidos devido à validação em condições da

lavoura (STEINMETZ et al., 2013).

Em **"Safrá"**, o campo **"Nº dias (E-DP)"** indica que essa cultivar, usando-se como exemplo dos dados diários de Tm de uma safra qualquer, também necessitou 63 dias após a emergência para atingir a diferenciação da panícula. Consequentemente, o campo **"Data (DP)"** indica que 63 dias após a emergência (01/10) corresponde ao dia 03/12, portanto indicando que não houve desvio (desvio zero) da data média de 30 anos, como indicado no campo **"Desvio da média (dias)"**. Isso significa que, no período compreendido entre 01/10 (emergência) e 03/12 (DP) da safra em questão a temperatura média do ar (Tm) foi semelhante à Tm da média histórica (30 anos).

Logo abaixo das informações de saída do programa (Figura 1) encontra-se um diagrama esquemático dos principais estádios de desenvolvimento da planta de arroz, com destaque para o de diferenciação da panícula (DP ou R1) da escala de Counce et al. (2000). Ao se clicar sobre a imagem ilustrativa da DP no colmo principal da planta de arroz (área sombreada) será exibida uma imagem ampliada, permitindo identificar, mais detalhadamente, este estádio da planta (Figura 2).

[Laboratório de Agrometeorologia](#) | [www.cpiat.embrapa.br/agromet/index.html](#) | [RNP](#) | [Clima](#) | [WM](#) | [OCS](#) | [SARG](#) | [CFACT](#) | [Lista](#) | [SAO](#) | [BD](#) | [CATR](#) | [IPS](#) | [WS](#) | [PassWD](#) | [paplAdm](#) | [GOa](#) | [ListAdm](#) | [CC](#) | [WBLZ](#) | [IDFARE](#) | [CATSOFT](#) | [CACTI](#) | [NTI](#) | [Agropecuária](#) | [Agenda VC](#) | [ZWA](#) | [ZM Sde](#) | [Mailman](#)

**Laboratório de Agrometeorologia**  
 Graus-dia (Arroz) - Embrapa/Inmet/Irga/Fepagro (em desenvolvimento)

Por meio de um acordo de cooperação técnica (ACT) entre Embrapa/Inmet/Irga/Fepagro são disponibilizadas informações, em caráter experimental, indicando a duração do período "Emergência até a Diferenciação da Panícula - DP" e as datas em que deve ocorrer a DP, para sete subgrupos de cultivares, envolvendo tanto os valores médios (30 anos) como os do ano de safra, e os respectivos desvios entre ambas.


Data de ocorrência da Diferenciação da Panícula (DP) para sete subgrupos de cultivares de arroz irrigado

Localidade:   
 Subgrupo:   
 Cultivar:   
 Data de emergência:

Localidade	Subgrupo	Cultivar	Data de emergência	Média (30 anos)	Safra
Alegrete <td>Precoce 1 (106-110 dias)</td> <td>BRS Querência</td> <td>01/10</td> <td>Nº dias (E-DP) 63</td> <td>Data (DP) 03/12 Desvio da média (dias) 0</td>	Precoce 1 (106-110 dias)	BRS Querência	01/10	Nº dias (E-DP) 63	Data (DP) 03/12 Desvio da média (dias) 0

Fonte: Pelotas, Univer. Agrária de Uruguaiana, 2008

**Figura 1.** Informações de saída do programa (Consulta por localidades), envolvendo o número médio de dias da emergência à diferenciação da panícula (E-DP), a data média da DP, na média de 30 anos e na safra, desvio da média (dias), e diagrama esquemático dos principais estádios de desenvolvimento da planta de arroz, com destaque para o estádio de diferenciação da panícula (DP ou R1) da escala de Counce et al. (2000). Embrapa Clima Temperado, Pelotas, 2014.



**Figura 2.** Informações de saída do programa (Consulta por localidades) envolvendo alguns estádios de desenvolvimento da planta de arroz (COUNCE et al., 2000), com destaque para o de diferenciação da panícula (DP ou R1), indicando o corte no sentido longitudinal do colmo principal (à esquerda) e detalhes desse estágio (ao centro e à direita). Embrapa Clima Temperado, Pelotas, 2014. Fotos: Paulo Lanzetta.

**Como estimar a data de ocorrência da iniciação da panícula (IP ou R0)**

Considerando-se que a Sosbai (2012) recomenda que a segunda adubação nitrogenada em cobertura (ANC) deve ser realizada no estágio de iniciação da panícula (IP ou R0) e que esse estágio é difícil de ser visualizado diretamente na planta, em condições de lavoura, pode-se usar, como referência, o estágio de diferenciação da panícula (DP ou R1), conhecido como “ponto de algodão”, visível a olho nu, que ocorre, em média, quatro dias após a IP ou R0 (DE CARLI, 2013). Portanto na prática se usaria a data estimada de DP (safra) como referência, antecipando-se em quatro dias a aplicação da segunda ANC. Assim, no exemplo usado anteriormente, em que a data estimada de DP

(safra) ocorreu no dia 03/12 a aplicação da segunda ANC deveria ser programada para o dia 29/11.

**Consulta por mapas**

Outra possibilidade oferecida pelo programa é visualizar, na forma de mapas, a espacialização da informação gerada. Os mapas disponíveis foram derivados da interpolação de um modelo do relevo do Estado do Rio Grande do Sul, e do número de dias entre a emergência e a diferenciação da panícula (E-DP), nas 17 localidades em que esses parâmetros foram estimados pelo método de graus-dia. Essa interpolação foi obtida por meio do resultado de técnicas estatísticas de regressão múltipla, que geram equações para cada decêndio de data de emergência, desde o primeiro decêndio

de setembro até o segundo decêndio de dezembro, aplicadas então ao modelo espacial. Ao todo, foram gerados 77 mapas representativos dos sete subgrupos de maturação e das onze datas de emergência.

A informação disponibilizada nos mapas refere-se a classes de “**Nº dias (E-DP)**” para períodos de emergência de 10 dias, na média de 30 anos, considerando-se o valor intermediário do decêndio. Assim, o mapa do primeiro decêndio de outubro refere-se à emergência do dia 5 de outubro, o mapa do segundo decêndio de outubro refere-se à emergência do dia 15 de outubro, e assim por diante.

Após preencher os campos indicados, selecione **“Consulta por mapas”**.


Essa consulta por mapas tem a finalidade de indicar ao usuário as informações geradas pelo programa não apenas para a localidade selecionada, mas também para as localidades/municípios no seu entorno e, principalmente, para as que não dispõem de séries de dados meteorológicos como os das 17 localidades usadas neste trabalho.

A Figura 3 caracteriza a espacialização de classes de “**Nº dias (E-DP)**” para as mesmas informações de entrada por “localidades” indicadas anteriormente, ou seja: Alegrete, subgrupo Precoce 1, cultivar BRS Querência (válido também para as cultivares BRS 6 “Chuí” e EPAGRI 106, que pertencem ao mesmo subgrupo), com data de emergência em 01 de outubro (representada pelo mapa do primeiro

decêndio de outubro). Ela indica que a duração do período E-DP é semelhante (classe de 60-65 dias) na maior parte do município de Alegrete, praticamente em todo o município de São Francisco de Assis e na parte leste do município de Itaqui. Portanto, em toda essa área, a aplicação da segunda adubação nitrogenada em cobertura (ANC) poderia ser em data semelhante à de Alegrete. Por outro lado, a aplicação da segunda ANC no município de Rosário, por exemplo, poderia ser um pouco mais tarde, pois a duração do período E-DP é um pouco maior (classe de 65-70 dias). Essas diferenças na duração do período E-DP são reflexo das características da temperatura do ar ( $T_m$ ) nessas áreas.

### **Outros fatores que podem afetar a duração do período E-DP**

Deve-se ressaltar que, além da temperatura do ar, outros fatores podem influenciar na data da DP, tais como: manejos da água de irrigação, da adubação, da população de plantas, dos tratamentos químicos, estresses bióticos e abióticos, etc. Em geral, o número de DAE para atingir a DP é antecipado e retardado, respectivamente, com a antecipação e o atraso na entrada definitiva da água de irrigação (STEINMETZ et al., 2010). Altas densidades de plantas tendem a encurtar o período da emergência à DP, enquanto que efeitos de herbicidas, fungicidas e baixas temperaturas da água tendem a aumentá-lo (STANSEL, 1975; AGROCLIMATOLOGIA..., 2008). Antecipação e retardamento na data da DP, respectivamente, com altas e baixas temperatura da água de irrigação, também foram observados por Steinmetz et al. (2011).



**Figura 3.** Informações de saída do programa (Consulta por mapas) indicando o mapeamento do número médio de dias da emergência à diferenciação da panícula (E-DP), na média de 30 anos, para o decêndio da data de emergência e para a cultivar (subgrupo) escolhidos, nas principais regiões produtoras de arroz irrigado do Rio Grande do Sul. Embrapa Clima Temperado, Pelotas, 2014.

A dificuldade em se definir a data de 50% de emergência da lavoura diante da desuniformidade de emergência das plântulas, causada pela escassez e/ou irregularidade na distribuição da chuva, também pode influenciar na acurácia da data da DP estimada pelo método de graus-dia (STEINMETZ et al., 2013). Caso ocorram duas datas diferentes de emergência, para lavouras semeadas na mesma data, recomenda-se, ao inserir os dados para estimar a data da DP, considerá-las como se fossem duas lavouras ao invés de se fazer a média das duas datas de emergência.

Outro fator que pode influenciar a data de ocorrência da DP é o fotoperíodo (duração do dia) (STRECK et al., 2006). Neste trabalho desconsiderou-se a possível influência deste fator, pois foram usados dados de soma térmica de cultivares indicadas pela pesquisa, dentro do período recomendado de semeadura. Nessas condições, pode-se supor que, em geral, a possível influência do fotoperíodo pode ser desconsiderada (SOSBAI, 2012). Esclarecimentos adicionais sobre as informações básicas utilizadas neste trabalho podem ser obtidos em Steinmetz et al. (2010).

## Recomendações

Considerando-se que a data de ocorrência da DP pode ser influenciada por outros fatores, como indicado anteriormente, recomenda-se que os usuários ou os produtores propriamente ditos utilizem as informações geradas por este programa como uma ferramenta complementar, e não única, para o planejamento e a tomada de decisão quanto ao momento de efetuar a segunda adubação nitrogenada em cobertura (ANC).

Por outro lado, embora as recomendações da Sosbai (2012) indiquem que a segunda ANC deve ser aplicada no estágio de IP (R0), e que este ocorre cerca de quatro dias antes da DP (R1), caberá ao agente de assistência técnica ou ao próprio produtor tomar a decisão sobre o momento de efetuar a ANC em função outros fatores que possam estar afetando a lavoura, como o estado nutricional das plantas, por exemplo.

## Agradecimentos

Os autores agradecem à Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária (Fepagro) e ao Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) pela cedência dos dados meteorológicos históricos utilizados neste trabalho, e ao Inmet pelo repasse dos dados do ano da safra. Os autores agradecem também às pessoas que de uma ou outra forma contribuíram na obtenção dos dados disponibilizados por este programa, tais como: Ariano Martins de Magalhães Júnior, Paulo Ricardo Reis Fagundes, Walkyria Bueno Scivittaro, Ivan Rodrigues de Almeida, Carlos Reisser Júnior, Alexandre Nunes Deibler, Ronaldo Matzenauer, Bernadete Radin, Solismar Damé Prestes, Matheus Fernandes da Silva, Glênio Luiz Nascimento Picada, Hermínio Gadea Menezes, Ricardo Machado Kröeff, Vera Márcia Pereira Borges, Luciano Corrêa Hanemann, Gustavo Cantori Hernandez, Cláudio Correa Pereira, Diego Herrmann, Marcelo Pilon, José Alberto Petrini e Douglas A. Bermudes

## Referências

- AGROCLIMATOLOGIA: boletim periódico. Treinta y Três: INIA, feb. 2008.
- CONAB. **Séries históricas: arroz**. Disponível em: <<http://conab.gov.br/conteudos.php?a=1252&t=2>>. Acesso em: 13 jun. 2014.
- COUNCE, P. A.; KEISLING, T. C.; MITCHELL, A. J. A uniform, objective, and adaptive system for expressing rice development. *Crop Science*, Madison, v. 40, n. 2, p. 436-443, Mar./Apr. 2000.
- DE CARLI, C.; SILVA, M. R. da; STRECK, N. A.; STEINMETZ, S.; MARCHEZAN, E. Determinação do número de dias e dos graus-dia em que a iniciação da panícula (IP) antecede a diferenciação da panícula (DP) de cultivares de arroz irrigado. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ARROZ IRRIGADO, 8., 2013, Santa Maria. **Anais...** Santa Maria: Universidade Federal de Santa Maria, 2013. p. 850-853.

SLATON, N.; HELMS, S.; WELLS, B. DD50 computerized rice management program. In: HELMS, R. S. (Ed.). **Rice production handbook**. Little Rock: University of Arkansas, 1996. p. 24-27. (Miscellany publication, 192).

SOSBAI. **Arroz irrigado**: recomendações técnicas da pesquisa para o Sul do Brasil. Gravatal, 2012. 179 p.

STANSEL, J. W. The rice plant: its development and yield. In: SIX decades of rice research in Texas. Beaumont: Texas Agricultural Experiment Station, 1975. p. 9-21.

STEINMETZ, S.; FAGUNDES, P. R. R.; MAGALHÃES JÚNIOR, A. M. de; SCIVITTARO, W. B.; DEIBLER, A. N.; ULGUIM, A. da R.; NOBRE, F. L. de L.; PINTANEL, J. B. A.; OLIVEIRA, J. G.; SCHNEIDER, A. B. **Determinação dos graus-dia e do número de dias para atingir o estágio de diferenciação da panícula de cultivares de arroz irrigado**. Pelotas: Embrapa Clima Temperado, 2009. 29 p. (Embrapa Clima Temperado. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 88).

STEINMETZ, S.; MAGALHÃES JÚNIOR, A. M.; FAGUNDES, P. R. R.; SCIVITTARO, W. B.; ALMEIDA, I. R.; REISSER JÚNIOR, I.; DEIBLER, A. N.; MATZENAUER, R.; RADIN, B.; PRESTES, S. D.; SILVA, M. F. **Uso de graus-dia para estimar a data de diferenciação da panícula (DP) de seis subgrupos de cultivares de arroz irrigado visando à adubação nitrogenada em cobertura no Rio Grande do Sul**. Pelotas: Embrapa Clima Temperado, 2010. 75 p. (Embrapa Clima Temperado. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 121).

STEINMETZ, S.; SCIVITTARO, W. B.; PINTANEL, J. B. A.; SCHNEIDER, A. B.; SEVERO, A. C. M.; SILVA, M. F. da. Indução de contraste na temperatura da água e sua relação com a duração da fase vegetativa do arroz irrigado. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ARROZ IRRIGADO, 7., 2011, Balneário Camboriú. **Anais...** Itajaí: Epagri/Sosbai, 2011. p. 473-476.

STEINMETZ, S.; PICADA, G. L. N.; GADEA, H. M.; KRÖEFF, R. M.; BORGES, V. M. P.; HANEMANN, L. C.; HERNANDES, G. C.; PEREIRA, C. P.; HERRMANN, D.; DEIBLER, A. N.; PILON, M.; PETRINI, J. A.; ALMEIDA, I. R. de; SILVA, M. F. da. **Validação do método de graus-dia para estimar a data de diferenciação da panícula (DP) de cultivares de arroz irrigado no Rio Grande do Sul**. Pelotas: Embrapa Clima Temperado, 2013. (Embrapa Clima Temperado. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 228).

STRECK, N. A.; BOSCO, L. C.; MICHELON, S.; ROSA, H. T.; WALTER, L. C.; PAULA, G. M. de; CAMERA, C.; LAGRO, I.; MARCOLIN, E. Avaliação da resposta ao fotoperíodo em genótipos de arroz irrigado. **Bragantia**, Campinas, v. 65, n. 4, p. 533-541, 2006.

**Circular  
Técnica, 155**

Exemplares desta edição podem ser adquiridos na:

**Embrapa Clima Temperado**

Endereço: BR 392, Km 78, Caixa Postal 403  
Pelotas, RS - CEP 96010-971

Fone: (053)3275-8100

[www.embrapa.br/clima-temperado](http://www.embrapa.br/clima-temperado)

[www.embrapa.br/fale-conosco/sac/](http://www.embrapa.br/fale-conosco/sac/)

**1ª edição**

1ª impressão (2014): 300 exemplares

**Comitê de  
Publicações**

**Presidente:** Ariano Martins de Magalhães Júnior

**Secretário-Executivo:** Bárbara Cosenza

**Membros:** Márcia Vizzotto, Ana Paula Schneid Afonso, Giovani Theisen, Luis Antônio Suíta de Castro, Flávio Luiz Carpena Carvalho, Isabel Helena Verneti Azambuja, Beatriz Marti Emygdio.

**Expediente**

**Revisão do texto:** Bárbara Chevallier Cosenza

**Normalização bibliográfica:** Marilaine Schaun Pelufê

**Tratamento das ilustrações:** Manuela Coitinho (estagiária)

**Editoração eletrônica:** Daiele Silva da Rosa e Manuela Coitinho (estagiárias)