

Apresentação

A cultivar BRS RBO (Figuras 1 a 6), registro 34943, anteriormente denominada RBR-1 (Rio Branco), foi coletada localmente, selecionada pelo Centro de Pesquisa Agroflorestal do Acre, e recomendada pela Embrapa para cultivo no Acre. Atualmente a cultivar é de domínio público e amplamente cultivada no estado, em sistemas de produção convencionais e orgânicos com baixo suporte tecnológico. Com o objetivo de divulgar melhor a cultivar BRS RBO, suas principais características estão descritas a seguir:



Forma e composição: porte semiereto; apresenta 8 filhotes e não forma rebentões na base da planta.

Folhas: verdes e sem espinhos.

Fruto: formato cilíndrico com peso acima de 1,5 kg; polpa amarela; média de 14 °Brix e acidez em torno de 0,6%.

Cochonilha: sem relato de ocorrência.

Percevejo: com relato de ocorrência.

Broca-do-fruto: com relato de ocorrência.

Fusariose: sem relato de ocorrência.

Podridão-negra-do-fruto: com relato de ocorrência.

Podridão-do-olho: com relato de ocorrência.

Mancha-negra-do-fruto: sem relato de ocorrência.

Escurecimento interno dos frutos ou brunimento interno: sem relato de ocorrência.

Queima-de-sol: com relato de ocorrência.



Figura 1. Plantas da cultivar BRS RBO em cultivo orgânico no Acre.



Figura 2. Plantas da cultivar BRS RBO em cultivo convencional.



Figura 3. Fruto do abacaxizeiro, cv. BRS RBO.

Figura 4. Tipos de mudas de abacaxizeiro, cv. BRS RBO.



Figura 5. Frutos da cv. BRS RBO colhidos para a comercialização.



Figura 6. Fruto da cultivar BRS RBO.

A seguir são apresentadas recomendações básicas de plantio¹ para que os produtores possam melhor manejar a cultura a fim de obterem maiores produtividades.

¹Para maiores informações sobre o manejo da cultura, consultar a publicação: ANDRADE NETO, R. de C.; NOGUEIRA, S. R.; CAPISTRANO, M. da C.; OLIVERA, J. R. de; ALMEIDA, U. O. de. Recomendações técnicas para o cultivo de abacaxizeiro, cv. Rio Branco (BRS RBO). Rio Branco, AC: Embrapa Acre, 2016. 10 p. (Embrapa Acre. Comunicado técnico, 192).

Escolha do local para plantio

Escolher solos planos a suavemente ondulados (até 5% de declividade), profundos (acima de 1 m) e, preferencialmente, de textura média e boa drenagem.

Escolha de mudas

Recomendam-se mudas tipo filhote (localizadas abaixo dos frutos) com pelo menos 30 cm de altura, por serem mais vigorosas e disponíveis.

Época de plantio

Deve ser feito no final da estação seca e início da estação chuvosa. Quando há irrigação, o plantio pode ser realizado em qualquer época.

Espaçamento

O espaçamento para o cultivo do abacaxizeiro, cv. BRS RBO, deve ser feito de acordo com a Tabela 1.

Tabela 1. Espaçamento para o cultivo do abacaxizeiro, cv. BRS RBO.

Tipo de plantio	Distância entre filas e plantas (m)	Plantas/ha
Filas simples	0,90 x 0,30	37.000
	0,90 x 0,40 x 0,40	38.460
Filas duplas	1,00 x 0,40 x 0,40	35.715
	1,20 x 0,40 x 0,40	31.250

Calagem

Deve ser realizada 60 dias antes do plantio, considerando o volume de saturação de bases igual a 60% (V2) e sempre antes da adubação, se assim indicar a análise do solo.

Adubação

As adubações de plantio, formação e de produção precisam seguir a análise de solo e a correta interpretação por um técnico ou engenheiro.

Elaboração

Romeu de Carvalho Andrade Neto

Engenheiro-agronomo, D.Sc. em Fitotecnia, pesquisador da Embrapa Acre, Rio Branco, AC

Sônia Regina Nogueira

Engenheira-agronoma, D.Sc. em Fitopatologia, pesquisadora da Embrapa Acre, Rio Branco, AC

Revisão de texto:

Claudia Carvalho Sena
Suely Moreira de Melo

Diagramação e arte final:

Francisco Carlos da Rocha Gomes
Larissa Evelin

Foto da capa:

Romeu de Carvalho Andrade Neto

1ª edição:

1ª impressão (março/2018): 500 exemplares

<https://www.embrapa.br>

<https://www.embrapa.br/fale-conosco/sac>

BRS RBO: Cultivar de Abacaxizeiro para o Estado do Acre e Recomendações Básicas para o seu Plantio



CGPE 14479