

TRABALHOS EXPERIMENTAIS COM FORRAGEIRAS

COORDENAÇÃO DE PESQUISAS ZOOTÉCNICAS E ZOOPATOLÓGICAS

INSTITUTO DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DA AMAZÔNIA OCIDENTAL

MANAUS - AMAZONAS - BRASIL

1972/1973



- ABR 73

Aspecto de experimento de fertilidade em capim Elefante - As parcelas menos desenvolvidas são o Testemunha (sem adubo), somente Calagem e Completo menos P. (Maio de 1972).



- ABR 73

Outro aspecto do mesmo experimento.



Experimento de Intervalos entre cortes em capim Elefante. (Maio, 1972).



Área de introdução de leguminosas forrageiras, vendo-se ao fundo uma coleção de capim Elefante. (Maio, 1972).



Brachiaria sp (para Terra Firme) uma das grami^{ne}
neas promissoras devido à grande rusticidade e
resistência ao ataque de cigarrinhas das pasta^{gens}. (Maio, 1972).



Aspecto de capineiras bem manejadas. A do 1º
plano tem 2 anos e a dos fundos está no 1º cor^{te}. (Maio, 1972).



- ABR 73

Competição de espécies para formação de capineiras de corte. (Maio, 1972).



- ABR 73

Outro aspecto do mesmo experimento.



73

- ABR

Estudo de tipos de adubação em capim Elefante
(a parcela do 1º plano não recebeu tratamento
nenhum). (Maio, 1972).



- ABR

73

Outro ângulo do mesmo experimento



- ABR 73

Outro aspecto do experimento anterior vendo-se no centro as parcelas "Testemunha" e "Somente-Calagem (2 ton/ha)



Experimento de níveis de adubação (P e N) em Capineira de Capim Elefante. (Maio, 1973)



Outro aspecto do experimento anterior, na parcela no 1º plano observa-se nas folhas da gramínea, os sintomas da deficiência de Fósforo (P) bem como o não desenvolvimento da mesma, três meses após o plantio. (Maio, 1973)



Capim Elefante (Sem Adubação) em Latosolo Amarelo textura muito pesada. Ao fundo vêm-se os piquetes de *Brachiaria decumbens*, com 5 anos.



Outro aspecto do Capim Elefante. Ao fundo vê-se a mata característica do Estado do Amazonas.



Introdução de Sorgo híbrido gra
nífero com adubação nitrogenada
à base de 100 kh de N/ha.
(Maio, 1973)



Outro aspecto da introdução de sorgo granífero (sem adubação). Note-se o adubado ao fundo.



Variedade de cana forrageira introduzida do - IPEAN (Maio, 1973).



Aspecto da coleção de cana forrageira.



Experimento de Palatabilidade de leguminosas.
No 1º plano o Guando bastante desenvolvido.
(Maio, 1973).



Outro aspecto do experimento anterior, vendo-se
a Puerária javanica.