



Figura 8. Fruto com desenvolvimento comprometido pelo ataque do percevejo-do-abacaxi.

Métodos de controle e manejo

O método é preventivo, eliminando-se os restos culturais.

Autores deste tópico:Rodrigo Souza Santos ,Murilo Fazolin

Escalonamento da produção

Romeu de Carvalho Andrade Neto
Jacson Rondinelli da Silva Negreiros
Claudenor Pinho de Sá

A produção do abacaxizeiro é sazonal (por safra) e, por isso, os produtores têm dificuldades de honrar contratos de comercialização, o que causa flutuações da oferta e dos preços em certos períodos do ano.

O escalonamento da produção por meio da adoção de práticas e processos agropecuários (Figura 1) permite que o produto seja ofertado na época em que o preço for desejável, de forma que o produtor possa garantir uma renda relativamente estável ao longo do ano, com colheitas programadas para atender mercados locais ou atacadistas.

As práticas a seguir descritas, quando racional e tecnicamente integradas, podem viabilizar a produção de frutos nos diversos meses do ano. É de suma importância destacar que todos esses fatores devem ser considerados de forma conjunta e que um planejamento de todas as ações contribuirá com o sucesso do empreendimento.

Plantio em diferentes épocas

A época de plantio é o primeiro passo para programar a colheita na entressafra de forma a alcançar melhores preços do abacaxi.

Quando não há irrigação, a época mais indicada é no final da estação seca e início do período chuvoso, final de outubro a início de novembro.

O plantio pode se dar em qualquer época desde que haja um sistema de irrigação indicado para o abacaxizeiro. Um calendário de plantio pode ser criado com a finalidade de planejar datas de colheita.

Plantios em talhões por tipo e tamanho da muda

O plantio em talhões ou quadras deve ser realizado por tipo e tamanho das mudas.

De uma forma geral, mesmo plantadas na mesma época do ano, mudas de maior tamanho tendem a atingir as características desejáveis (porte e tamanho) à indução do florescimento em menor tempo ou idade, ou seja, entre 9 e 10 meses após o plantio.

Mudas de menor porte atingem tamanho adequado à indução floral mais tardiamente, normalmente acima de 12 meses.

Cultivar

Dependendo da cultivar, a idade de indução do florescimento e posterior colheita pode se dar de forma tardia ou precoce, sendo, portanto, uma forma de obter frutos em diferentes épocas do ano.

Correção e adubação

Plantas bem nutridas podem chegar mais jovens ao porte e vigor adequado para o tratamento de indução floral, o que abrevia a colheita e a comercialização dos frutos.

Sendo assim, o planejamento e a aplicação eficiente, racional e adequada de calcário e adubos podem antecipar o ciclo da cultura, com retorno mais rápido do capital investido pelo produtor.

Irrigação

No estado do Acre, a quantidade de chuva diminui a partir de abril, atingindo os menores índices nos meses de junho, julho, agosto e setembro. Portanto, não atende as necessidades da cultura que precisa de 60 mm a 120 mm de água por mês. Assim, a irrigação é indiscutivelmente uma prática recomendável para o escalonamento da produção do abacaxizeiro nas condições climáticas do Acre.

Indução artificial do florescimento

Quando se deseja garantir frutos o ano inteiro, o uso de reguladores vegetais nos cultivos torna-se obrigatório, tanto para induzir quanto para retardar o florescimento natural das plantas. Com essa tecnologia, o abacaxicultor obtém produção mais homogênea, além de um planejamento com segurança das épocas de colheita. A indução floral deve ser realizada de 5 a 6 meses antes da colheita planejada e as plantas devem estar bem formadas, com vigor vegetativo e porte adequado. Isso geralmente é atingido de 9 a 12 meses após o plantio. Para promover a indução pode ser utilizado o carbureto de cálcio (0,5 g a 1,0 g no olho de cada planta) ou produto à base de etefon (1,5 mL do produto comercial por litro de água a 2% de ureia). Um cálculo prático para o preparo da calda consiste em adicionar 30 mL do produto comercial à base de etefon, mais 400 g de ureia e completar com água em um pulverizador costal de 20 litros.

Como no Acre há um período de seca, a indução floral com o objetivo de produzir o ano todo deve ser associada ao uso de irrigação nas épocas

de menor precipitação.

Colheita

De acordo com o destino da produção e distância do centro de produção ao consumidor, os frutos podem ser colhidos em diferentes estádios de maturação. Para as indústrias locais, os frutos podem ser colhidos mais maduros, podendo ficar mais tempo no campo. Para o mercado in natura podem ser colhidos mais cedo, isto é, a partir dos primeiros sinais de amarelecimento.



Figura 1. Práticas a serem adotadas para que o escalonamento da produção seja realizado com sucesso.