



Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária - MAARA
 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA
Centro Nacional de Pesquisa de Arroz e Feijão - CNPAF
Goiânia, GO

**INFORMATIVO ANUAL DAS
COMISSÕES TÉCNICAS REGIONAIS DE FEIJÃO:
CULTIVARES DE FEIJÃO RECOMENDADAS PARA PLANTIO
NO ANO AGRÍCOLA 1994/95**

Goiânia, GO
1995

Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária - MAARA
 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA
Centro Nacional de Pesquisa de Arroz e Feijão - CNPAF
Goiânia, GO

**INFORMATIVO ANUAL DAS
COMISSÕES TÉCNICAS REGIONAIS DE FEIJÃO:
CULTIVARES DE FEIJÃO RECOMENDADAS PARA PLANTIO
NO ANO AGRÍCOLA 1994/95**

Exemplares desta publicação devem ser solicitados ao:

Centro Nacional de Pesquisa de Arroz e Feijão - CNPAF

Rodovia Goiânia-Santo Antônio de Goiás, km 12

Caixa Postal 179

Fone: (062) 212-1999

Telex: (062)2241

Fax: (062) 212-2960

74.001-970 Goiânia, GO

Tiragem: 300 exemplares.

Informativo Anual das Comissões Técnicas Regionais de Feijão:
cultivares de feijão recomendadas para plantio no ano agrícola
1994/95. Goiânia: EMBRAPA-CNPAF, 1995.

Anual.

I. Feijão - Cultivar - Recomendação - Brasil. I. EMBRAPA.
Centro Nacional de Pesquisa de Arroz e Feijão (Goiânia, GO).

II. Título: Cultivares de feijão recomendadas para plantio no ano
agrícola 1994/1995.

CDD 635.652

© EMBRAPA, 1995.

APRESENTAÇÃO

Uma das fases consideradas mais decisivas no processo de domesticação das plantas cultivadas corresponde àquela em que o homem começou a semear o que havia anteriormente colhido, pois, naquele momento, passou a dar preferência à propagação das formas que melhor atendiam as suas necessidades.

Essa preocupação de se usar a forma, ou melhor, a variedade que melhor se adapta às condições ecológicas locais ou que atenda a exigências particulares, sempre foi, de fato, uma característica comum a todos os agricultores, desde os primitivos até os empreendedores da agricultura mais tecnificada de hoje. Isso permite maximizar os efeitos de todas as tecnologias e práticas de manejo utilizadas no sistema de produção.

Reconhecendo a importância de se prover todas as regiões brasileiras de um leque de cultivares de feijão mais diversificadas e de melhor adaptação, o Centro Nacional de Pesquisa de Arroz e Feijão (CNPAF) não tem medido esforços para permitir o desenvolvimento pleno de todas as atividades das Comissões Técnicas Regionais de Feijão (CTFeijão), que empreendem um programa integrado e dinâmico de avaliação de cultivares e linhagens de feijão, possibilitando que cada instituição participante tenha acesso às linhagens mais promissoras das demais instituições do país, bem como a todos seus mais recentes avanços na área de melhoramento genético da espécie.

Há doze anos, as CTFeijão têm relacionado, em suas reuniões anuais, as cultivares já difundidas ou linhagens aptas a serem lançadas como novas cultivares, que, à luz das avaliações cuidadosamente planejadas, se revelaram as mais convenientes ao uso pelos agricultores por razões diversas. Essa relação de cultivares tem sido, quase que invariavelmente, encaminhada às Comissões Regionais de Avaliação e Recomendação de Cultivares de Feijão (CRCFeijão), como sugestão

para recomendação. Desde 1994, o CNPAF, adicionalmente, vem divulgando a lista das cultivares oficialmente recomendadas, por meio deste informativo, esperando, com isso, contribuir para que o agricultor possa escolher, da forma que lhe aprouver, a melhor cultivar disponível para as suas condições.

Homero Aidar
Chefe do CNPAF

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	3
INTRODUÇÃO	7
INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DAS CTFeijão.....	9
CULTIVARES DE FEIJÃO RECOMENDADAS PARA OS ESTADOS	
. Acre	11
. Alagoas	11
. Bahia	12
. Ceará	13
. Espírito Santo	13
. Goiás e Distrito Federal	13
. Mato Grosso	14
. Mato Grosso do Sul	14
. Minas Gerais	15
. Pará	15
. Paraíba	15
. Paraná	16
. Pernambuco	17
. Rio Grande do Norte	17
. Rio Grande do Sul	18
. Rio de Janeiro	18
. Rondônia	19
. Santa Catarina	19
. São Paulo	19
. Sergipe	20
. Tocantins	20
CARACTERÍSTICAS DAS PRINCIPAIS CULTIVARES DE FEIJÃO.....	21

INTRODUÇÃO

As Comissões Regionais de Avaliação e Recomendação de Cultivares de Feijão (CRCFeijão) foram instituídas em 21 de julho de 1981, pela portaria nº 178 do Ministério da Agricultura. Abrangendo 26 estados brasileiros, as CRCFeijão dividem o país em três grandes regiões:

Região I - Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná;

Região II - Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal, Tocantins, Rondônia, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo; e

Região III - Bahia, Sergipe, Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Ceará, Maranhão, Pará, Amazonas, Acre, Roraima e Amapá.

Para operacionalização foram constituídos colegiados representativos do Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, da Assistência Técnica e Extensão Rural, dos produtores de sementes e da Secretaria Nacional de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária (MAARA), sob a coordenação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA). Anualmente, são realizadas as reuniões das Comissões Técnicas Regionais com o objetivo final de dar subsídios às CRCFeijão para lançamento e/ou recomendação de novas cultivares, como também revisar a lista oficial de recomendação. Dentro do mesmo segmento, realizam-se as reuniões das CRCFeijão, que referendam a indicação das cultivares para homologação pelo MAARA e publicação no Diário Oficial da União. Ficam resguardadas, assim, as garantias de utilização dessas cultivares, tanto como tecnologia recomendada quanto para fins de financiamento bancário.

INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DAS CTFeijão

REGIÃO I

COTRIJUÍ	Cooperativa Triticola de Ijuí (RS)
CNPAF	Centro Nacional de Pesquisa de Arroz e Feijão ^(*)
CNPT	Centro Nacional de Pesquisa de Trigo (RS)
CPACT	Centro de Pesquisa Agropecuária de Clima Temperado (RS)
EMATER/RS	Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do Sul (RS)
EPAGRI	Empresa de Pesquisa Agropecuária e Difusão de Tecnologia de Santa Catarina (SC)
FEPAGRO	Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária (RS)
FT	FT-Pesquisa e Sementes (PR)
FT	FT-Pesquisa e Sementes/OR (RS)
IAPAR	Instituto Agrônomico do Paraná (PR)
UEM	Universidade Estadual de Maringá (PR)
UFPEL/FAEM	Universidade Federal de Pelotas/Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel (RS)
UFPR	Universidade Federal do Paraná (PR)
UFSM	Universidade Federal de Santa Maria (RS)

REGIÃO II

CATI	Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (SP)
CNPAF	Centro Nacional de Pesquisa de Arroz e Feijão (GO) ^(*)
CNPMS	Centro Nacional de Pesquisa de Milho e Sorgo (MG)
CPAC	Centro de Pesquisa Agropecuária do Cerrado (DF)
CPAF/RO	Centro de Pesquisa Agroflorestal de Rondônia (RO)
CPAO	Centro de Pesquisa Agropecuária do Oeste (MS)
EMCAPA	Empresa Capixaba de Pesquisa Agropecuária (ES)
EMGOPA	Empresa Goiana de Pesquisa Agropecuária (GO)
EMPAER/MS	Empresa de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural do Mato Grosso do Sul (MS)
EMPAER/MT	Empresa de Pesquisa e Extensão Rural do Mato Grosso (MT)
EPAMIG	Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (MG)
UFLA	Universidade Federal de Lavras (MG)
ESUCARV	Escola Superior de Ciências Agrárias de Rio Verde (GO)

FEIS/UNESP	Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira (SP)
IAC	Instituto Agronômico de Campinas (SP)
PESAGRO	Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio de Janeiro (RJ)
UFV	Universidade Federal de Viçosa (MG)
UNITINS	Universidade do Estado do Tocantins (TO)

REGIÃO III

CNPAF	Centro Nacional de Pesquisa de Arroz e Feijão ^(*)
CPAA	Centro de Pesquisa Agroflorestal da Amazônia Ocidental (AM)
CPAF/AC	Centro de Pesquisa Agroflorestal do Acre (AC)
CPAF/AP	Centro de Pesquisa Agroflorestal do Amapá (AP)
CPAF/RR	Centro de Pesquisa Agroflorestal de Roraima (RR)
CPAMN	Centro de Pesquisa Agropecuária do Meio Norte (PI)
CPATC	Centro de Pesquisa Agropecuária dos Tabuleiros Costeiros (SE)
CPATSA	Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico Semi Árido (PE)
CPATU	Centro de Pesquisa Agroflorestal da Amazônia Oriental (PA)
EBDA	Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola S.A. (BA)
EMAPA	Empresa Maranhense de Pesquisa Agropecuária (MA)
EMEPA	Empresa de Pesquisa Agropecuária da Paraíba (PB)
EMPARN	Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (RN)
EPACE	Empresa de Pesquisa Agropecuária do Ceará (CE)
EPEAL	Empresa de Pesquisa Agropecuária de Alagoas (AL)
IPA	Empresa Pernambucana de Pesquisa Agropecuária (PE)

^(*)Instituição coordenadora das CTFeijão.

**CULTIVARES DE FEIJÃO RECOMENDADAS PARA O
ESTADO DO ACRE (REGIÃO III)**

CLASSE PREFERENCIAL

Carioca
Rosinha

**CULTIVARES DE FEIJÃO RECOMENDADAS PARA O
ESTADO DE ALAGOAS (REGIÃO III)**

CLASSE

PREFERENCIAL

Aporé
IPA 6
IPA 8

TOLERADA

Carioca
Mulatinho Vagem Roxa

CULTIVARES DE FEIJÃO RECOMENDADAS PARA O ESTADO DA BAHIA (REGIÃO III)

REGIÃO	CLASSE	
	PREFERENCIAL	TOLERADA
Além São Francisco	Aporé Carioca Corrente EMGOPA 201-Ouro EPABA 1 IPA 6 Jalo Precoce Rio Tibagi	IPA 1 IPA 7419 Mulatinho Vagem Roxa
Nordeste/Paraguaçu	Bagajó Cachinho Carioca EMGOPA 201-Ouro EPABA 1 Favinha IPA 1 Mulatinho Vagem Roxa São José	Rosinha
Vitória da Conquista	Carioca EMGOPA 201-Ouro IPA 6	Mulatinho Vagem Roxa
Irecê	Aporé Bambuí Carioca EPABA 1 IPA 6 IPA 7	

**CULTIVARES DE FEIJÃO RECOMENDADAS PARA O
ESTADO DO CEARÁ (REGIÃO III)**

CLASSE

PREFERENCIAL	TOLERADA
EMGOPA 201-Ouro IPA 1	Carioca

**CULTIVARES DE FEIJÃO RECOMENDADAS PARA O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (REGIÃO II)**

CLASSE

PREFERENCIAL	TOLERADA
Carioca	Capixaba Precoce
EMCAPA 404-Serrano	ESAL 1
EMCAPA 405-Goytacazes	IPA 1
EMGOPA 201-Ouro	Rio Negro
Neguinho	Rio Tibagi
Ouro Negro	
Rio Doce	
Rudá	
Xamego	

**CULTIVARES DE FEIJÃO RECOMENDADAS PARA O
ESTADO DE GOIÁS E DISTRITO FEDERAL (REGIÃO II)**

CLASSE

PREFERENCIAL	TOLERADA
Aporé	Jalo EEP 558
Carioca	Safira
Diamante Negro	
EMGOPA 201-Ouro	
Jalo Precoce	
Ônix	
Pérola	
Rudá	
Xamego	

CULTIVARES DE FEIJÃO RECOMENDADAS PARA O ESTADO DO MATO GROSSO (REGIÃO II)

CLASSE	
PREFERENCIAL	TOLERADA
Aporé	Rosinha G2
Carioca	
Diamante Negro	
EMGOPA 201-Ouro	
IAPAR 14 ⁽¹⁾	
Jalo EEP 558	
Jalo Precoce	
Pérola	
Rio Tibagi	
Safira	

⁽¹⁾ Para região de latitude 13°S.

CULTIVARES DE FEIJÃO RECOMENDADAS PARA O ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL (REGIÃO II)

CLASSE	
PREFERENCIAL	TOLERADA
Aporé	Carioca 80 SH/IAC Carioca
Carioca	FT 120
Carioca 80	Jalo EEP 558
Diamante Negro	
EMGOPA 201-Ouro	
FT-Bonito	
IAPAR 14	
Rio Tibagi	

**CULTIVARES DE FEIJÃO RECOMENDADAS PARA O
ESTADO DE MINAS GERAIS (REGIÃO II)**

CLASSE	
PREFERENCIAL	TOLERADA
Aporé	Carioca
Carioca MG	Carioca 80 SH/IAC Carioca
Meia Noite	Jalo EEP 558
Novo Jalo	Milionário 1732
Ouro	Mineiro Precoce
Ouro Branco	Rico 1735
Ouro Negro	
Roxo 90	
Rudá	
Vermelho 2157	

**CULTIVARES DE FEIJÃO RECOMENDADAS PARA O
ESTADO DO PARÁ (REGIÃO III)**

CLASSE PREFERENCIAL
Carioca
Rosinha

**CULTIVARES DE FEIJÃO RECOMENDADAS PARA O
ESTADO DA PARAÍBA (REGIÃO III)**

REGIÃO	CLASSE	
	PREFERENCIAL	TOLERADA
Agreste e Sertão	Carioca IPA 6	IPA 1
Curimataú	Carioca IPA 6	Favita Feijão de Cacho

**CULTIVARES DE FEIJÃO RECOMENDADAS PARA O
ESTADO DO PARANÁ (REGIÃO I)**

CLASSE	
PREFERENCIAL	TOLERADA
Carioca	FT - Paulistinha
FT 120	IAPAR 16
FT - Tarumã	
IAPAR 8-Rio Negro	
IAPAR 14	
IAPAR 20	
IAPAR 31	
IAPAR 44	
IAPAR 57 ⁽¹⁾	
IAPAR 65 ⁽¹⁾	
Rio Tibagi	

⁽¹⁾ Para cultivo apenas no período de janeiro a abril, nas regiões: I, Vale do Rio Paranapanema; II, Cascavel, Paranavaí, Londrina e Cambará; III, Wenceslau Braz; e IV, Ivaiporã.

**CULTIVARES DE FEIJÃO RECOMENDADAS PARA O
ESTADO DE PERNAMBUCO (REGIÃO III)**

REGIÃO	CLASSE	
	PREFERENCIAL	TOLERADA
Agreste	Aporé BR-IPA 10 BR-IPA 11-Brígida IPA 8 IPA 9	Favita Gordo Quixaba
Sertão do São Francisco (1º Semestre)	Aporé BR-IPA 10 BR-IPA 11-Brígida IPA 7 IPA 8 IPA 9	IPA 6
Sertão do São Francisco (2º Semestre)	IPA 7	HF 465.63.1

**CULTIVARES DE FEIJÃO RECOMENDADAS PARA O
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (REGIÃO III)**

CLASSE	
PREFERENCIAL	TOLERADA
Aporé Corrente IPA 7	BR-IPA 10 EMGOPA 201-Ouro

**CULTIVARES DE FEIJÃO RECOMENDADAS PARA O
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (REGIÃO I)**

CLASSE	
PREFERENCIAL	TOLERADA
BR-IPAGRO 1-Macanudo	BR-IPAGRO 2-Pampa
BR-IPAGRO 3-Minuano	EMPASC 201-Chaçecó
BR-IPAGRO 35-Macotaço	
Carioca	
FT 120	
FT 206	
Guateian 6662	
IAPAR 31	
IAPAR 44	
Iraí	
Rio Tibagi	

**CULTIVARES DE FEIJÃO RECOMENDADAS PARA O
ESTADO DO RIO DE JANEIRO (REGIÃO II)**

CLASSE	
PREFERENCIAL	TOLERADA
BR 1 - Xodó	BR 2 - Grande Rio
Ouro Negro	BR 3 - Ipanema
Porto Real	Carioca
Varre-Sai	
Xamego	

**CULTIVARES DE FEIJÃO RECOMENDADAS PARA O
ESTADO DE RONDÔNIA (REGIÃO II)**

CLASSE

PREFERENCIAL

Carioca
IPA 7419

TOLERADA

Rio Tibagi
Rosado

**CULTIVARES DE FEIJÃO RECOMENDADAS PARA O
ESTADO DE SANTA CATARINA (REGIÃO I)**

CLASSE PREFERENCIAL

BR 6-Barriga Verde
BR-IPAGRO 1-Macanudo
Carioca
Carioca 80 SH/IAC Carioca
EMPASC 201-Chapecó
FT 120
FT - Tarumã⁽¹⁾
IAPAR 44
Rio Tibagi

⁽¹⁾Para cultivo apenas nas regiões: II, Vale do Itajaí; III, Planalto Serrano e Planalto Norte; e V, Planalto Serrano (São Joaquim).

**CULTIVARES DE FEIJÃO RECOMENDADAS PARA O
ESTADO DE SÃO PAULO (REGIÃO II)**

CLASSE

PREFERENCIAL

Carioca
FT 120
IAC Carioca
IAC Maravilha
IAC Una
IAPAR 14
IAPAR 31
IAPAR 44

**CULTIVARES DE FEIJÃO RECOMENDADAS PARA O
ESTADO DE SERGIPE (REGIÃO III)**

REGIÃO	CLASSE	
	PREFERENCIAL	TOLERADA
Propriá	IPA 7	
Outras	Bagajó	Cachinho
	EMGOPA 201-Ouro	Carioca
	IPA 1	Favinha
	IPA 6	IPA 7419
	IPA 8	Milagre de Santo Antonio
	São José	Mulatinho Vagem Roxa

**CULTIVARES DE FEIJÃO RECOMENDADAS PARA O
ESTADO DO TOCANTINS (REGIÃO II)**

CLASSE PREFERENCIAL
Carioca
EMGOPA 201-Ouro

CARACTERÍSTICAS DAS PRINCIPAIS CULTIVARES DE FEIJÃO RECOMENDADAS PARA A SAFRA 1994/95

CULTIVAR	LINHAGEM	ORIGEM	LISTA DE RECOMENDAÇÃO ⁽¹⁾	PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
Aporé	LR 720982	CNPAF	1992	Grão tipo carioca, com halo amarelo; hábito de crescimento indeterminado - II/III; prostrado; ciclo normal; e resistente à antracnose, ferrugem, mancha-angular e ao mosaico-comum.
Bambuí	SC 9029883	CNPAF	1993	Grão tipo mulatinho; hábito de crescimento indeterminado - III; prostrado; ciclo normal; tolerante ao déficit hídrico; e resistente ao mosaico-comum.
Barriga Verde	BZ 1719-2 (A 705)	CIAT ⁽²⁾	1990	Grão preto; hábito de crescimento indeterminado - II/III; ciclo normal; e resistente ao crestamento-bacteriano-comum e ao mosaico-comum.
BR 1-Xodó	BAT 58	CIAT	1985	Grão preto; hábito de crescimento indeterminado-II; ereto; ciclo normal; e resistente ao mosaico-comum.
BR-IPA 10	LM 20445	CNPAF	1992	Grão preto; hábito de crescimento indeterminado-II; ciclo normal; e resistente à murcha-de-fusarium, ferrugem, antracnose e ao mosaico-comum.

CULTIVAR	LINHAGEM	ORIGEM	LISTA DE RECOMENDAÇÃO ⁽¹⁾	PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
BR-IPA 11 - Brígida	A 285 + A 281	CIAT	1994	Grão tipo carioca; hábito de crescimento indeterminado - II; semi-prostrado; ciclo normal; resistente à antracnose, ferrugem e murcha de fusarium.
BR-IPAGRO 1 - Macanudo	AN 512574	CNPAF	1989	Grão preto; hábito de crescimento indeterminado-III; prostrado; ciclo normal; e resistente à antracnose e ao mosaico-comum.
BR-IPAGRO 35 - Macotaço	AN 512575	CNPAF	1994	Grão preto; hábito de crescimento indeterminado - II; ereto; ciclo normal; resistente a antracnose e mosaico comum
Carioca	Seleção em lavoura de produtor em São Paulo	IAC	1980	Grão tipo carioca; hábito de crescimento indeterminado-III; prostrado; ciclo normal; e resistente ao mosaico-comum.
Carioca MG	ESAL 589	ESAL	1992	Grão tipo carioca; hábito de crescimento indeterminado-II; porte ereto; ciclo normal; e resistente ao mosaico-comum.
Corrente	AN 512717	CNPAF	1993	Grão tipo mulatinho; hábito de crescimento indeterminado-II; semi-ereto; ciclo normal; e resistente à antracnose, ao crestamento-bacteriano-comum e ao mosaico-comum.

CULTIVAR	LINHAGEM	ORIGEM	LISTA DE RECO-MENDADO(1)	PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
Diamante Negro	CB 720160	CNPAF	1991	Grão preto; hábito de crescimento indeterminado-II; semi-ereto; ciclo normal; e resistente ao crestamento-bacteriano-comum e ao mosaico-comum.
EMCAPA 404-Serrano	A 230	CIAT	1989	Grão preto; hábito de crescimento indeterminado-II/III; ereto; ciclo normal; resistente à antracnose e ao mosaico-comum; e tolerante à ferrugem, ao crestamento-bacteriano-comum, à mancha-de-ascoquita, à murcha-de-fusarium e ao oídio.
EMCAPA 405-Goytacazes	BZ 3815-1	CIAT	1992	Grão tipo carioca; hábito de crescimento indeterminado-II; ereto; ciclo normal; e resistente ao mosaico-comum e à antracnose.
EMGOPA 201-Ouro	A 295	CIAT	1984	Grão tipo jalinho; hábito de crescimento indeterminado-II; ereto; ciclo normal; e resistente à antracnose, ferrugem e ao mosaico-comum.
EMPASC 201-Chapécó	LINEA 38	ICA ⁽³⁾	1983	Grão preto; hábito de crescimento indeterminado-II; ereto; ciclo normal; e resistente à ferrugem e antracnose.
EPABA 1	EMP 86	CIAT	1984	Grão tipo mulatinho; hábito de crescimento indeterminado-II; ereto; ciclo normal; e resistente ao mosaico-comum.

CULTIVAR	LINHAGEM	ORIGEM	LISTA DE RECOMENDAÇÃO ⁽¹⁾	PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
FT 120	FT 83-120	FT - Pesquisa e Sementes	1986	Grão preto; hábito de crescimento indeterminado-II; ereto; ciclo normal; e resistente ao mosaico-comum.
FT 206	FT 85-206	FT - Pesquisa e Sementes	1992	Grão tipo carioca; hábito de crescimento indeterminado-II; ereto; e ciclo normal.
FT - Bonito	FT 85-79	FT - Pesquisa e Sementes	1992	Grão tipo carioca; hábito de crescimento indeterminado-II; semi-ereto; ciclo normal; e resistente ao mosaico-comum.
FT - Tarumã	FT 83-86	FT - Pesquisa e Sementes	1987	Grão preto; hábito de crescimento indeterminado-II; ereto; e resistente ao mosaico-comum e à antracnose.
IAC Carioca	Seleção no Carioca 80	IAC	1987	Grão tipo carioca; hábito de crescimento indeterminado-II/III; semi-ereto; e resistente ao mosaico-comum.
IAPAR 14	IAPAR BAC 38	IAPAR	1986	Grão tipo carioca, com halo amarelo; hábito de crescimento indeterminado-III; prostrado; ciclo normal; resistente ao mosaico-comum e à antracnose; e tolerante ao crestamento-bacteriano-comum.

CULTIVAR	LINHAGEM	ORIGEM	LISTA DE RECOMENDAÇÃO ⁽¹⁾	PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
IAPAR 31	IAPAR BAC 204	IAPAR	1990	Grão bege, com pontuação havana, com halo amarelo; hábito de crescimento indeterminado-II; ereto; ciclo normal; resistente ao mosaico-comum e à antracnose; e tolerante ao crestamento-bacteriano-comum e à ferrugem.
IAPAR 44	RAI 303	IAPAR	1990	Grão preto; hábito de crescimento indeterminado-II; ereto; ciclo normal, com possibilidade de colheita mecânica; resistente ao mosaico-comum; e com tolerância de campo à antracnose.
IAPAR 57	MD 806	IAPAR	1992	Grão tipo carioca; hábito de crescimento indeterminado-II; e tolerante ao mosaico-comum.
IAPAR 65	MD 821	IAPAR	1993	Grão preto; e tolerante ao mosaico-dourado.
IPA 6	L 1055	IPA	1985	Grão tipo mulatinho; hábito de crescimento indeterminado-III; prostrado; ciclo normal; e resistente ao mosaico-comum e à ferrugem.
IPA 7	(L92009 + L92093 + L92109 + L92157)	IPA	1989	Grão tipo mulatinho; hábito de crescimento indeterminado-III; prostrado; ciclo normal; e tolerante à alta temperatura e à murcha-de-fusarium.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

LISTA DE RECOMENDAÇÃO⁽¹⁾

ORIGEM

LINHAGEM

CULTIVAR

CULTIVAR	LINHAGEM	ORIGEM	LISTA DE RECOMENDAÇÃO ⁽¹⁾	PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
IPA 8	L 10111	IPA	1990	Grão tipo mulatinho; hábito de crescimento indeterminado-III; ciclo normal; e resistente à murcha-de-fusarium e ferrugem.
IPA 9	82 PVBZ 1783	CIAT	1992	Grão tipo mulatinho; hábito de crescimento indeterminado-II; ciclo médio; e resistente à murcha-de-fusarium, ferrugem, antracnose e ao mosaico-comum.
Jalo EEP 558	-	IPEACO/ EEP ⁽⁴⁾	1980	Grão tipo jalo; hábito de crescimento indeterminado-III; prostrado; ciclo médio; e tolerante à mancha-angular.
Jalo Precoce	PR 923450	CNPAF	1993	Grão tipo jalo; hábito de crescimento indeterminado-II; semi-ereto; precoce; e tolerante à mancha-angular e ao crestamento-bacteriano-comum.
Meia Noite	2248	EPAMIG	1994	Grão preto, porte ereto.
Mínuano	AN 511619	CNPAF	1991	Grão preto; hábito de crescimento indeterminado-III; ciclo normal; e resistente ao mosaico-comum e à antracnose.
Neginho	L 18	EMCAPA	1994	Grão preto, tolerante ao deficit hídrico
Novo Jalo	MA 534620	CNPAF	1993	Grão tipo jalo; hábito de crescimento determinado-I; ereto; ciclo médio; resistente à antracnose; e tolerante à mancha-angular.

CULTIVAR	LINHAGEM	ORIGEM	LISTA DE RECOMENDAÇÃO ⁽¹⁾	PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
Ônix	LM 30630	CNPAF	1992	Grão preto; hábito de crescimento indeterminado-II; ereto; ciclo normal; tolerante ao mosaico-dourado; e resistente ao mosaico-comum.
Ouro Branco	WAF 16	CIAT	1993	Grão branco grande; hábito de crescimento determinado-I; ereto; ciclo médio; e resistente ao mosaico-comum.
Ouro Negro	Honduras 35	Honduras	1991	Grão preto; hábito de crescimento indeterminado-III; prostrado; ciclo normal; alta capacidade de fixação simbiótica de nitrogênio; resistente à ferrugem e antracnose; e tolerante ao frio.
Pérola	LR 720982CPL53	CNPAF	1994	Grão tipo carioca; hábito de crescimento indeterminado-II/III; semi-ereto a prostrado; ciclo normal; resistente a mancha angular, ferrugem e mosaico comum.
Porto Real	FT 85-75	FT - Pesquisa e Sementes	1993	Grão tipo carioca; hábito de crescimento indeterminado-II; e ciclo normal.
Roxo 90	ESAL 572	ESAL	1992	Grão roxo; hábito de crescimento indeterminado-III; e ciclo normal.
Rudá	A 285	CIAT	1994	Grão tipo carioca; hábito de crescimento indeterminado - II; ereto; ciclo normal; resistente à antracnose e mosaico comum, e suscetível à mancha angular.

CULTIVAR	LINHAGEM	ORIGEM	LISTA DE RECOMENDÇÃO ⁽¹⁾	PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
Safira	PR 710315	CNPAP	1991	Grão vermelho-escuro; hábito de crescimento indeterminado-II; ereto; ciclo médio, com possibilidade de colheita mecânica; e resistente ao mosaico-comum.
São José	BZ 2231-7	CIAT	1992	Grão tipo mulatinho, hábito de crescimento indeterminado-II; semi-ereto; ciclo normal; e resistente à antracnose e ao mosaico-comum.
Varre-Sai	LM 10363	CNPAP	1991	Grão preto; hábito de crescimento indeterminado-II; ereto; ciclo normal; e resistente ao mosaico-comum.
Vermelho 2157	RAB 94	CIAT	1993	Grão vermelho-claro; hábito de crescimento indeterminado-II; ereto; ciclo normal; e resistente à antracnose e ao mosaico-comum.
Xamego	FE 732007	CNPAP	1993	Grão preto; hábito de crescimento indeterminado-II; ereto; ciclo normal; e resistente à murcha-de-fusarium, antracnose e mancha-angular.

(1) Ano em que a cultivar foi incluída na lista de recomendação.

(2) Centro Internacional de Agricultura Tropical.

(3) Instituto Colombiano Agropecuário.

(4) Instituto de Pesquisa Agropecuária do Centro-Oeste/Estação Experimental de Patos de Minas