



PERFORMANCE SUPERIOR

Distribuidor

Valores ou características sujeitos a variações em função do ambiente de cultivo. Consulte sempre um engenheiro-agrônomo.

Foto: Luiz Henrique Magnante. Arte: Bianca Helena Todero. Ano: 2019

BRS 5804RR



MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA
E ABASTECIMENTO



PÁTRIA AMADA
BRASIL
GOVERNO FEDERAL



BRS 5804RR

5.8 G.M.R
PRECOCIDADE

94 sacas/ha*
PRODUTIVIDADE

RESISTENTE A FITÓFTORA

INDETERMINADO
TIPO DE CRESCIMENTO

210g
PMS

AMPLA JANELA DE SEMEADURA

ESTATURA MÉDIA ALTA

ARQUITETURA ERETA

1 É POUCO
2 É BOM
3 É ÓTIMO
4 É BOM
DEMAIS

*MACRORREGIÃO SOJÍCOLA 1, 22 AMBIENTES, MÉDIA DE 3 ANOS. FONTE: DADOS DA EMBRAPA



REACÃO A DOENÇAS

PODRIDÃO RADICULAR DE FITÓFTORA **R**

CANCRO DA HASTE **R**

MANCHA OLHO DE RÃ **R**

MOSAICO COMUM DA SOJA **R**


PODRIDÃO PARDA DA HASTE **R**

PÚSTULA BACTERIANA **R**

NEMATOIDES DE GALHA E DE CISTO **S**

R - RESISTENTE S - SUSCETÍVEL

REGIÕES DE ADAPTAÇÃO



ÉPOCA DE SEMEADURA E POPULAÇÃO DE PLANTAS

REGIÃO EDAFOCLIMÁTICA DE ADAPTAÇÃO (REC)	ALTITUDE (m)	OUT				NOV				DEZ		CICLO (dias)***
		1s	2s	3s	4s	1s	2s	3s	4s	1s	2s	
102 RS (Noroeste); SC (Oeste); PR (Sudeste)	Até 600	14	13	12	12	12	12	13	14			
	Acima 600	12	11	10	10	10	10	11	12		125 a 135	
103 RS (Noroeste); SC (Centro-Norte); PR (Centro-Sul)	Até 600	14	13	12	12	12	12	13	14			
	Acima 600	12	11	10	10	10	10	11	12		116 a 125	
PR (Nordeste); SP (Sul)	Até 600	14	13	12	12	12	12	13	14			
	Acima 600	13	12	11	11	11	11	12	13			

Preferencial
Tolerada

*1s = 1ª semana; 2s = 2ª semana; etc. **Espaçamento entre linhas = 0,45 m.
***Da emergência até a maturação da colheita.