

Vários fatores influenciam o desempenho dos ovinos na engorda. No animal os principais fatores são: sexo, idade, peso, raça, grau de gordura corporal e condições sanitárias; no ambiente são: alimentação, instalações, pasto, clima e manejo geral.

Os animais antes de iniciarem o manejo de engorda devem ser selecionados, pois alguns não se desenvolvem de maneira satisfatória, comprometendo a eficiência da terminação. Para diminuir esse risco alguns pontos devem ser avaliados:

- **peso vivo** (mínimo de 18 kg);
- **escore de condição corporal – ECC** (evitar animal muito magro, ECC $\approx$ 1,5 e muito gordo, ECC $\geq$ 4,0, que já esteja passando do “ponto de abate”);
- **sexo** (machos – inteiros e castrados; as fêmeas jovens devem ser utilizadas para substituir as matrizes descartadas do rebanho);
- **idade** (menor que 1 ano – animais sem troca dentária, “dente de leite”); e
- **sanidade e defeitos** (não colocar na engorda cordeiros com sintomas de doenças: anemia, diarreia, linfadenite – “mal do caroço”, ectima – “boqueira”, pododermatite – “mal do casco”, catarro e conjuntivite; evitar animais com defeitos na boca – “queixo curto”, “queixo comprido”, “boca torta”).

Alguns dos critérios acima podem ser adequados de acordo com o padrão de carcaça demandado pelo comprador (peso da carcaça e quantidade de gordura).

Para mais informações, acesse o Serviço de Atendimento ao Cidadão - SAC da Embrapa, disponível em www.embrapa.br/fale-conosco/sac

Fotos: Acervo Embrapa

PASSO A PASSO PARA SELEÇÃO DE CORDEIROS PARA TERMINAÇÃO



Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Embrapa Caprinos e Ovinos
Estrada Sobral/Groalhas, km 04
Caixa Postal 145
CEP: 62010-970 | Sobral-CE
Telefone: (88) 3112.7400
www.embrapa.br/caprilinos-e-ovinos
 [embrapacaprinosovinos](https://www.facebook.com/embrapacaprinosovinos)

Projeto:



Apoio:



Realização:



Patrocínio:



PASSO A PASSO PARA SELEÇÃO DE CORDEIROS PARA TERMINAÇÃO



1

Condução do rebanho que será avaliado para um curral de manejo.



3

Avaliação da coloração da conjuntiva - grau de anemia (Famacha®).



4

Coleta de fezes para realização de diagnóstico de verminose e eimeriose (OPG/OOPG).



2

Inspeção e palpação individual dos cordeiros para avaliação de aspectos sanitários e morfológicos (idade, sexo, alterações morfológicas e sanitárias).



6

Pesagem individual dos cordeiros (balança fixa com gaiola ou portátil).



7

Identificação numérica (brinco, tatuagem, colar numerado...) de cada cordeiro, caso não exista numeração individual.



8

Anotação dos dados em ficha de campo (número, peso, ECC, Famacha®, sexo, idade, raça, alterações sanitárias e morfológicas, proprietário).



9

Separação dos cordeiros selecionados.