Controle Estratégico para Combater o Carrapato-do-Boi em Vacas Leiteiras

Renato Andreotti, Marcos Valério Garcia, Leandro de
Oliveira Souza Higa e Jacqueline Cavalcante Barros

1. O que é

Controle estratégico é um conjunto de medidas recomendadas aos produtores que, quando adotadas de forma correta e sistematizada, tendem a controlar as infestações do carrapato nos bovinos, evitando assim contínuas perdas, seja na aquisição de carrapaticidas, seja na diminuição da produção de leite e/ou carne.

O carrapato-do-boi, cujo nome científico é *Rhipicephalus microplus*, tem o ciclo de vida parasitária em torno de 21 dias em um único hospedeiro que, preferencialmente, são os bovinos de origem europeia (vaca holandesa) e seus cruzamentos, por serem também mais sensíveis. Vacas com produção média de 20 kg/dia, com uma infestação de 38 carrapatos/dia, vão produzir 90 kg/ano a menos de leite.

Vale ressaltar que os carrapatos observados no animal representam apenas 5% da população total, sendo que o restante (95%) se encontra livre na pastagem. Sabe-se também que este parasito é responsável pela transmissão dos patógenos que causam a tristeza parasitária bovina (TPB), que pode levar os animais à morte. Segundo a literatura, esse carrapato é responsável por um prejuízo de aproximadamente 3,24 bilhões de dólares por ano na cadeia produtiva bovina no Brasil. Atualmente, a principal forma de controle utilizada é realizada por meio de acaricidas, que podem ser aplicados de diferentes formas nos bovinos: injetáveis, por banhos (aspersão) e *pour-on*.

No entanto, estudos têm mostrado que os carrapaticidas de contato (banho, aspersão), quando bem aplicados, apresentam melhores resultados na eficácia do controle. Mesmo assim, existe um grande problema: surgimento de populações de carrapatos resistentes a diversas classes de acaricidas relacionado com o emprego contínuo do mesmo produto. Também há outros fatores, como o mau uso destes carrapaticidas e as características genéticas do carrapato. No Brasil, mais de 50% dos estados já apresentam relatos de populações desses carrapatos resistentes às diversas classes de acaricidas.

2. Benefícios e/ou vantagens

- O benefício principal do controle estratégico é a economia gerada pela redução na quebra na produção do leite e no emprego de acaricidas.
- Está alinhado à demanda do mercado, cada dia mais exigente em relação à procedência e qualidade dos produtos de origem animal.
- Vai ao encontro do alto interesse em preservar e assumir um comprometimento de reduzir a poluição ambiental.

3. Como utilizar

Para a realização do controle estratégico do carrapato, é necessário o produtor tomar conhecimento e utilizar os passos recomendados:

- 1) Fazer o teste de laboratório (Bioensaio) para avaliar a sensibilidade dos carrapatos aos acaricidas e, assim, saber qual deles é o mais adequado, e para poder comprar o produto certo, lembrando que, para cada propriedade, existe a necessidade de um teste. Esse teste pode ser realizado na Embrapa Gado de Corte (Campo Grande, MS) de maneira gratuita para todos os produtores interessados.

- 2) Aplicar o carrapaticida na época do ano mais adequada. A sugestão é iniciar o controle no final do período seco (setembro), época desfavorável à população de carrapatos na pastagem. Realizar de cinco a seis tratamentos com carrapaticidas de contato, dentro de intervalos menores que 21 dias cada.
- 3) Seguir com rigor as recomendações do fabricante do produto a ser utilizado, tais como: misturar bem o produto, dosagem, período de carência para o uso do leite e permissão para uso em vacas lactantes.
- 4) Tomar cuidados na hora da aplicação do produto. O operador deve usar equipamentos de proteção individual (EPIs), tais como: macacão adequado, luvas, máscara e óculos. Tomar muito cuidado com a direção do vento, procurar sempre banhar os animais a favor do mesmo para evitar intoxicação.
- 5) Realizar o tratamento sempre com o animal contido (preso). No caso de tratamento com acaricida de contato (aspersão), a aplicação deve ser feita no sentido contrário ao pelo e com pressão suficiente para alcançar os carrapatos em todo o corpo (cara, orelha e entre pernas). É importante lembrar que é preciso evitar horários de sol forte e dias chuvosos.
- 6) Reduzir ao máximo a infestação de larvas na pastagem. O animal recém-tratado deve retornar ao mesmo pasto para que as larvas que lá estão possam subir no animal e entrar em contato com o produto e morrer. As larvas que sobreviverem serão mortas no próximo tratamento.
- 7) Ficar atento aos animais que sofrem maiores infestações, “animais de sangue doce”. Eles merecem maior atenção e, se necessário, devem receber o tratamento mais vezes, pois são os responsáveis pela recontaminação do pasto.
- 8) Controlar a entrada de novos animais no sistema. Estes devem ser tratados no local de origem e mantidos isolados até a constatação de que estão livres de carrapatos para, só então, colocá-los junto com os demais animais da propriedade.

- 9) Evitar misturar animais (cavalo, vaca, cabra, carneiro, etc.) no mesmo pasto, pois cada uma dessas espécies pode apresentar um carrapato de espécie diferente, dificultando assim o tratamento e controle.
- 10) Repetir anualmente o teste de sensibilidade dos carrapatos. Trocar o produto utilizado para controlar os carrapatos somente quando aparecer resistência constatada pelo teste de sensibilidade. O produto deve ser substituído por outro que tenha mecanismo de ação diferente e tenha sido aprovado no teste.

4. Onde obter mais informações

A Embrapa Gado de Corte mantém uma página na internet com informações sobre controle de carrapatos, o Museu do carrapato: <https://bit.ly/2Hn69CB>

Vídeos:

Museu do carrapato 2015 – Sanidade: <https://youtu.be/DAHmkNIV8fg>

Museu do carrapato e curiosidades – Sanidade: <https://youtu.be/GBGxvKQRY4Q>

Publicações:

Museu do carrapato da Embrapa Gado de Corte: espécimes de carrapatos descritos no Brasil e depositados na coleção até o momento: <https://bit.ly/2Smxk6l>

Espécies de carrapatos relatadas no estado de Mato Grosso do Sul: <https://bit.ly/2Sdsp7E>

Carrapatos (Acari: Ixodidae) associados ao ambiente em Campo Grande, Mato Grosso do Sul: <https://bit.ly/3zljfJi>

Instituição:

Embrapa Gado de Corte

<http://www.embrapa.br/gado-de-corte>

Fone: (67) 3368-2000

Campo Grande, MS

Foto: Marcos Valério Garcia

Capim com aglomerados de larvas à espera dos bovinos.

Foto: Renato Andreotti

Ciclo de vida do carrapato-do-boi.