

Zoneamento de risco econômico de *Bactrocera carambolae* para produção de tangerina no Brasil

George Amaro¹
Elisangela Gomes Fidelis²
Ricardo Siqueira da Silva³
Cesar Augusto Marchioro⁴

A mosca-da-carambola *Bactrocera carambolae* Drew & Hancock, 1994 (Diptera: Tephritidae) é uma espécie de mosca-das-frutas nativa do sudeste asiático, com registros de ocorrência em países como Malásia, Tailândia e Indonésia (Schutze et al., 2015). No Brasil, essa espécie é classificada como praga quarentenária presente (PQP), tendo ocorrências em áreas dos estados do Amapá (AP), Pará (PA) e Roraima (RR), desde 1996 (Jesus-Barros et al., 2017; Lemos et al., 2014). *Bactrocera carambolae* é altamente polífaga, com preferência por frutos de espécies como *Averrhoa carambola* (carambola), *Mangifera indica* (manga), *Syzygium samarangense* (jambo) e *Psidium guajava* (goiaba), podendo causar danos significativos à fruticultura devido à oviposição e ao desenvolvimento larval nos frutos (Belo et al., 2020; Castilho et al., 2019; Sánchez-Tapia et al., 2020). Além dos prejuízos diretos, sua presença pode acarretar restrições fitossanitárias ao comércio interestadual e internacional, impactando a economia agrícola (CABI, 2021; Clarke et al., 2005).

A tangerina (*Citrus reticulata*), também conhecida como mexerica ou bergamota em diferentes regiões do Brasil, é uma das principais espécies de citros cultivadas no mundo, com destaque para sua relevância comercial, nutricional e cultural. Entre 2013 e 2023, a China manteve-se como o maior produtor global, seguida por países como Espanha, Turquia, Marrocos e Egito, responsáveis por significativa parcela da produção e exportação mundial (FAO, 2025). No Brasil, oitavo maior produtor em 2023, a cultura da tangerina concentra-se principalmente nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul, que juntos respondem por mais de 90% da produção nacional (IBGE, 2024). A variedade Ponkan é a mais cultivada, seguida pelas cultivares Montenegrina e Murcott, sendo amplamente consumidas in natura e também utilizadas na indústria de sucos e concentrados, com agregação de valor e diversificação dos canais de comercialização (Silva; Oliveira, 2023). Em 2023, as exportações

¹ Pesquisador da Embrapa Roraima, MSc. Economia, Boa Vista, RR, Brasil. E-mail: george.amaro@embrapa.br.

² Pesquisadora da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, DSc. Entomologia, Brasília, DF, Brasil. E-mail: elisangela.fidelis@embrapa.br.

³ Professor e Pesquisador da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, DSc. Fitotecnia, Diamantina, MG, Brasil. Guest Researcher at Department of Ecological Modelling, Helmholtz Centre for Environmental Research – UFZ, DSc. Fitotecnia, Leipzig, Germany. E-mail: ricardo.siqueira@ufvjm.edu.br.

⁴ Professor e Pesquisador da Universidade Federal de Santa Catarina, DSc. Zoologia, Curitiba, SC, Brasil. E-mail: cesmarc@gmail.com.

brasileiras de tangerina totalizaram aproximadamente 125 toneladas, com receita de US\$ 258,3 mil, tendo como principais destinos os mercados da Europa e América do Norte (MDIC, 2025). A cadeia produtiva da tangerina gera impactos econômicos e sociais significativos, especialmente para pequenos e médios produtores, contribuindo para a segurança alimentar, a ocupação da mão de obra rural e o desenvolvimento regional sustentável.

Para um manejo eficaz das espécies exóticas invasoras, é necessário compreender sua distribuição atual e potencial. Estima-se que espécies invasoras custem US\$ 423 bilhões anualmente em escala global, sendo que esse custo aumentou significativamente nas últimas décadas, dobrando aproximadamente a cada seis anos (Diagne et al., 2021; Henry et al., 2023). Entre 1984 e 2019, os custos relacionados às espécies invasoras no Brasil totalizaram, no mínimo, US\$ 105,53 bilhões. Desse montante, cerca de US\$ 104,33 bilhões referem-se a prejuízos e danos causados por essas espécies, enquanto apenas US\$ 1,19 bilhão foi direcionado a ações de manejo, como prevenção, controle ou erradicação (Adelino et al., 2021), embora esses valores possam estar subestimados em cerca de 1.646% (Soto et al., 2025). A quantidade cada vez maior de invasões por espécies exóticas, como resultado do aumento do comércio de bens e serviços, é parcialmente responsável pelo aumento dos impactos econômicos ao longo do tempo (Seebens et al., 2017, 2021; Turbelin et al., 2022).

O zoneamento de risco econômico de espécies invasoras para a produção agrícola brasileira é uma ferramenta importante para a orientação e formulação de políticas públicas fitossanitárias e a gestão de custos de produção por parte dos produtores. A partir do cruzamento de modelos de distribuição geográfica potencial de espécies com indicadores econômicos de concentração produtiva (que permitem avaliar a importância econômica de uma cultura para a produção agrícola municipal) podem ser estimados os prejuízos econômicos potenciais causados por espécie invasoras aos municípios do Brasil.

Foram utilizados 175 pontos georreferenciados de ocorrências globais de *B. carambolae* (após ajustes e correção do viés de amostragem) a partir de diversas fontes, incluindo dados do GBIF⁵ e literatura (Amaro et al., 2025a), e 19 variáveis bioclimáticas derivadas das médias anuais de temperatura máxima mensal, temperatura mínima mensal e precipitação acumulada, entre os anos 2000 e 2021 com resolução espacial de 30 segundos do WorldClim 2.1⁶ e uma variável de elevação (SRTM), para calibrar um modelo de máxima entropia (Maxent), através de um processo de pontos de Poisson (IPP) não homogêneo (Phillips, 2008, 2017; Phillips et al., 2017; Phillips; Anderson; Schapire, 2006; Renner et al., 2015; Renner; Warton, 2013).

O modelo foi gerado utilizando um *workflow* totalmente automatizado desenvolvido em ambiente R (R Core Team, 2023). Para projeção do modelo nas condições climáticas atuais para o Brasil, foi utilizado um conjunto de 19 variáveis bioclimáticas geradas a partir das normais climatológicas do período 1994-2023, com dados BR-DWGD (Xavier et al., 2022), juntamente com a mesma variável de elevação.

⁵ <https://doi.org/10.15468/dl.gq4erm>

⁶ <https://worldclim.org/data/monthlywth.html>

O modelo desenvolvido permitiu discriminar as ocorrências de *B. carambolae* no Brasil, considerando as características ambientais em condições climáticas atuais, de acordo com várias métricas utilizadas (Sensibilidade = 95,21%; Especificidade = 76,11%; TSS = 0,71320; Omissão = 4,79%; Índice de Boyce = 0,86893; AUC = 0,87863). As probabilidades de ocorrência de *B. carambolae* para o Brasil foram divididas em cinco classes fixas: a) Inadequada (*Unsuitable*), 0 – MTP⁷; b) Marginal (*Marginal*), MTP – 10MTP⁸/2; c) Moderada (*Moderate*), 10MTP/2 – 10MTP; d) Alta (*High*), 10MTP – Md(Maxent(ocorrências))⁹; e) Muito Alta (*Very High*), > Md(Maxent(ocorrências)) (Neven et al., 2018; Pearson et al., 2007; Suárez-Seoane; Jiménez-Alfaro; Obeso, 2020).

A Produção Agrícola Municipal (PAM), pesquisa realizada anualmente pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), reúne informações sobre os principais produtos cultivados no Brasil (IBGE, 2024). A pesquisa abrange dados como área plantada, área colhida, volume produzido, produtividade e valor da produção, detalhados por município. Essas informações são fundamentais para orientar políticas públicas, apoiar estudos econômicos e auxiliar no planejamento de ações ligadas ao setor agrícola (IBGE, 2024). A partir dos dados da PAM, foram calculados índices de especialização (concentração) produtiva (Crocco et al., 2006) para identificar a importância econômica de tangerina para todos os municípios do Brasil, considerando três características principais: 1) a especificidade da produção para o município; 2) o peso do produto em relação à produção do município; e, 3) a importância da produção do município para a produção nacional do produto. O Quociente Locacional (QL), o Índice de Hirschman-Herfindahl (IHH) e o índice de Participação Relativa (PR) foram utilizados para calcular o Índice de Concentração Normalizado (ICn), através de uma combinação linear dos índices de concentração produtiva normalizados (*z-score*) ponderados por PCA (análise de componentes principais). Os valores de ICn para os municípios do Brasil foram divididos e agrupados em cinco classes, utilizando-se o método Fisher-Jenks (Fisher, 1958; Slocum et al., 2022), que possibilita criar classes mais heterogêneas entre si e mais homogêneas internamente, para hierarquização dos municípios pela magnitude dos seus ICns relativos ao produto avaliado, enfatizando desigualdades regionais.

As classes de ICn foram combinadas com as classes de probabilidade de ocorrências de *B. carambolae*, definidas anteriormente, considerando a média das probabilidades de ocorrência nos limites municipais, aplicando-se uma matriz de risco (Figura 1). Estimativas dos prejuízos econômicos potenciais foram feitas a partir dos valores da produção obtidos da PAM, considerando as seguintes faixas: a) risco baixo (1), 25%; b) risco médio (2), 50%; risco alto (3), 75%; e, d) risco muito alto (4), 100% do valor da produção municipal do produto avaliado.

Detalhes dos procedimentos adotados, tanto para o desenvolvimento do modelo de distribuição geográfica potencial quanto para as estimativas de risco econômico de *B. carambolae* à produção de tangerina com a utilização de indicadores de concentração produtiva, seguem a

⁷ *Minimum Training Presence (MTP)*: define o menor valor de adequação previsto que corresponda a pelo menos uma ocorrência identificada durante a fase de treinamento (calibração) do modelo.

⁸ *10% Minimum Training Presence (10MTP)*: define o valor de adequação que exclui os 10% das localidades com os valores previstos mais baixos.

⁹ Mediana das probabilidades previstas pelo modelo nas coordenadas de ocorrência da espécie.

descrição e a sequência definidas pelos projetos eNichos (03.16.04.030.00.00) e eNichos II (10.20.03.056.00.00), desenvolvidos pela Embrapa Roraima, Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e Universidade Federal de Santa Catarina (Amaro et al., 2025b, 2025c) a partir dos valores identificados na PAM 2023.





Figura 1. Matriz de Risco utilizada para definir as classes de risco a partir da importância da cultura hospedeira (ICn = impacto) e da probabilidade de ocorrência de uma espécie invasora ou praga.

A maioria dos municípios com probabilidade de ocorrência muito alta de *B. carambolae* está localizada nos estados do Amapá, Amazonas, Pará, Roraima e norte do Maranhão (Figuras 2A e 2B). A produção de tangerina foi identificada em 1.372 municípios do Brasil e os municípios com maior concentração de produção estão nas regiões Sudeste e Sul (Figura 2C). O zoneamento de risco econômico de *B. carambolae* para a produção de tangerina no Brasil, considerando a probabilidade de ocorrência e a importância econômica da produção é apresentado na Figura 2D, para 636 municípios.







Figura 2. Modelo Maxent de probabilidade de ocorrência de *Bactrocera carambolae* para o Brasil (A) e moda da probabilidade para os municípios do Brasil (B); especialização produtiva de tangerina pelos municípios brasileiros (C); risco econômico de *B. carambolae* para produção de tangerina no Brasil (D).

As classes de risco econômico estimado de *B. carambolae* à produção de tangerina no Brasil, estão apresentadas na Tabela 1, considerando a aplicação da matriz de risco e a distribuição dos municípios produtores entre as classes de especialização (concentração) produtiva e de probabilidade média de ocorrência de *B. carambolae*.

Tabela 1. Distribuição dos 1.372 municípios brasileiros com produção de tangerina em 2023 de acordo com o risco econômico estimado de *Bactrocera carambolae* à produção, considerando as classes de probabilidade de ocorrência e as classes de especialização (concentração) produtiva, juntamente com gráfico representativo da matriz de risco.

Classes de Especialização	Classes de Probabilidade				
	1	2	3	4	5
1	672	379	149	50	26
2	49	9	6	5	0
3	12	4	2	3	0
4	2	1	1	1	0
5	1	0	0	0	0



O valor total da produção de tangerina no Brasil em 2023 foi superior a R\$ 1,9 bilhões (IBGE, 2024). Considerando a distribuição dos municípios nas classes de risco e os percentuais de perdas potenciais definidos, o prejuízo econômico potencial foi estimado acima R\$ 431 milhões.

Na Tabela 2 são apresentados os dados dos quarenta municípios com maiores riscos econômicos, considerando a probabilidade de ocorrência de *B. carambolae* e seu nível de concentração produtiva de tangerina.

Tabela 2. Relação dos quarenta municípios com maiores riscos econômicos considerando a probabilidade de ocorrência de *Bactrocera carambolae* e seu nível de concentração produtiva de tangerina.

Nome do Município	UF	Valor Produção Municipal (R\$ 1.000)	Valor Total Produção Municipal (R\$ 1.000)	% Produção Municipal	Índice de Concentração	Probabilidade de Ocorrência	Risco Econômico	Prejuízo Potencial (R\$ 1.000)
Montenegro	RS	91.247,00	139.010,00	65,64	10,49867	0,06166	4 (Muito Alto)	91.247,00
Pareci Novo	RS	49.354,00	55.395,00	89,09	7,74105	0,07551	4 (Muito Alto)	49.354,00
Belo Vale	MG	72.731,00	79.627,00	91,34	9,89910	0,01459	3 (Alto)	54.548,25
Brumadinho	MG	34.020,00	44.750,00	76,02	5,85824	0,01048	3 (Alto)	25.515,00
Pariquera-Açu	SP	32.864,00	118.997,00	27,62	3,80051	0,08458	3 (Alto)	24.648,00
São José do Sul	RS	26.042,00	41.631,00	62,55	4,61017	0,08342	3 (Alto)	19.531,50
Teresópolis	RJ	21.482,00	22.522,00	95,38	5,52911	0,05038	3 (Alto)	16.111,50
S. José do Vale Rio Preto	RJ	19.181,00	57.737,00	33,22	2,82069	0,01625	3 (Alto)	14.385,75
Tocantins	MG	17.048,00	38.364,00	44,44	3,08511	0,01137	3 (Alto)	12.786,00
Harmonia	RS	16.151,00	39.598,00	40,79	2,85868	0,08993	3 (Alto)	12.113,25
Maratá	RS	5.942,00	11.411,00	52,07	2,41158	0,07324	3 (Alto)	4.456,50
Moeda	MG	2.772,00	3.298,00	84,05	3,41827	0,02275	3 (Alto)	2.079,00
Domingos Martins	ES	19.142,00	328.640,00	5,82	1,68615	0,01667	2 (Médio)	9.571,00
Veranópolis	RS	18.481,00	106.245,00	17,39	2,11679	0,05781	2 (Médio)	9.240,50
Jundiá	SP	12.029,00	115.816,00	10,39	1,26241	0,01277	2 (Médio)	6.014,50
Iguape	SP	11.276,00	85.874,00	13,13	1,30933	0,10067	2 (Médio)	5.638,00
Portão	RS	7.493,00	21.597,00	34,69	1,84870	0,05953	2 (Médio)	3.746,50
São Sebastião do Cai	RS	7.257,00	23.871,00	30,40	1,65481	0,08269	2 (Médio)	3.628,50
São José do Hortêncio	RS	6.779,00	34.481,00	19,66	1,17922	0,10069	2 (Médio)	3.389,50
Antônio Prado	RS	6.110,00	170.146,00	3,59	0,45903	0,05136	2 (Médio)	3.055,00
Mogi das Cruzes	SP	4.950,00	65.201,00	7,59	0,52844	0,04148	2 (Médio)	2.475,00
Araruama	RJ	4.536,00	92.415,00	4,91	0,38091	0,09702	2 (Médio)	2.268,00
Brochier	RS	4.236,00	16.260,00	26,05	1,21310	0,05934	2 (Médio)	2.118,00
Piraúba	MG	3.864,00	15.711,00	24,59	1,12158	0,01242	2 (Médio)	1.932,00
Indiaroba	SE	3.444,00	58.539,00	5,88	0,32703	0,16776	2 (Médio)	1.722,00
Alto Feliz	RS	2.160,00	24.568,00	8,79	0,33396	0,09225	2 (Médio)	1.080,00
Capela Nova	MG	1.980,00	12.282,00	16,12	0,61420	0,01625	2 (Médio)	990,00
Queluzito	MG	1.939,00	4.618,00	41,99	1,65206	0,01372	2 (Médio)	969,50
Umbaúba	SE	1.800,00	53.285,00	3,38	0,08120	0,10857	2 (Médio)	900,00
Tupandi	RS	1.641,00	13.061,00	12,56	0,44098	0,08783	2 (Médio)	820,50
União dos Palmares	AL	1.524,00	97.613,00	1,56	-0,02105	0,20669	2 (Médio)	762,00
Jeceaba	MG	1.477,00	4.686,00	31,52	1,18997	0,01313	2 (Médio)	738,50
Bom Princípio	RS	1.362,00	21.510,00	6,33	0,16464	0,10242	2 (Médio)	681,00
Cristinópolis	SE	1.214,00	54.540,00	2,23	-0,01718	0,07651	2 (Médio)	607,00
Vale Real	RS	1.134,00	24.971,00	4,54	0,07204	0,09805	2 (Médio)	567,00
Registro	SP	1.106,00	164.184,00	0,67	-0,10087	0,10620	2 (Médio)	553,00
Presidente Lucena	RS	979,00	13.584,00	7,21	0,16677	0,07731	2 (Médio)	489,50
Chã Preta	AL	750,00	18.393,00	4,08	0,02008	0,10385	2 (Médio)	375,00
Rorainópolis	RR	648,00	55.002,00	1,18	-0,10951	0,66014	2 (Médio)	324,00
Lindolfo Collor	RS	630,00	6.437,00	9,79	0,24043	0,08397	2 (Médio)	315,00

O modelo desenvolvido expressa a probabilidade de presença da espécie em uma determinada localização, condicionada às variáveis ambientais e à amostragem de *background*, com a premissa de que as condições ambientais permaneçam estáveis, na escala utilizada, e nenhum fator não modelo seja alterado.

O resultado de um modelo de distribuição potencial de espécies representa uma hipótese a ser testada e validada com amostras adicionais e informações complementares, sendo a modelagem parte de um processo iterativo e complementar ao monitoramento de espécies invasoras, especialmente importante ao serem utilizados dados econômicos, que podem variar conforme incentivos e vantagens comparativas.

Além disso, o modelo considera apenas variáveis abióticas, negligenciando a influência potencial de interações bióticas, antropogênicas e de práticas do uso do solo. Isso implica que, para as projeções para cenários de mudanças climáticas, assume-se que o nicho ecológico da espécie seja estático, não considerando a plasticidade comportamental, a capacidade de resposta a alterações ambientais ou a dinâmica de políticas que poderiam alterar os resultados futuros da distribuição.

O zoneamento de risco econômico de *B. carambolae* para produção de tangerina no Brasil apresentado nesta Nota Técnica pode auxiliar na implementação de políticas públicas de controle fitossanitário dessa praga, servindo ainda como ferramenta de informação e comunicação, além da gestão pública, para os produtores, como um complemento valioso para as ações de prevenção e mitigação dos riscos associados nos municípios.

Referências Bibliográficas

ADELINO, José Ricardo Pires *et al.* The economic costs of biological invasions in Brazil: a first assessment. **NeoBiota**, v. 67, p. 349–374, 29 jul. 2021.

AMARO, G. C. *et al.* **Bactrocera carambolae global occurrence data**. Redape, , 2025a. Disponível em: <<https://doi.org/10.48432/ZPDYI9>>

AMARO, G. C. *et al.* **Metodologia para Modelagem da Distribuição Geográfica Potencial de Espécies Invasoras em Condições Climáticas Atuais e Futuras**. Boa Vista: Embrapa Roraima, 2025b.

AMARO, G. C. *et al.* **Metodologia para Zoneamento de Risco Econômico de Espécies Invasoras para o Brasil**. Boa Vista: Embrapa Roraima, 2025c.

BELO, Andressa P. D. *et al.* New host plants records of *Bactrocera carambolae* Drew & Hancock, 1994 and *Anastrepha* spp. (Diptera: Tephritidae) in Brazil. **Entomological Communications**, v. 2, p. ec02036–ec02036, 21 dez. 2020.

CABI. *Bactrocera carambolae* (carambola fruit fly). **CABI Compendium**, v. CABI Compendium, p. 8700, 16 nov. 2021.

CASTILHO, Alison Pureza *et al.* Biology of *Bactrocera carambolae* (Diptera: Tephritidae) on four hosts. **Revista Brasileira de Entomologia**, v. 63, n. 4, p. 302–307, out. 2019.

CLARKE, Anthony R. *et al.* INVASIVE PHYTOPHAGOUS PESTS ARISING THROUGH A RECENT TROPICAL EVOLUTIONARY RADIATION: The *Bactrocera dorsalis* Complex of Fruit Flies. **Annual Review of Entomology**, v. 50, n. Volume 50, 2005, p. 293–319, 1 jan. 2005.

CROCCO, Marco Aurélio *et al.* Metodologia de identificação de aglomerações produtivas locais. **Nova Economia**, v. 16, n. 2, p. 211–241, ago. 2006.

DIAGNE, Christophe *et al.* High and rising economic costs of biological invasions worldwide. **Nature**, v. 592, n. 7855, p. 571–576, 22 abr. 2021.

FAO. **FAOSTAT**. Disponível em: <<https://www.fao.org/faostat/en/#data/QCL/visualize>>. Acesso em: 26 jul. 2025.

FISHER, Walter D. On Grouping for Maximum Homogeneity. **Journal of the American Statistical Association**, v. 53, n. 284, p. 789–798, 1 dez. 1958.

HENRY, Morgane *et al.* Unveiling the hidden economic toll of biological invasions in the European Union. **Environmental Sciences Europe**, v. 35, n. 1, p. 43, 8 jun. 2023.

IBGE. **Produção Agrícola Municipal – PAM 2023: culturas temporárias e permanentes**. Rio de Janeiro: IBGE, 2024. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/media/com_mediaibge/arquivos/3e44fdaa85766c6fa1e8aad80b7626eb.pdf>.

JESUS-BARROS, Cristiane Ramos *et al.* Fecundidade e longevidade de *Bactrocera carambolae* Drew & Hancock (Diptera: Tephritidae). **Biotemas**, v. 30, n. 4, p. 7–13, 8 dez. 2017.

LEMOS, Lailson Do Nascimento *et al.* NOVOS REGISTROS DE BACTROCERA CARAMBOLAE (DIPTERA: TEPHRITIDAE) NO BRASIL. 2014.

MDIC. **Comex Stat**. Disponível em: <<https://comexstat.mdic.gov.br/pt/geral>>. Acesso em: 26 jul. 2025.

NEVEN, Lisa G. *et al.* Current and Future Potential Risk of Establishment of *Grapholita molesta* (Lepidoptera: Tortricidae) in Washington State. **Environmental Entomology**, v. 47, n. 2, p. 448–456, 5 abr. 2018.

PEARSON, R. G. *et al.* Predicting species distributions from small numbers of occurrence records: a test case using cryptic geckos in Madagascar. **Journal of Biogeography**, v. 34, p. 102–117, 2007.

PHILLIPS, Steven J. Transferability, sample selection bias and background data in presence-only modelling: a response to Peterson *et al.* (2007). **Ecography**, v. 31, n. 2, p. 272–278, abr. 2008.

PHILLIPS, Steven J. A Brief Tutorial on Maxent. 2017.

PHILLIPS, Steven J. *et al.* Opening the black box: an open-source release of Maxent. **Ecography**, v. 40, n. 7, p. 887–893, jul. 2017.

PHILLIPS, Steven J.; ANDERSON, Robert P.; SCHAPIRE, Robert E. Maximum entropy modeling of species geographic distributions. **Ecological Modelling**, v. 190, n. 3–4, p. 231–259, jan. 2006.

R CORE TEAM. **R: A Language and Environment for Statistical Computing**. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing, 2023.

RENNER, Ian W. *et al.* Point process models for presence-only analysis. **Methods in Ecology and Evolution**, v. 6, n. 4, p. 366–379, abr. 2015.

RENNER, Ian W.; WARTON, David I. Equivalence of MAXENT and Poisson Point Process Models for Species Distribution Modeling in Ecology: Equivalence of MAXENT and Poisson Point Process Models. **Biometrics**, v. 69, n. 1, p. 274–281, mar. 2013.

SÁNCHEZ-TAPIA, Andrea *et al.* **modleR: a modular workflow to perform ecological niche modeling in R**. [S.l.]: Ecology, 3 abr. 2020. Disponível em: <<http://biorxiv.org/lookup/doi/10.1101/2020.04.01.021105>>. Acesso em: 24 ago. 2022.

SCHUTZE, Mark K. *et al.* Synonymization of key pest species within the *Bactrocera dorsalis* species complex (Diptera: Tephritidae): taxonomic changes based on a review of 20 years of integrative morphological, molecular, cytogenetic, behavioural and chemoecological data. **Systematic Entomology**, v. 40, n. 2, p. 456–471, 2015.

SEEBENS, Hanno *et al.* No saturation in the accumulation of alien species worldwide. **Nature Communications**, v. 8, n. 1, p. 14435, 15 fev. 2017.

SEEBENS, Hanno *et al.* Projecting the continental accumulation of alien species through to 2050. **Global Change Biology**, v. 27, n. 5, p. 970–982, 1 mar. 2021.

SILVA, Jéssica Paloma Gama dos Santos; OLIVEIRA, Patrícia Chaves de. Desempenho produtivo de frutas cítricas no polo citrícola do oeste paraense – Brasil, no período de 2005-2020. **Revista de Geografia**, v. 40, n. 1, p. 125–146, 27 abr. 2023.

SLOCUM, Terry A. *et al.* **Thematic Cartography and Geovisualization**. 4th. Edition ed. Boca Raton: CRC Press, 2022.

SOTO, Ismael *et al.* Using species ranges and macroeconomic data to fill the gap in costs of biological invasions. **Nature Ecology & Evolution**, v. 9, n. 6, p. 1021–1030, 1 jun. 2025.

SUÁREZ-SEOANE, Susana; JIMÉNEZ-ALFARO, Borja; OBESO, Jose Ramón. Habitat-partitioning improves regional distribution models in multi-habitat species: a case study with the European bilberry. **Biodiversity and Conservation**, v. 29, n. 3, p. 987–1008, mar. 2020.

TURBELIN, Anna J. *et al.* Introduction pathways of economically costly invasive alien species. **Biological Invasions**, v. 24, n. 7, p. 2061–2079, 1 jul. 2022.

XAVIER, Alexandre C. *et al.* New improved Brazilian daily weather gridded data (1961–2020). **International Journal of Climatology**, v. 42, n. 16, p. 8390–8404, 30 dez. 2022.