

Cordeiros com desmame aos 45 e 60 dias

Otto, C; Bona, A. Fo.; Sá, J. L.; Degasperri, A.

***Está provado:
os cordeiros podem ser desmamados aos 45 dias***

A idade de desmame dos cordeiros nas diferentes regiões do Brasil é extremamente variável. Em criações extensivas, os cordeiros geralmente são desmamados entre 5 e 6 meses de idade. Diversos trabalhos, no entanto, indicam que é possível realizar o desmame, dependendo das condições de criação, a partir das 6 semanas de vida.

A realização do desmame precoce em cordeiros traz inúmeras vantagens no processo produtivo tais como: recuperação da fêmea em lactação e controle da verminose.

O objetivo de nossa pesquisa foi avaliar a influência do desmame aos 45 e 60 dias de idade no desenvolvimento de cordeiros. Foram utilizados 60 cordeiros distribuídos em 2 diferentes tratamentos:

- T1 - desmame aos 45 dias de idade;

- T2 - desmame aos 60 dias.

Em ambos os tratamentos os cordeiros tiveram à disposição pasto de



inverno e concentrado com 14% de PB e 60% de NDT à vontade, no sistema de cocho privativo (creep-feeding) até o desmame.

Após o desmame os cordeiros foram arraçoados para atender a exigência nutricional para um ganho de peso diário de 150g.

O peso ajustado aos 120 dias de idade para os cordeiros desmamados com 45 dias foi de 26,19 kg, não diferindo significativamente dos cordeiros desmamados com 60 dias que foi de 25,23 kg.

Também não foi observada diferença significativa para o ganho de peso até os 120 dias de idade que foi de 190g para o desmame aos 45 dias e 182g para o desmame aos 60 dias.

O desmame aos 45 dias, portanto, nas condições em que foi realizado o experimento, não prejudicou o desenvolvimento dos cordeiros quando comparados com aqueles que desmamaram aos 60 dias. ★

Pesquisa realizada na Univ. Fed. do Paraná. Publicada nos Anais do XXII Congresso Brasileiro de Medicina Veterinária em 1994