



Arroz e Feijão

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Rodovia GO-462 km 12 Zona Rural Caixa Postal 179

75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO

Telefone (62) 3533-2110 Fax (62) 3533-2100

sac@cnpaf.embrapa.br

www.cnpaf.embrapa.br

Instituições parceiras na avaliação da cultivar

- Embrapa Trigo
- Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri)
- Coopercampos
- CEFET - Pato Branco
- Instituto Agronômico do Paraná (Iapar)
- Embrapa Transferência de Tecnologia/ Escritório de Negócios de Ponta Grossa

Disponibilidade de Sementes

- Embrapa Transferência de Tecnologia
Escritório de Negócios de Passo Fundo
Fone: (54) 311-3696 / Fax: (54) 311-3666
E-mail: lange@cnpaf.embrapa.br
Rodovia BR 285, km 174 Caixa Postal 451
CEP 99001-970 • Passo Fundo - RS

2ª edição: Embrapa Arroz e Feijão 2008 / 2ª impressão 2009 - Tiragem: 3.000 exemplares / Programação Visual: Fábio Nolito / Área de Comunicação e Negócios (ACN)



BRS Campeiro

Cultivar de Feijoeiro Comum de Grão Preto

Ministério da
Agricultura, Pecuária
e Abastecimento




Embrapa
2008



BRS Campeiro

Cultivar de Feijoeiro
Comum de Grão Preto



BRS Campeiro

A **BRS Campeiro** é uma cultivar do grupo comercial preto indicada para os Estados de **São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina.**



Características

Tipo de planta: indeterminado (tipo II), porte ereto adaptado à colheita mecânica.

Nº médio de dias para floração: 38 a 40 dias.

Cor da flor: violeta.

Maturação Fisiológica: 75 a 85 dias (semi precoce).

Cor da vagem na maturação: amarela e amarela levemente arroxeadas.

Cor do grão: preto, opaco.

Peso médio de 100 grãos: 25 gramas.

Recomendações

- A **BRS Campeiro** pode ser cultivada em até duas épocas indicadas na Tabela 1.
- População final desejável de 250.000 plantas por hectare, em espaçamento de 40 cm entre linhas.
- Evitar o plantio em locais com alta incidência de mosaico dourado.

Tabela 1. Janela de semeadura para os Estados indicados.

Estados	1ª Época	2ª Época
SP	Ago - Out	-
RS	Set - Dez	Jan - Fev
PR/SC	Out - Dez	Jan - Fev

Informações Adicionais

Nos ensaios realizados pela Embrapa e seus parceiros, a **BRS Campeiro** apresentou:

- Potencial de produtividade de 4.917 kg/ha;
- Boa resistência ao acamamento;
- Resistência ao mosaico comum, reação intermediária à antracnose e ferrugem, susceptibilidade ao mosaico dourado, mancha angular e crestamento bacteriano comum;
- Excelentes qualidades culinárias (Tabela 2).

Tabela 2. Qualidade tecnológica e industrial dos grãos da cultivar BRS Campeiro.

Cultivar	Cocção (minutos)	Absorção de água (%)	Sólidos solúveis (%)	Grãos inteiros (%)	Proteína (%)
BRS Campeiro	25	-	8,86	-	23,3



CONSULTE SEMPRE UM PROFISSIONAL LOCAL POR OCASIÃO DO PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO E CONDUÇÃO DA LAVOURA. ELE CONHECE A SUA REALIDADE E PODERÁ FAZER AJUSTES FITOTÉCNICOS, RECOMENDAÇÕES FITOSSANITÁRIAS ADEQUADAS E INDICAR A MELHOR ÉPOCA DE SEMEADURA!

