

Fol 3093

Doença denominada ...

1983

FL-PP-FOL 3093



EMBRAPA

UEPAE de Dourados

Rodovia Dourados - Caarapó — Km. 05
Caixa Postal, 661 - DOURADOS - MS.



CPAO- 4522-1

ISBN

Nº 60

27.5.83

ário - noticiário - noticiá

material para imprensa, rádio e televisão - divulgação livre

DOENÇA DENOMINADA HELMINTOSPORIOSE ATACA LAVOURAS DE TRIGO

Em função das condições climáticas as lavouras de trigo da região de Dourados estão sendo atacadas por helmintosporiose. Esta doença ocorre nas folhas e espigas, podendo aparecer em todas as fases da cultura.

Técnicos da EMBRAPA-UEPAE Dourados pedem aos agricultores que observem atentamente suas lavouras para detectar a ocorrência desta doença e controlá-la corretamente. Trabalhos de pesquisa mostram que o melhor controle de helmintosporiose é obtido com fungicidas a base de Maneb ou Mancozeb. Estes produtos são encontrados no comércio com os nomes de Dithane, Manzate, Shellneb e Fungineb. A aplicação do fungicida deve ser feita logo após o aparecimento da doença, para que haja eficiência do produto.

No trigo plantado mais tarde o cuidado deve ser maior, pois a doença poderá passar de uma lavoura atacada para uma sadia, principalmente se o clima continuar favorável à doença (alta umidade e alta temperatura).

/dvp



Fol 3093