

EMBRAPA

UNIDADE REGIONAL DE PESQUISA
FLORESTAL CENTRO-SUL
Caixa Postal, 3319
80000 - Curitiba-PR

Nº 021 MÊS 07 ANO 1984 PÁG. 02

PESQUISA EM ANDAMENTO

ÁREA DE DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA NATURAL DO LOURO (Cordia trichotoma) E DA CANAFÍSTULA (Peltophorum dubium)

Flora Florestal
BIBLIOTECA

Yeda Maria M. de Oliveira*

Emílio Rotta*

Estas áreas estão sendo delimitadas, através da fusão de informações sobre pontos de ocorrência natural das espécies, obtidos por diferentes processos de coleta destes dados, tais como consultas a herbários regionais, empresas públicas e privadas, instituições de pesquisa, mateiros regionais, entre outros. Dentro deste esquema teórico de compilação de informações foram reunidas 175 referências bibliográficas sobre a canafístula e 228 sobre o louro, através de revisão de literatura, entrando na fase de recuperação deste material e início de mapeamento.

Em processo simultâneo vão sendo colhidas informações através de viagens de objetivo técnico, registrando pontos de ocorrência desconhecidos e confirmando os de citação de literatura ou informações esparsas gerais, principalmente nos pontos extremos da dispersão detectada.

A associação de cartas climáticas, tipológicas, edáficas e altimétricas à carta delimitada da distribuição geográfica de cada uma das espécies possibilitará a identificação de alguns índices ecológicos preferenciais destas espécies.

* Engº Florestal, M.Sc., Pesquisador da UPF-EMBRAPA