





# Delimitação Macro-agroecológica do Brasil



ZONA	VEGETAÇÃO	APTIDÃO	RELEVO	TEXTURA	DRENAGEM	FERTILIDADE	LOCALIZAÇÃO (Estados)
1	Florestas fitonivas	Preservação	Plano a suave ondulado	Indiscriminada	Bem a mal drenado	M. baixa	Litoral brasileiro
2	Florestas pioneiras	Preservação	Plano a suave ondulado	Arenosa	Mal drenado	M. baixa	AM - RO
3	Floresta equatorial perenifolia e caméfito	Preservação	Plano a suave ondulado	Arenosa	Mal drenado	M. baixa	AM
4	Campeão do campo maior	Preservação	Plano	Arenosa	Moderado a mal drenado	M. baixa a baixa	MA
5	Floresta equatorial perenifolia	Preservação	Plano a suave ondulado	Argilosa	Moderado a mal drenado	M. baixa	AM
6	Floresta tropical higrofila de várzea e campo cerrado	Preservação	Plano a suave ondulado	Média a argilosa	Imperfeito a mal drenado	M. baixa a baixa	MT - PA - GO
7	Cerrado subcaducifólio	Preservação	Plano a suave ondulado	Arenosa	Bem drenado	M. baixa	MS - MT
8	Cerrado subtropical e subcaducifólio	Preservação	Plano a suave ondulado	Arenosa	Bem drenado	M. baixa	RO - PA - AM - MG - BA
9	Floresta tropical perenifolia de altitude	Preservação e reflorestamento	Forte ondulado a montanhoso	Argilosa a média	Moderado a bem drenado	Baixa	RJ - SP - MG
10	Floresta complexa do pantanal	Preservação (pecuária)	Plano a suave ondulado	Arenosa a muito argilosa	Mal a moderadamente drenado	M. baixa a alta	MS - MT
11	Cadofagia hiperesférica	Preservação (pecuária)	Plano a forte ondulado	Arenosa a muito argilosa	Bem a mal drenado	M. baixa a alta	CE - RN - PE - BA
12	Floresta tropical subcaducifólio e campo higrofilo de várzea	Preservação e extrativismo (pecuária e lavoura)	Plano a ondulado	Média a argilosa	Mal a mal drenado	M. baixa a média	MT - RO
13	Cerrado subcaducifólio	Preservação (pecuária e lavoura)	Plano a ondulado	Média a argilosa	Moderado a típico a moderadamente drenado	M. baixa	MT
14	Cerrado subcaducifólio e campo cerrado	Preservação (pecuária e lavoura)	Suave ondulado a ondulado	Arenosa a média	Moderado a bem drenado	M. baixa	GO - MA - PI
15	Floresta tropical subperenifolia	Preservação (pecuária e lavoura)	Ondulado a forte ondulado	Média a argilosa	Moderado a bem drenado	Baixa	SP - PR - SC
16	Floresta equatorial higrofila de várzea	Preservação (pecuária e lavoura)	Plano	Indiscriminada	Moderado a mal drenado	Baixa a alta	AM - PA
17	Floresta equatorial perenifolia	Extrativismo (lavoura)	Plano a suave ondulado	Média a argilosa	Moderado a bem drenado	Baixa	AM
18	Floresta equatorial perenifolia e subperenifolia	Extrativismo (lavoura)	Suave ondulado	Argilosa	Moderado	Baixa	AC - AM
19	Floresta equatorial perenifolia e subperenifolia	Extrativismo (lavoura)	Plano a suave ondulado	Argilosa a muito argilosa	Bem drenado	Baixa	AM - PA - MA
20	Floresta equatorial perenifolia e subperenifolia	Extrativismo (lavoura)	Suave ondulado	Média a argilosa	Moderado a bem drenado	Baixa a média	PA - MT - GO
21	Floresta tropical subcaducifólio e subperenifolia	Extrativismo (pecuária e lavoura)	Plano a ondulado	Argilosa	Bem drenado	Baixa	PA - AC - AM - MT
22	Floresta tropical subcaducifólio dicotila - palmícea	Extrativismo (pecuária e lavoura)	Suave ondulado a ondulado	Indiscriminada	Moderado a bem drenado	Baixa a média	PA - MA - PI
23	Cadofagia hiperesférica	Recuperação (pecuária e lavoura)	Plano a forte ondulado	Arenosa a muito argilosa	Mal a bem drenado	M. baixa a alta	CE - RN - PE - AL - SE - BA - MG
24	Floresta equatorial subperenifolia e campo higrofilo de várzea	Recuperação (lavoura)	Plano	Indiscriminada	Imperfeito a mal drenado	Baixa	AP - PA
25	Floresta tropical subperenifolia e subcaducifólio	Recuperação (lavoura)	Ondulado a forte ondulado	Argilosa	Moderado a bem drenado	Baixa a média	MS
26	Floresta tropical subperenifolia e subcaducifólio	Recuperação (lavoura)	Ondulado a forte ondulado	Média a argilosa	Imperfeito a bem drenado	Baixa a alta	RS
27	Floresta tropical subperenifolia e subcaducifólio	Recuperação (lavoura)	Ondulado a forte ondulado	Argilosa	Bem drenado	Baixa a média	RS - MG
28	Floresta tropical subperenifolia e subcaducifólio	Recuperação (lavoura)	Suave ondulado a forte ondulado	Média a argilosa	Moderado a bem drenado	Baixa a média	RS
29	Floresta tropical subcaducifólio e caducifólio	Recuperação (lavoura)	Suave ondulado a ondulado	Argilosa	Bem drenado	Baixa a alta	MS - ES - RJ
30	Pantanal	Recuperação e lavoura	Plano a suave ondulado	Argilosa	Moderado	Média a alta	RS
31	Cerrado subperenifolia e subcaducifólio	Lavoura e florestamento	Plano a suave ondulado	Média a arenosa	Bem drenado	M. baixa	BA - MG
32	Cerrado subperenifolia e subcaducifólio	Lavoura e pecuária	Plano a suave ondulado	Média a argilosa	Moderado a bem drenado	M. baixa	AP - RO
33	Cerrado subcaducifólio e caducifólio	Lavoura e pecuária	Suave ondulado	Média a argilosa	Bem drenado	M. baixa	GO
34	Cerrado subcaducifólio	Lavoura e pecuária	Plano a suave ondulado	Média a argilosa	Bem drenado	M. baixa	MT - GO
35	Cerrado subcaducifólio e campo cerrado	Lavoura e pecuária	Suave ondulado	Média a muito argilosa	Bem drenado	M. baixa	MS - MT - GO - MG
36	Floresta tropical subcaducifólio e subperenifolia	Lavoura e extrativismo (pecuária)	Plano a suave ondulado	Média a argilosa	Bem drenado	Baixa	MT
37	Floresta equatorial perenifolia e subperenifolia	Lavoura e extrativismo (pecuária)	Suave ondulado a ondulado	Argilosa	Moderado	Alta	AC - AM
38	Floresta subtropical perenifolia de altitude	Lavoura e reflorestamento	Ondulado	Argilosa	Moderado a bem drenado	Baixa	SP - PR - SC - RS
39	Campo subtropical	Lavoura e pecuária	Argilosa média	Bem drenado	Baixa	SP - PR - SC - RS	
40	Floresta tropical subperenifolia e subcaducifólio	Lavoura e pecuária	Suave ondulado a ondulado	Argilosa	Bem drenado	Baixa a média	SP
41	Floresta tropical subperenifolia e subcaducifólio	Lavoura e pecuária	Plano a suave ondulado	Argilosa a muito argilosa	Bem drenado	Baixa	BA - MS - ES - RJ
42	Floresta tropical perenifolia	Lavoura e pecuária	Ondulado	Argilosa	Bem drenado	Média a alta	RS - SC - MS
43	Floresta tropical subperenifolia e subcaducifólio	Lavoura e pecuária	Suave ondulado	Média a argilosa	Bem drenado	Baixa	SP - MS
44	Floresta tropical subperenifolia	Lavoura e pecuária	Suave ondulado	Argilosa	Bem drenado	Baixa	MS - PR - SP
45	Floresta tropical subperenifolia e subcaducifólio	Lavoura e pecuária	Suave ondulado a ondulado	Argilosa	Bem drenado	Baixa a média	BA - SE - AL - PE - RN
46	Floresta tropical subcaducifólio	Lavoura e pecuária	Suave ondulado	Argilosa	Bem drenado	Média	BA
47	Floresta tropical subcaducifólio	Lavoura e pecuária	Suave ondulado a ondulado	Média a argilosa	Bem drenado	Média a alta	RS - MT
48	Floresta tropical perenifolia e subperenifolia	Lavoura e pecuária	Suave ondulado a forte ondulado	Argilosa	Bem drenado	Baixa a alta	BA - ES
49	Floresta tropical e subtropical perenifolia	Lavoura e pecuária	Suave ondulado a forte ondulado	Média a argilosa	Moderado a bem drenado	Baixa a alta	RS
50	Floresta tropical subperenifolia e subcaducifólio	Lavoura e pecuária	Suave ondulado a ondulado	Média a argilosa	Bem drenado	Média a alta	MS - SP
51	Floresta tropical subcaducifólio	Lavoura	Suave ondulado	Argilosa	Bem drenado	Média a alta	GO - MG
52	Floresta tropical subperenifolia	Lavoura	Suave ondulado	Argilosa	Bem drenado	Média a alta	SP - PE



Equipe de Execução: Chyzoa Hirano-Fernando César Saravia do Amaral, Francisco Palmieri Jorge Olmos Hum Lavach, Nestor Corbiniano de Souza Nelo. Serviço Nacional de Levantamento e Conservação de Solos - SMLCS. Desenho e produção: Siro J. B. Campado.

