

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA - MARA
 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA
 Serviço Nacional de Levantamento e Conservação de Solos - SNLCS

E
 Centro Nacional de Pesquisa de Mandioca e Fruticultura - CNPMF
**MAPA DETALHADO DOS SOLOS DO CENTRO NACIONAL
 DE PESQUISA DE MANDIOCA E FRUTICULTURA
 CRUZ DAS ALMAS - BAHIA**

0 50 100 150 200 250 300 m
 ESC 1:5.000
 1986

LEGENDA

LATOSSOLO AMARELO

- LAe1 - LATOSSOLO AMARELO ÁLICO A moderada textura argilosa fase transição floresta tropical subperenifólia/subcaducifólia declive 10 a 15 %
- Lae2 - LATOSSOLO AMARELO ÁLICO A moderada textura franco argilo-arenosa fase transição floresta tropical subperenifólia/subcaducifólia declive 0 a 3 %
- LAd1 - LATOSSOLO AMARELO DISTRÓFICO A moderada textura argilosa fase transição floresta tropical subperenifólia/subcaducifólia declive 0 a 3 %
- LAd2 - LATOSSOLO AMARELO DISTRÓFICO A moderada textura argilosa fase transição floresta tropical subperenifólia/subcaducifólia declive 10 a 15 %
- LAd3 - LATOSSOLO AMARELO DISTRÓFICO A moderada textura franco argilo-arenosa fase transição floresta tropical subperenifólia/subcaducifólia declive 0 a 3 %

PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO

- Pve1 - PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb ÁLICO A moderada textura argilosa/muito argilosa fase transição floresta tropical subperenifólia/subcaducifólia declive 20 a 40 %
- Pve2 - PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb ÁLICO A moderada textura argilosa fase transição floresta tropical subperenifólia/subcaducifólia declive 30 a 40 %
- Pve3 - PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb ÁLICO A moderada textura argilosa com ou sem cascalho fase transição floresta tropical subperenifólia/subcaducifólia declive 20 a 30 %

PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO EUTRÓFICO

- Pe - PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb EUTRÓFICO A moderada textura muito argilosa fase transição floresta tropical subperenifólia/subcaducifólia declive 10 a 20 %

PLANOSSOLO

- PSe1 - PLANOSSOLO Tb EUTRÓFICO solódico A moderada textura franco arenosa com cascalho/franco argilo-arenosa cascalhenta ou com cascalho fase floresta tropical subcaducifólia declive 2 a 8 %

- PSe2 - PLANOSSOLO Tb EUTRÓFICO solódico A moderada textura franco arenosa com cascalho/franco argilo-arenosa cascalhenta ou com cascalho fase floresta tropical subcaducifólia declive 5 a 20 %
- PSe3 - Associação complexa de PLANOSSOLO Tb EUTRÓFICO solódico A moderada e SOLONETZ-SOLONIZADO Ta e Tb A moderada e fraco, ambos textura franco arenosa com cascalho ou cascalhenta/franco argilo-arenosa cascalhenta ou com cascalho e argilosa com cascalho fase floresta tropical subcaducifólia declive 2 a 15 % + AFLORAMENTOS DE ROCHA.

SOLONETZ-SOLONIZADO

- SS - Associação complexa de SOLONETZ-SOLONIZADO Tb e PLANOSSOLO Tb EUTRÓFICO solódico, ambos A moderada textura franco arenosa com cascalho/franco argilo-arenosa com cascalho ou argilosa com cascalho fase floresta tropical subcaducifólia declive 2 a 8 %

SOLOS HIDROMÓRFICOS

- HG - Associação complexa de GLEI HÚMICO e SOLOS ORGÂNICOS, ambos EUTRÓFICOS solódicos e SOLONETZ-SOLONIZADO Ta gleico A moderada, todos textura indiscriminada fase campo hidrático de várzea declive 0 a 3 %

