


EMBRAPA
Vinculada ao Ministério da Agricultura

SERVIÇO NACIONAL DE LEVANTAMENTO E CONSERVAÇÃO DE SOLOS

LEVANTAMENTO DE RECONHECIMENTO DOS SOLOS DA REGIÃO DA RODOVIA TRANSAMAZÔNICA
TRECHO ENTRE O RIO ITAPACURÁ E SÃO LUIZ - "ÁREA A"

ESCALA APROXIMADA 1:60 000

1976



LEGENDA

LATOSOL AMARELO

- LA1 LATOSOL AMARELO ÁLICO A Moderado textura muito argilosa fase floresta equatorial subperenifolia relevo plano e suave ondulado.
- LA2 LATOSOL AMARELO ÁLICO A Moderado textura argilosa fase floresta equatorial subperenifolia relevo plano e suave ondulado.
- LA3 LATOSOL AMARELO ÁLICO A Moderado textura média fase floresta equatorial subperenifolia relevo suave ondulado.
- LA4 LATOSOL AMARELO ÁLICO A Moderado textura argilosa/muito argilosa cascalhenta fase substrato concrecionário laterítico floresta equatorial subperenifolia relevo ondulado e suave ondulado.
- LA5 LATOSOL AMARELO ÁLICO A Moderado textura argilosa/argilosa muito cascalhenta fase substrato concrecionário laterítico floresta equatorial subperenifolia relevo ondulado e suave ondulado.
- LA6 LATOSOL AMARELO ÁLICO A Moderado textura média/média muito cascalhenta fase substrato concrecionário laterítico floresta equatorial subperenifolia relevo ondulado e suave ondulado.
- LA7 ASSOCIAÇÃO DE LATOSOL AMARELO Textura argilosa/argilosa muito cascalhenta + LATOSOL AMARELO Textura média/média muito cascalhenta ambos ÁLICOS A Moderado fase pedregosa substrato concrecionário laterítico floresta equatorial subperenifolia relevo ondulado e forte ondulado.

LATERITA HIDROMÓRFICA

- HLd1 LATERITA HIDROMÓRFICA ÁLICA (com B latossólico) imperfeitamente drenada Moderado textura argilosa e muito argilosa cascalhenta fase concrecionária laterítico floresta equatorial subperenifolia relevo ondulado e suave ondulado.
- HLd2 LATERITA HIDROMÓRFICA ÁLICA (com B textural) mal drenada A moderado textura indiscriminada fase floresta equatorial perenifolia de várzea relevo plano.
- HLd3 ASSOCIAÇÃO DE LATERITA HIDROMÓRFICA (com B latossólico) imperfeitamente drenada fase concrecionária laterítica + LATOSOL AMARELO ambos ÁLICOS A moderado textura indiscriminada fase floresta equatorial subperenifolia relevo suave ondulado e ondulado.
- HLd4 ASSOCIAÇÃO DE LATERITA HIDROMÓRFICA (com B textural) mal drenada floresta equatorial perenifolia de várzea relevo plano + LATOSOL AMARELO fase substrato concrecionário laterítico floresta equatorial subperenifolia relevo suave ondulado e ondulado ambos ÁLICOS A moderado textura indiscriminada.

PODZOL

- HP PODZOL HIDROMÓRFICO ÁLICO A Moderado fase campo de várzea relevo plano.

SOLOS ALUVIAIS

- Ad1 SOLOS ALUVIAIS ÁLICOS A Moderado textura média fase floresta equatorial perenifolia de várzea relevo plano.
- Ad2 SOLOS ALUVIAIS ÁLICOS A Moderado textura argilosa fase floresta equatorial perenifolia de várzea relevo plano.

SOLOS ARENÓQUARTZOSOS PROFUNDOS

- AQ AREIA QUARTZOSA ÁLICA latossólica A moderado fase floresta equatorial subperenifolia relevo suave ondulado.

CONVENÇÕES

- Perfil
- Amostra para fertilidade
- Amostra para análise mecânica
- Trecho desmatado do antigo projeto da rodovia
- Limite da área

Base planimétrica elaborada com apoio de mosaicos não controlada de fotos aéreas
Escala 1:60 000 - L.A.S.A. - 1971