

12643
CNPS
1976

FL-12643



Boletim Técnico n.º 50

SERVIÇO NACIONAL DE LEVANTAMENTO E CONSERVAÇÃO DE SOLOS
EMBRAPA

Vinculada ao Ministério da Agricultura

**APTIDÃO AGRÍCOLA DOS SOLOS DO OESTE DO
ESTADO DO PARANÁ (Área 3)**

(Interpretação do Levantamento de Reconhecimento dos Solos)

Colaboração entre a Comissão de Estado dos Recursos Naturais Renováveis do Estado do Paraná — CERENA e o Serviço Nacional de Levantamento e Conservação de Solos (Centro de Pesquisas Pedológicas) da EMBRAPA, para execução do presente trabalho, conforme o Termo Aditivo ao Acôrdio 07/73 entre o Ministério do Interior — SUDESUL e o Governo do Estado do Paraná.

CURITIBA

1 9 7 6

Aptidão agrícola dos solos do
1976 FL-12643



42631-1

PEDE-SE PERMUTA
MOUS DEMANDONS L'ECHANGE
PLEASE EXCHANGE

Endereço: Serviço Nacional de Levantamento
e Conservação de Solos
Rua Jardim Botânico, 1024 — ZC - 20
20.000 — RIO DE JANEIRO - RJ — BRASIL

Comissão de Estudo dos Recursos Naturais
Renováveis do Estado do Paraná — CERENA
Rua Itupava, 350 — Fone 22-3241
80.000 — CURITIBA - PR — BRASIL



Boletim Técnico n.º 50

SERVIÇO NACIONAL DE LEVANTAMENTO E CONSERVAÇÃO DE SOLOS

EMBRAPA

Vinculada ao Ministério da Agricultura

**APTIDÃO AGRÍCOLA DOS SOLOS DO OESTE DO
ESTADO DO PARANÁ (Área 3)**

(Interpretação do Levantamento de Reconhecimento dos Solos)

Colaboração entre a Comissão de Estado dos Recursos Naturais Renováveis do Estado do Paraná — CERENA e o Serviço Nacional de Levantamento e Conservação de Solos (Centro de Pesquisas Pedológicas) da EMBRAPA, para execução do presente trabalho, conforme o Termo Aditivo ao Acôrdio 07/73 entre o Ministério do Interior — SUDESUL e o Governo do Estado do Paraná.

CURITIBA

1 9 7 6

ACORDO DE PUBLICAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE SOLOS ENTRE:

MINISTÉRIO DO INTERIOR

Superintendência do Desenvolvimento da Região Sul — SUDESUL

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

Comissão de Estudo dos Recursos Naturais Renováveis do Estado do Paraná — CERENA — Projeto de Recursos do Solo

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA — EMBRAPA
Serviço Nacional de Levantamento e Conservação de Solos — SNLCS.

EXECUTORES:

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA

Superintendente: **José Irineu Cabral**

SERVIÇO NACIONAL DE LEVANTAMENTO E CONSERVAÇÃO DE SOLOS

Chefe Adjunto: **Clotário Olivier da Silveira**

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO SUL

Superintendente: **Paulo Affonso de Freitas Melro**

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

Governador: **Jayme Canet Junior**

Vice-Governador: **Octávio Cezário Pereira Junior**

Secretário da Agricultura: **Paulo Carneiro Ribeiro**

Secretário do Planejamento: **Belmiro Valverde Castor Jobim**

COMISSÃO DE ESTUDO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS DO ESTADO DO PARANÁ — CERENA — PROJETO DE RECURSOS DO SOLO

Convênio entre a Secretaria da Agricultura, Instituto de Biologia e Pesquisas Tecnológicas — IBPT, Universidade Federal do Paraná e Banco de Desenvolvimento do Paraná — BADEP

Presidente: **Paulo Carneiro Ribeiro**

Membros: **Dinor Olegário Voss**

Livio Luiz de Almeida

Carlos Celso Carnasciali

Coordenador Técnico: **Nelson Arthur Costa**

Assessor Técnico: **Julio Cesar Stenghel Rispoli**

A U T O R E S

AMÉRICO PEREIRA DE CARVALHO
DÉLCIO PERES HOCHMÜLLER
JORGE OLMOS ITURRI LARACH (coordenador)
MOACYR DE JESUS RAUEN
PEDRO JORGE FASOLO
ALCIDES CARDOSO

CARTOGRAFIA E DESENHO

* ORLANDO FARIA BANDEIRA
** BEATRIZ MONTE SERRAT
** IVO JUCKSCH

* Cartógrafo
** Estudantes de Engenharia Agrônômica, estagiários

APRESENTAÇÃO

Dentro do elenco de providências adotadas pelo Governo do Paraná, que deseja tornar mais pujante e desenvolvida a agropecuária do Estado, o lançamento desse Boletim Técnico é um feito de especial significação.

Trabalho desenvolvido com o concurso do Governo do Estado, da Superintendência do Desenvolvimento da Região Sul (SUDESUL), e da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), certamente fornecerá aos técnicos e produtores toda a informação necessária para embasar qualquer tipo de projeto agropecuário para a região Oeste do Paraná, contemplada neste volume.

A elevação das taxas de produção e produtividade da agricultura e da pecuária, somente será possível na proporção em que a tecnologia for absorvida pelos que hoje, se envolvem no processo rural. Por este motivo é fato significativo o esforço de entidades governamentais, na produção e divulgação desses subsídios, importantes para a definitiva consolidação do nosso setor primário.

PAULO CARNEIRO RIBEIRO
Secretário de Estado da Agricultura

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	11
SITUAÇÃO	13
MÉTODOS DE TRABALHO	15
CONSIDERAÇÕES GERAIS	15
SISTEMAS DE MANEJO	17
CULTURAS DE CICLO CURTO E LONGO	17
Sistema de manejo pouco desenvolvido	18
Sistema de manejo desenvolvido (sem irrigação)	19
CLASSES DE APTIDÃO AGRÍCOLA	21
OCORRÊNCIA DE GEADAS	22
SÍMBOLO E CONVENÇÕES	24
VIABILIDADE DE MELHORAMENTO DAS LIMITAÇÕES	24
DISTRIBUIÇÃO DAS CLASSES DE APTIDÃO DOS SOLOS POR SISTEMAS DE MANEJO	28
BIBLIOGRAFIA	31

INTRODUÇÃO

O Levantamento de Reconhecimento dos Solos do Oeste do Estado do Paraná, que constitui a base do presente trabalho, foi realizado pela Divisão de Pesquisa Pedológica (atual SNLCS da EMBRAPA) — em convênio com a Comissão de Estudo dos Recursos Naturais Renováveis do Estado do Paraná — Projeto de Recursos do Solo (CERENA), com o apoio financeiro do Instituto Brasileiro do Café (IBC) e do Conselho de Cooperação Técnica da Aliança para o Progresso (CONTAP).

Em geral as informações contidas nos levantamentos pedológicos, não são de fácil compreensão para a maioria dos não especialistas em solos, de modo que para torná-los mais acessíveis são indispensáveis as interpretações desses mapas.

O propósito do trabalho em vista é o de por ao alcance do maior número possível de pessoas as informações obtidas durante o mapeamento no que se refere ao uso agrícola dos solos.

O levantamento pedológico, utilizado como base desta interpretação, é de caráter generalizado, sendo de precisão limitada tanto em detalhes cartográficos como na homogeneidade das unidades de solos. Portanto, as informações apresentadas tem também caráter generalizado, e não poderão servir para solucionar problemas de planejamento a nível de unidade de produção, ou utilização de terras e questões de fertilidade em áreas restritas, salvo casos muito especiais.

Vale salientar que a interpretação é uma previsão do comportamento do solo quando utilizado sob um determinado manejo e não uma recomendação de uso. Além das características do próprio solo seu melhor uso depende de fatores econômicos, sociais, políticos e algumas vezes até religiosos.

Os mapas de interpretação precisam ser revisados de tempo em tempo, já que as previsões feitas para o comportamento dos solos podem variar com o avanço tecnológico e mudanças no meio econômico, social e político.

NOTA

As definições dos fatores limitantes e seus respectivos graus de intensidade, bem como os quadros para determinação das classe de aptidão agrícola, não constam na presente publicação, por terem sido expostos no trabalho "Aptidão Agrícola dos Solos do Noroeste do Estado do Paraná" (Interpretação do Levantamento de Reconhecimento de Solos) — Boletim Técnico n.º 32 do CPP.

Por outro lado, será elaborado, em futuro próximo, um texto explicativo único para servir de referência às interpretações, para fins agrícolas de todas as áreas do Estado que tenham seu levantamento de solos concluído.

SITUAÇÃO E LIMITES

Abrangendo uma área de 20.612 km², a região em estudo situa-se a oeste do Estado do Paraná e limita-se ao norte pelo paralelo de 24° e ao sul pelo de 25° ambos de latitude sul; a leste, pelo meridiano de 52°30' de longitude oeste de Greenwich e a oeste pelos limites com a República do Paraguai e o Estado de Mato Grosso. (Fig. 1)




Fig. 1

MÉTODOS DE TRABALHO

A metodológica empregada é a desenvolvida na antiga Divisão de Pedológica atual Serviço Nacional de Levantamento e Conservação de Solos.

Durante os trabalhos de mapeamento foram observados, registrados e coletados dados sobre: perfis de solos, amostras compostas para análise de fertilidade, relevo, declividade, erosão, fertilidade aparente, uso agrícola e pecuário, distribuição das chuvas, ocorrências de geadas e, principalmente observações "in loco" sobre o comportamento das culturas e suas relações com o meio ambiente.

Também se observou a profundidade do solo, a existência de horizontes menos permeáveis ou causadores de algum impedimento ao uso agrícola, a relação textural entre horizontes, a drenagem e os riscos de inundação.

Os dados sobre regime das chuvas, ocorrência de geadas, etc., foram obtidos por observações diretas no campo, informações dos agrônomos e agricultores da região e também mediante bibliografia.

Para dar início aos trabalhos de escritório foi feita uma relação bibliográfica relacionada com este tipo de pesquisa e à medida do seu desenvolvimento novas consultas foram feitas e incorporados novos dados.

Também foram elaboradas duas tabelas (Quadros n.º 1 e 2) mostrando as condições ambientais do solo e seus graus de limitação para o uso agrícola. A seguir usando-se estes quadros foi avaliada a Aptidão Agrícola dos Solos para dois (2) Sistema de Manejo, levando-se em conta culturas perenes e anuais.

Finalmente, obedecendo às delimitações do mapa de solos, as classes de aptidão dos solos foram lançadas através de cores, elaborando-se um mapa de interpretação para cada Sistema de Manejo.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

O Sistema de interpretação para fins agrícolas dos mapas pedológicos de caráter generalizado, desenvolvido na antiga Divisão de Pesquisa Pedológica (atual SNLCS), vale-se de comparação dos solos encontrados no campo com um solo ideal, que hipoteticamente não apresentasse nenhuma res-

trição ao uso agrícola. As características escolhidas para estabelecer esta comparação são as condições agrícolas do solo, e foram selecionadas as seguintes:

1. deficiência de fertilidade natural;
2. deficiência de água;
3. deficiência de oxigênio (excesso de água, incluindo risco de inundação);
4. susceptibilidade à erosão; e
5. impedimentos ao uso de implementos agrícolas.

As condições citadas nos itens 1, 2 e 3 influenciam tanto o uso da terra como a vegetação natural e são portanto, de natureza ecológica, enquanto que as propriedades constantes dos itens 4 e 5, influenciam diretamente ao uso da terra, sendo portanto, de caráter agrícola propriamente dito. A ocorrência de geadas pode ser considerada também ecológica nas regiões sob sua influência.

Cada condição concorrerá de maneira diferente para a produtividade do solo, segundo a intensidade de variação que apresente em relação ao solo hipotético ideal. Tratando-se de uso agrícola, esta intensidade de variação é geralmente denominada **grau de limitação** e as condições consideradas **fatores limitantes**. Portanto, para poder-se definir cada fator limitante estabeleceu-se cinco graus de intensidade de limitação: nula, ligeira, moderada, forte e muito forte.

Embora no Brasil exista uma extensa gama de práticas de manejo agrícola, que vão desde as mais primitivas as mais desenvolvidas, foram elas grupadas em dois sistemas de manejo: **pouco desenvolvido** e **desenvolvido** (sem irrigação).

Ainda que muitos fatores possam concorrer para o agrupamento das práticas culturais em sistemas agrícolas, aqui se leva em conta, principalmente:

- a) tração — se mecânica, animal ou manual;
- b) disponibilidade de capital e conhecimento técnico operacional; e
- c) culturas — se anuais ou perenes.

Também se considera as possibilidades de melhoramento das limitações do solo e manutenção destas condições melhoradas, porque existem casos, e não poucos, em que a limitação não pode ser totalmente eliminada.

Finalmente vem a classificação da aptidão, que leva em conta o grau de limitação apresentado por cada fator limitante, e a viabilidade de melhoramento dos mesmos, relacionando-os a um dos sistemas de manejo, dando como resultado a classe de aptidão do solo que pode ser: Boa, Regular, Restrita e Inapta.

SISTEMAS DE MANEJO

A interpretação da aptidão agrícola dos solos foi estabelecida em relação a dois sistemas de manejo; um Pouco Desenvolvido e outro Desenvolvido, ambos referentes à produção de culturas de ciclo curto e de ciclo longo sem considerar-se a possibilidade de irrigação.

Para a distinção dos dois sistemas de manejo tomou-se como base: a) nível de investimento de capital; b) conhecimento técnico operacional; c) tipo predominante de tração e implementos agrícolas; d) restrições impostas pelas condições de solo.

a) o nível de investimento de capital, referem-se aos gastos ocasionados com o preparo do terreno, melhoramento e manutenção das condições de fertilidade de solo pela aplicação de corretivos e adubos, o uso de híbridos ou variedades selecionadas, conservação da umidade do solo, drenagem, controle de erosão e aquisição de máquinas e implementos agrícolas.

b) o conhecimento técnico operacional refere-se à tradição agrícola dos agricultores ou assessoramento profissional capaz de pôr em funcionamento técnicas mais avançadas para o aumento das produções.

c) os tipos predominantes de tração e implementos agrícolas que servem para distinguir os dois sistemas de manejo são: **Manual** ou **animal**, que inclui implementos manuais simples (pá, enxada, enxadão, machado, foices, facão, etc.) e implementos agrícolas leves (arados de madeira ou de aiveca de ferro, grades, plantadeiras etc.); e tração **motorizada**, que inclui todo o conjunto de implementos agrícolas operados a motor.

d) As restrições impostas pelas condições do solo referem-se às suas limitações e possibilidades de serem ou não corrigidas.

CULTURAS DE CICLO CURTO E LONGO

Consideram-se como culturas de **ciclo curto** as que tem um período vegetativo menor que um ano e como de **ciclo longo** as que tem um período vegetativo maior que um ano. Tanto as culturas de ciclo curto como as de ciclo longo diferem entre si quanto às suas exigências de solo, clima, e tratos culturais. Se dentro da mesma cultura existem diferenças entre as exigências das plantas, ao tratar-se de culturas diferentes, essas diferenças serão ainda maiores. Levando-se em conta essas diferenças, foi possível estabelecer a aptidão agrícola dos solos para culturas de ciclo curto e longo, por exemplo:

a) solos com baixa capacidade de troca de cátions quando utilizados para culturas de ciclo longo podem ter seu conteúdo de matéria orgânica mantido e melhorado com o "mulching", o que não ocorre no caso das culturas de ciclo curto;

b) algumas culturas de ciclo curto são resistentes ao frio e podem ser cultivadas em áreas sujeitas à geadas, ao passo que as de ciclo longo não adaptadas a este fenômeno, são prejudicadas;

c) nas regiões com estações seca e chuvosa bem definidas as culturas de ciclo curto podem ser plantadas e ter um desenvolvimento satisfatório durante o período em que a umidade é suficiente enquanto que as de ciclo longo não resistentes a seca podem ser muito prejudicadas ou até mesmo parecer devido à falta de água;

d) culturas de ciclo curto podem ser plantadas em áreas sujeitas a inundações, bastando apenas ajustar o período de cultivo;

e) geralmente as culturas de ciclo longo protegem melhor o solo da erosão, e as práticas defensivas, quando necessárias, são mais simples e mais fáceis de serem conservadas;

f) no sistema de manejo desenvolvido, o uso de máquinas e equipamentos agrícolas é mais intenso nas culturas de ciclo curto do que nas de ciclo longo, facilitando de certa forma o processo erosivo nas de ciclo curto; e

g) as áreas de declives inferiores a 20% se prestam mais para culturas de ciclo curto moto-mecanizadas do que as áreas de declives superiores, que por sua vez permitem uso com culturas de ciclo longo.

A título de ilustração pode-se citar como **culturas de ciclo curto**: algodão, amendoim, arroz, aveia, batata inglesa, centeio, cevada, feijão, girassol, mamona, melancia, milho, soja, sorgo, trigo, etc. e como **culturas de ciclo longo**: abacaxi, banana, cana-de-açúcar, café, abacate, chá, citros, mamão, côco, cajú, manga, pera, pessego, figo, maçã, caqui, pastagens, etc.

SISTEMA DE MANEJO POUCO DESENVOLVIDO

É um sistema em que o sucesso da lavoura depende exclusivamente das condições inatas do solo. As práticas agrícolas seguem métodos tradicionais que refletem um baixo nível de conhecimento técnico operacional. Não há emprego de capital para melhoramento das limitações do solo e das lavouras. Não há emprego de fertilizantes e corretivos e os trabalhos de drenagem são ocasionais.

Os tratos culturais são realizados principalmente mediante trabalho braçal com utilização de implementos agrícolas simples: pá, enxada, enxada, machado, foice, facão, etc. Quando a tração animal é utilizada os implementos são simples, como arados de madeira, de aiveca de ferro, grades, plantadeiras, etc.

Nem sempre é feito o desmatamento e não há destocamento nem remoção de raízes. Por depender da fertilidade natural do solo seu uso não é permanente, ocasionando o conseqüente abandono da terra, devido ao decréscimo das produções após alguns anos de uso.

Quando se emprega capital este é pequeno e utilizado na derrubada da mata, construção de casas e compra de sementes. É portanto um sistema para criação de capital.

O extrativismo está incluído neste sistema.

Algumas das diversas maneiras em que as condições agrícolas influem neste sistema de manejo são:

Deficiência de fertilidade: a fertilidade natural do solo é o fator preponderante para a produção agrícola dentro deste sistema de manejo. Se a fertilidade natural for alta, as produções serão boas por muitos anos, se for média, serão menores e por menos anos, e finalmente se for baixa ou muito baixa, não é aconselhável cultivar neste sistema de manejo.

Deficiência de água: a distribuição das chuvas, e particularmente a disponibilidade de água para as plantas, propicia a opção da escolha das culturas e da época do plantio.

Excesso de água: é prejudicial, principalmente para culturas de ciclo longo, quando há problemas de alagamento ou inundação, e mesmo para culturas de ciclo curto com raízes não adaptadas à falta de ar.

Susceptibilidade à erosão: é relativamente de pouca importância para o sistema de manejo, devendo-se considerar apenas que as culturas de ciclo curto provocam maior erosão que as de ciclo longo.

Impedimentos à mecanização: não é limitante neste sistema de manejo porque os implementos agrícolas usados podem ser utilizados sob quaisquer condições.

SISTEMA DE MANEJO DESENVOLVIDO (SEM IRRIGAÇÃO)

É um sistema de manejo em que as práticas agrícolas dependem de um alto nível tecnológico. Há aplicação intensiva de capital para melhoramento e manutenção das condições melhoradas do solo e das lavouras. As práticas de manejo utilizam ao máximo os resultados das pesquisas, incluem a motomecanização em todas as fases das operações agrícolas e a rotação de culturas.

As práticas de fertilização e mecanização são usadas em larga escala, mas podem ocorrer casos em que elas sejam menos intensivas. Por exemplo, em alguns solos bem providos de nutrientes, mesmo usando-se pouco fertilizante, pode-se obter boas colheitas desde que outras práticas, como controle à erosão e combate das pragas e doenças, sejam realizadas tecnicamente. Se todas as operações de manejo são adequadamente realizadas, o sistema de manejo é desenvolvido.

A rotação de culturas constitui um sistema racional de exploração do solo, com sólidos fundamentos técnicos e econômicos. A rotação pode ser bi, tri, tetra anual, etc., para tanto, deve-se escolher espécies climaticamente adaptadas, examinar as possibilidades do mercado e rentabilidade econômica, estudar as parcelas a serem cultivadas, incluir sempre que possível leguminosas e manter parcelas com pastagens pelo menos durante 3 anos. As vantagens da rotação são muitas, dentre as quais pode-se citar:

a) vantagens de caráter agrônômico — facilitar o controle das doenças e pragas, o combate às ervas daninhas, o aproveitamento do efeito residual das adubações e restos de cultivos, o suprimento da matéria orgânica, o melhoramento das condições físicas do solo e o auxílio no combate à erosão; e

b) vantagens de caráter econômico — manter o equilíbrio financeiro do agricultor, o melhor aproveitamento da mão-de-obra, bem como o das máquinas, propiciando uma rápida amortização do capital empregado.

Algumas das diversas maneiras com que as condições agrícolas influem neste sistema de manejo são:

Deficiência de fertilidade: neste sistema de manejo é muito menos grave que no anterior e a resposta do solo à adubação e calagem é o fator preponderante. As práticas de fertilidade incluem a adição de produtos químicos, micro e macro nutrientes e adubação verde, de acordo com as necessidades do solo e as exigências dos cultivos, desde que estes sejam econômicos. O conteúdo de matéria orgânica é mantido, e se necessário melhorado, para promover a atividade microbiológica, a retenção e a disponibilidade de nutrientes e o melhoramento da estrutura para favorecer o desenvolvimento do sistema radicular.

Deficiência de água — é o principal fator limitante neste sistema de manejo, uma vez que determina a opção na escolha das culturas e a época de plantio. Na área em estudo não constitui maior problema, uma vez que a precipitação é bastante elevada.

Excesso de água — os trabalhos de drenagem e defesa contra as inundações podem ser intensivos, logo, muitas áreas localizadas em várzeas que apresentam excesso de água podem ser cultivadas. Até mesmo os solos mal drenados com más propriedades físicas podem ser aproveitados com algumas culturas adaptadas a essas condições.

Susceptibilidade à erosão — considerando o capital investido no melhoramento das propriedades químicas e físicas do solo, o controle à erosão é fator importante na manutenção da produção. Com motomecanização as práticas conservacionistas podem ser intensivas: enleiramento permanente, terraços, banquetas individuais, coveamento, canais escoadouros e drenos.

Impedimentos à mecanização — a motomecanização é usada em todas as fases da agricultura. Os fatores que impedem o uso de implementos agrícolas são por natureza relativamente permanentes e o seu melhoramento nem sempre é viável.

CLASSES DE APTIDÃO AGRÍCOLA

Estabeleceu-se as seguintes classes: Boa, Regular, Restrita e Inapta para cada sistema de manejo e são definidas em função dos graus de limitações para uso agrícola, que inclui culturas de ciclo curto e longo.

Classes de aptidão no sistema de manejo pouco desenvolvido

BOA: não há limitações ou estas são ligeiras ou ainda em alguns casos pouco mais severas que ligeiras, para um grande número de culturas climaticamente adaptadas. Pode-se prever boas produções por um período de aproximadamente 20 anos ou mais, durante os quais as produções decrescem pouco.

REGULAR: as limitações são moderadas para um grande número de culturas climaticamente adaptadas. Pode-se prever boas produções durante 10 anos, decrescendo para um nível mediano nos 10 anos seguintes.

RESTRITA: as limitações são fortes para um grande número de culturas climaticamente adaptadas. Pode-se prever produções medianas durante os primeiros anos, decrescendo rapidamente para um nível baixo.

INAPTA: as limitações são muito fortes para um grande número climaticamente adaptadas. Pode-se prever produções baixas desde o início do seu uso.

Obs.: existem casos em que culturas especiais admitem graus de limitações mais severas do que os expostos nas classes de aptidão. Assim, o algodão tolera melhor a deficiência de água e o arroz irrigado a deficiência de aeração ou excesso de água.

Classes de aptidão no sistema de manejo desenvolvido (sem irrigação)

BOA: não há limitações ou estas são ligeiras para a produção sustentada de um grande número de culturas climaticamente adaptadas. Boas produções são obtidas e mantidas com melhoramentos.

REGULAR: as limitações são moderadas para a produção sustentada de um grande número de culturas climaticamente adaptadas. Boas produções podem ser obtidas, mas a opção de culturas, a manutenção das produções e a seleção das práticas de manejo estão restritas por uma ou mais limitações que não podem ser removidas ou que só podem ser parcialmente removidas.

RESTRITA: as limitações são moderadas e fortes para a produção sustentada de um grande número de culturas climaticamente adaptadas. As produções são medianas e a opção de culturas é muito restringida por uma limitação que não pode ser removida ou por limitações que só podem ser parcialmente removidas, mesmo com a aplicação de melhoramentos intensivos.

INAPTA: as limitações não podem ser removidas ou só podem ser parcialmente removidas, mesmo com a aplicação de melhoramentos intensivos e as produções obtidas não compensam os gastos realizados. Poucas culturas podem adaptar-se a estes solos sob condições especiais de manejo.

OCCORRÊNCIA DE GEADAS

Convém lembrar que a região é afetada pela ocorrência de geadas, fenômeno que é um fator limitante às culturas, sendo de todo recomendável que seja estudado para cada caso particular.

A geada é definida como sendo processo mediante o qual cristais de gelo são depositados sobre uma superfície exposta. Isto resulta do fato da temperatura da superfície exposta ter caído abaixo da temperatura de saturação do ar "Ponto de Orvalho". Em vez do vapor de água existente no ar se condensar sob a forma líquida passa diretamente do estado de vapor ao de cristais de gelo. Não se torna, portanto, necessário que a temperatura mínima do ar desça abaixo de 0° C. basta que isto ocorra com as plantas ou o solo. O fenômeno do congelamento direto do vapor de água ocorre, portanto, quando a temperatura das superfícies expostas atinge graus negativos. Tal fato não se verifica com as impropriamente chamadas "geadas de vento", que são produzidas pelos ventos frios e cortantes do Sul com temperaturas positivas de 2 a 3° C.

Em muitas partes do mundo foram dados vários conceitos à palavra geada, quando se trata dos prejuízos causados às culturas pelo frio ou pelo congelamento. Danos pelas geadas, por exemplo, podem ser por temperaturas que vão desde os 12° C, que afetam as bananeiras, até inferiores a -7° C, que são necessários para queimar repolhos maduros. Alguns meteorologistas agrícolas modernos preferem usar termos como "congelamento" e "prejuízos por congelamento" quando os danos são causados por cristais de gelo. Aqui a expressão "danos pelas geadas" é usada indiferentemente para qualificar os efeitos produzidos tanto pelo frio como pelo congelamento.

É possível que temperaturas de congelamento se manifestem ao nível do solo, enquanto que as temperaturas registradas num abrigo termométrico, que se encontre a 1,5 m acima do solo somente cheguem a cerca de 4° C. O aumento de temperatura que ocorre em função de uma pequena variação de altura acima do solo constitui um fator muito importante que deve ser levado em consideração na defesa contra o congelamento.

As condições gerais que favorecem a formação de geadas são: temperaturas baixas, céu limpo, umidade baixa e vento fraco. As condições particulares resultam de exposição de área à ação dos raios solares e do conteúdo da umidade do solo. Por exemplo: os terrenos com exposição a Norte e Oeste recebem melhor insolação e, portanto, constituem áreas menos favoráveis à ocorrência de geadas, enquanto que os terrenos com exposição a Sul e Leste recebem menos insolação, sendo pois, mais susceptíveis à ocor-

rência de geadas. As partes próximas ou limítrofes às florestas são mais sujeitas ao fenômeno porque reduzem a velocidade do vento formando pequenas áreas de ventos fracos. A umidade retida no solo facilita a formação de geada, porém, quando é demasiada passa a dificultar, porque sendo a água um bom condutor de calor impede o maior resfriamento do local. O fenômeno, por esta razão, torna-se mais raro após um período de chuva.

As geadas são mais prejudiciais às culturas localizadas nas encostas a Leste, onde o Sol incide diretamente a partir das 7 horas do que nas encostas a Oeste, que são lentamente aquecidas, propiciando o restabelecimento lento da circulação da seiva das plantas diminuindo os efeitos causados pela geada.

O planejamento da proteção das culturas, contra os prejuízos causados pelas geadas, deve levar em consideração o tipo de condição atmosférica que provoca o resfriamento.

Os métodos usados na modificação das temperaturas compreendem quatro aspectos principais:

- a) cobertura;
- b) espargimento com água;
- c) mistura de ar nas baixas camadas; e
- d) acréscimo de calor.

A utilização de um destes métodos, ou combinação deles para proteção das culturas é sempre possível mas nem sempre econômico.

Algumas medidas de ordem geral podem ser sugeridas para a defesa das culturas, como plantio de faixas de proteção para impedir a invasão de ar frio, que pode ser também uma medida eficiente no combate as geadas de vento. Os vales recebem o ar frio que desce das encostas e se tornam zonas de geadas mais frequentes. Portanto, as culturas sensíveis à geada não devem ser plantadas nestes locais.

Nas culturas perenes, é indicado na época das geadas manter o terreno limpo, pois este armazena o calor durante o dia e a noite o irradia, ao passo que estando coberto com "mulching" ou um substrato vegetal qualquer, haverá uma menor incidência de sol e, conseqüentemente, um menor aquecimento do solo. Também o sombreamento poderia ser uma prática protetora, devido ao fato das copas das árvores funcionarem como superfícies radiantes, fazendo com que a temperatura sob as mesmas se conserve mais elevada.

Existindo a possibilidade de proteção contra os prejuízos causados pelas geadas, mediante o emprego de vários tipos de sistemas, o agricultor deverá escolher por si mesmo, qual o sistema ou combinação de sistemas que melhor atenda para seu caso, e que seja o mais econômico diante das circunstâncias particulares existentes.

SÍMBOLOS E CONVENÇÕES

a) Convencionou-se que as classes de aptidão para culturas de ciclo curto seriam representadas por algarismos romanos e para as culturas de ciclo longo por algarismos arábicos, tanto no sistema desenvolvido como no pouco desenvolvido. Como segue:

Culturas de Ciclo Curto	Culturas de Ciclo Longo	Classes de Aptidão
I	1	BOA
II	2	REGULAR
III	3	RESTRITA
IV	4	INAPTA

b) Também podem aparecer símbolos em forma de fração, onde o numerador é formado por números e o denominador por letras, sendo que o numerador indica a classe de aptidão e o denominador a limitação ou limitações mais importantes que colocaram o solo na classe de aptidão indica pelo numerador. As letras usadas e seus significados são os seguintes:

- f — deficiência de fertilidade;
- a — deficiência de água;
- d — deficiência de aeração ou excesso de água (má drenagem);
- e — susceptibilidade à erosão; e
- m — impedimentos à mecanização.

c) No quadro n.º 2 da aptidão agrícola dos solos em relação ao sistema de manejo desenvolvido (sem irrigação) aparecem índices junto aos graus de limitações, significando as classes de viabilidade de melhoramento, assim:

- 1 — apenas práticas simples de melhoramento são suficientes para reduzir a limitação até o grau indicado;
- 2 — práticas de melhoramento intensivos são necessárias para reduzir a limitação até o grau indicado;
- 3 — as práticas de melhoramento não são viáveis, ou quando viáveis acham-se além das possibilidades econômicas do agricultor; e
- n — não há viabilidade de melhoramento.

VIABILIDADE DE MELHORAMENTO DAS LIMITAÇÕES

Ao menos teoricamente existem possibilidade de remover, minorar ou controlar as limitações que afetam o uso agrícola dos solos, de maneira que com um elevado e suficiente nível de melhoramentos, qualquer uso poderá ser dado a qualquer solo. Por exemplo: Poderá produzir-se abaca-

xis, abacates, ou outras culturas tropicais, em altitudes superiores a 4.000 metros ou em regiões de latitudes elevadas, desde que se mudem as condições do meio ambiente o controle de temperatura, fotoperíodo etc., mas, seguramente as produções não seriam econômicas. Este e muitos outros exemplos poderão ser citados para enfatizar o fato de que todo e qualquer melhoramento introduzido para facultar o uso mais adequado do solo deverá ter um cunho econômico.

Ressalta-se que no presente estudo não foi considerado a parte econômica, relativa aos melhoramentos ou aos insumos necessários à produção agrícola, levando-se em conta apenas a viabilidade técnica da realização dos referidos melhoramentos à luz dos conhecimentos atuais, portanto, presentemente ou futuramente poderão ou não ser economicamente praticáveis.

Dentro dos dois sistemas de manejo adotado, somente o "Desenvolvido (sem irrigação)" admite práticas destinadas a corrigir as deficiências ou limitações apresentadas pelo solo, enquanto que, o sistema de manejo "Pouco Desenvolvido", geralmente aproveita o solo na forma em que ele se apresenta, servindo-se às vezes de pequenos trabalhos rudimentares de drenagem ou amontoamento de pedras, quando for o caso de solos muito pedregosos.

De acordo com o sistema de manejo considerado, as possibilidades de remover, controlar ou minorar as limitações que afetam o uso agrícola dos solos determinarão as classes de aptidão dos mesmos.

Nas tabelas de "Graus de limitações para uso agrícola", (Quadro n.º 1) referentes ao manejo pouco desenvolvido, os graus das limitações estão apreciados em condições naturais dos solos, isto é, sem melhoramentos.

Nas tabelas de "Graus de limitações para uso agrícola" (Quadro n.º 2) referente ao manejo desenvolvido (sem irrigação), os graus das limitações estão estimados de acordo com a viabilidade de melhoramento, que é indicada por meio de um índice numérico ou letra "n".

Como geralmente há falta de dados de experimentação agrícola, surge a necessidade de estabelecer correlação com dados de outras áreas ecológicamente semelhantes. Portanto, a separação dos solos em bons, regulares, restrito e inaptos, que implica na facilidade ou dificuldade de sua utilização agrícola, deve ser tomada como uma tentativa. A natureza dos problemas e as possíveis soluções são apontadas visando evitar erros na seleção das áreas para incentivar o desenvolvimento, dando uma idéia aproximada da viabilidade de melhoramento, conservação e potencial agrícola dos solos.

Melhoramento da fertilidade

A baixa fertilidade natural de alguns solos que possuam boas condições físicas, é fator predominante na produção agrícola. Melhorá-la é contribuir para o desenvolvimento regional.

De maneira geral o uso correto de fertilizantes deve ser incentivado, bem como, outras técnicas modernas para o aumento da produção.

Na maioria dos solos há deficiência de um ou mais nutrientes, principalmente fósforo. O recomendável seria o agricultor coletar amostras compostas para a análise de fertilidade, a fim de determinar as necessidades de adubação e corretivos a serem incorporados ao solo. Torna-se pois, indispensável o estabelecimento de campos de experimentação em locais onde os solos estejam classificados, para que os resultados possam ser utilizados em áreas correlatas.

Os solos de alta fertilidade natural e com propriedades físicas adequadas ao desenvolvimento radicular, requerem pequenas quantidades de fertilizantes para a manutenção das produções, e sua viabilidade de melhoramento pertence à classe 1.

Os solos de fertilidade natural baixa ou média requerem quantidades maiores de fertilizantes e corretivos, bem como alto nível de conhecimento técnico, e sua viabilidade de melhoramento pertence à classe 2.

Os solos pertencentes à classe de melhoramento 3 somente com projetos de âmbito governamental de investigação e desenvolvimento poderão ser agricultáveis.

A título de exemplo das práticas empregadas para melhoramento da fertilidade nas classes 1 e 2 pode-se citar:

a) Classe de melhoramento 1.

- a) adubação verde;
- b) incorporação de esterco de natureza diversa;
- c) aplicação de tortas diversas;
- d) correção de solo (calagem); e
- e) adubação com NPK.

b) Classe de melhoramento 2.

- a) adubação com NPK + Micronutrientes;
- b) adubação líquida;
- c) adubação foliar; e
- d) combinação das práticas acima (com "mulching").

Melhoramento da deficiência de água (sem irrigação)

A limitação por falta de água para as plantas poderá ser melhor controlada mediante a irrigação. Como esta não é considerada no presente sistema, e não estando a região em estudo sujeita a longos períodos de estiagem as práticas a seguir indicadas são mais a título de ilustração ou para serem aplicadas em casos especiais:

- a) aumento da umidade disponível do solo, promovendo a infiltração das águas de chuva mediante covas de infiltração (covas de água), culturas em faixas, cordões em nível sulcos e terraços, e cobertura morta;

- b) "mulching" a fim de reduzir a perda de água por evaporação, bem como, melhoramento e manutenção da estrutura do solo;
- c) ajustamento das culturas a época chuvosa; e
- d) seleção das culturas que melhor se adaptem a essas condições.

Melhoramento do excesso de água

As possibilidades de minorar a limitação pelo excesso de água dependem de vários fatores, entre os quais contam: drenagem interna do solo, topografia do terreno, condições climáticas e exigências das culturas.

Embora no sistema de manejo desenvolvido estejam incluídos trabalhos de drenagem intensivas, estes requerem estudos pormenorizados para obtenção de dados mais concretos.

Na classe de melhoramento 1, os trabalhos de drenagem considerados são simples. A construção de valas remove o excesso de água do solo, e desde que bem planejada, poderá evitar o ressecamento excessivo do mesmo. As valas devem ser protegidas por vegetação baixa de modo a evitar a erosão e bloqueamento dos canais.

A classe de melhoramento 2 é específica para solos que apresentam sérios problemas de drenagem interna e que requerem trabalhos intensivos de drenagem para remover o excesso de água.

A classe de melhoramento 3 foge às possibilidades individuais dos fazendeiros, dependendo de planejamentos de ordem regional, como no caso dos solos Hidromórficos e Orgânicos das várzeas do Rio Paraná.

Melhoramento da susceptibilidade à erosão

O carreamento do horizonte superficial do solo e principalmente o dissecamento do terreno, causado pelos diversos tipos de erosão, podem torná-lo permanentemente inadequado para a agricultura. A conservação do solo também é essencial à manutenção da fertilidade e da disponibilidade de água, pois faz parte do conjunto de práticas necessárias para manter os nutrientes e a umidade do solo.

Os solos da classe de melhoramento 1 são aqueles em que a erosão ou o perigo de erosão é facilmente controlável por meio de práticas simples de combates, como:

- a) enleiramento do cisco, em linhas de nível ou cortando as águas;
- b) capinas alternadas, uma linha sim e outra não, cortando as águas;
- c) ceifa do mato em vez de campinas;
- d) plantio em curvas de nível;
- e) cobertura morta (mulching); e
- f) culturas em faixas.

Os solos da classe de melhoramento 2, são normalmente mais declivosos que os anteriores, e se utilizados sem práticas conservacionistas serão fatalmente prejudicados pela erosão. Necessitam de práticas intensivas de combate, como:

- a) cordões em linha de nível;
- b) terraceamento;
- c) banquetas coletivas; e
- d) banquetas individuais.

Melhoramento dos impedimentos à motomecanização

A maior parte dos obstáculos à mecanização são de caráter permanente, e de tão difícil remoção, que nas nossas condições tornam antieconômicos os trabalhos de melhoramento. No entanto, algumas práticas poderão ser realizadas em benefício do rendimento das máquinas, como construção de estradas para transporte, nivelamento do terreno, drenagem, retirada e amontoamento das pedras superficiais.

DISTRIBUIÇÃO DAS CLASSES DE APTIDÃO DOS SOLOS POR SISTEMA DE MANEJO

As extensões abrangidas pelas áreas dos solos que pertencem a cada uma das quatro classes de aptidão e sua distribuição por sistema de manejo em relação as culturas de ciclo curto ou longo, segundo os quadros 1 e 2, acham-se representadas nos quadros e figuras que seguem (Quadros n.º 3 e 4. Figs. 2 e 3).

QUADRO N.º 3

SISTEMA DE MANEJO POUCO DESENVOLVIDO

Culturas de ciclo curto		Culturas de ciclo longo	
Classes de Aptidão	Área em km ²	Classes de Aptidão	Área em km ²
I — Boa	9.717,0	1 — Boa	11.443,6
II — Regular	6.088,2	2 — Regular	5.607,9
III — Restrita	2.858,4	3 — Restrita	1.612,1
IV — Inapta	1.948,4	4 — Inapta	1.948,4
Total	20.612,0		20.612,0

QUADRO N.º 4


SISTEMA DE MANEJO DESENVOLVIDO (sem irrigação)

Culturas de ciclo curto		Culturas de ciclo longo	
Classes de Aptidão	Área em km ²	Classes de Aptidão	Área em km ²
I — Boa	7.800,9	1 — Boa	15.118,6
II — Regular	8.648,8	2 — Regular	3.545,0
III — Restrita	2.389,8	3 — Restrita	175,9
IV — Inapta	1.772,5	4 — Inapta	1.772,5
Total	20.612,0		20.612,0

SISTEMA DE MANEJO POUCO DESENVOLVIDO

CULTURAS DE CICLO CURTO


CULTURAS DE CICLO LONGO



SISTEMA DE MANEJO DESENVOLVIDO

CULTURAS DE CICLO CURTO

CULTURAS DE CICLO LONGO



BIBLIOGRAFIA

- BENNEMA, J., et al — 1964 — Um sistema de classificação de capacidade de uso da terra para levantamento de reconhecimento de solos — Equipe de Pedologia e Fertilidade do solo. Escritório de Pesquisa e Experimentação. Ministério da Agricultura (Mimeografado) — Rio de Janeiro - RJ — BRASIL
- BERTONI, J. — 1959 — O espedaçamento dos terraços em culturas anuais determinado em função das perdas por erosão. *Bragantia*, Vol. 18 Instituto Agrônomo — São Paulo.
- CAMARGO, M. N., et al — 1962 — Levantamento de reconhecimento dos solos da região sob influência do reservatório de Furnas Boletim Técnico n.º 13 — Comissão de Solos do CNEPA — Serviço Nacional de Pesquisas Agronômicas. Ministério da Agricultura — Rio de Janeiro - RJ — BRASIL.
- DIVISÃO DE PESQUISA PEDOLÓGICA — USAID/BRASIL — Mapa esquemático dos solos das regiões norte, meio-norte e centro-oeste do Brasil. Texto explicativo — Boletim Técnico n.º 17 — Departamento Nacional de Pesquisa Agropecuária. Ministério da Agricultura — Rio de Janeiro - RJ — BRASIL.
- ESCRITÓRIO TÉCNICO DE AGRICULTURA BRASIL-ESTADOS UNIDOS — 1971 — Manual Brasileiro para levantamento da capacidade de uso da terra — Rio de Janeiro - RJ — BRASIL.
- FREITAS, F. G., et al — 1972 — Aptidão Agrícola dos solos do sul do Estado de Mato Grosso — Boletim Técnico n.º 19 — Divisão de Pesquisa Pedológica. Departamento Nacional de Pesquisa Agropecuária. Ministério da Agricultura — Rio de Janeiro - RJ — BRASIL.
- FREITAS, L. M., MILLELSEN, D. S., et al — 1963 — Agricultura no Cerrado. Efeitos da calagem e adubação na produção de algodão, milho e soja. Separata do volume "Simpósio sobre cerrado" IRI. São Paulo — BRASIL.
- LEMOS, R. C. et al — 1960 — Levantamento de Reconhecimento dos solos do Estado de São Paulo — Boletim Técnico n.º 12 — Comissão de Solos do CNEPA. Serviço Nacional de Pesquisa Agronômicas. Ministério da Agricultura — Rio de Janeiro - RJ — BRASIL.
- McCLUNG, A. C., FREITAS, L. M. et al — 1958 — Alguns estudos preliminares sobre possíveis problemas de fertilidade em solos de diferentes campos cerrados de São Paulo e Goiás — Boletim n.º 13 — IRI. São Paulo — BRASIL.
- MEDINA, B. P., GROHMANN, F. — 1966 — Disponibilidade de água em alguns solos de cerrado. Separata *Bragantia*. Vol. 25 n.º 6: 65-76 — São Paulo.
- OLMOS I. L., J. et al — 1964. — Considerações preliminares sobre a utilização agrícola dos solos da região cacauzeira — Comissão Executiva do Plano de Recuperação Econômica Rural da Lavoura Cacauzeira. Centro de Pesquisas do Cacau.
- OLMOS I. L., J., BEEK, K. J. — 1965 — Interpretação do mapa exploratório dos solos da região cacauzeira dos Estados da Bahia e Espírito Santo — Equipe de Pedologia e Fertilidade do Solo. Escritório de Pesquisa e Experimentação. Ministério da Agricultura — Centro de Pesquisa do Cacau. Comissão Executiva do Plano de Recuperação Econômica Rural da Lavoura Cacauzeira — Rio de Janeiro - RJ — BRASIL (Em Publicação).

- OLMOS I. L., J. et al — 1970 — Levantamento de reconhecimentos dos solos no noroeste do Estado do Paraná (Informe preliminar) Boletim Técnico n.º 14 — Equipe de Pedologia e Fertilidade do Solo. Escritório de Pesquisas e Experimentação. Ministério da Agricultura — Rio de Janeiro - RJ — BRASIL.
-
- 1971 — Levantamento de reconhecimento dos solos do noroeste do Estado do Paraná (Informe Preliminar) Divisão de Pesquisa Pedológica. Departamento Nacional de Pesquisa Agropecuária — Ministério da Agricultura — CURITIBA - PR — BRASIL.
-
- 1975 — Aptidão agrícola dos solos do noroeste do Estado do Paraná (Interpretação do Levantamento dos solos). Boletim Técnico n.º 32. Divisão de Pesquisa Pedológica. Departamento Nacional de Pesquisa Agropecuária. Ministério da Agricultura — Rio de Janeiro - RJ — BRASIL.
- PIRES FILHO, A. M. — 1969 — Levantamento de reconhecimento dos solos do Núcleo Colonial de Gurguéia. Boletim Técnico n.º 6 — Equipe de Pedologia e Fertilidade do Solo. Escritório de Pesquisas e Experimentação. Ministério da Agricultura — Rio de Janeiro - RJ — BRASIL.
- RAMALHO FILHO, A. F. et al — 1970 — Interpretação para uso agrícola dos solos da zona de Iguatemi - Mato Grosso. Boletim Técnico n.º 10. Escritório de Pesquisa e Experimentação. Ministério da Agricultura — Rio de Janeiro - RJ — BRASIL.
- SERVIÇO DE CONSERVACION DE SUELOS — 1958 — Manual de Conservacion de suelos. Publicacion TC — 243 — Secretaria de Agricultura de los Estados Unidos. Servicio de Lenguas Extranjeras. Secretaria de Estado de los Estados Unidos.
- VALLI, V. J. — 1972 — Princípios básicos relativos à ocorrência de geadas e sua prevenção — Tradução de José C. J. Schmidt — Departamento Nacional de Meteorologia. Ministério da Agricultura — Rio de Janeiro - RJ — BRASIL.

