


**EMBRAPA**  
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA  
Vinculada ao  
Ministério da Agricultura

SERVIÇO NACIONAL DE LEVANTAMENTO  
E CONSERVAÇÃO DE SOLOS


TRABALHO REALIZADO PARA A COMISSÃO ESTADUAL  
DE PLANEJAMENTO AGRÍCOLA DO ESTADO DO AMAZONAS -  
CEPA / AM

**MAPA DE RECONHECIMENTO DE BAIXA  
INTENSIDADE DOS SOLOS DA ÁREA PILOTO NO  
MUNICÍPIO DE BARREIRINHA, AM**

ESCALA: 1:100.000



1981



**LEGENDA**

**LA** - Associação de LATOSSOLO AMARELO ÁLICO A proeminente  
textura muito argilosa + PLINTOSSOLO ÁLICO Tb A moderado  
textura argilosa/muito argilosa + PLINTOSSOLO ÁLICO Tb A  
moderado textura média/argilosa, todos fase floresta equato-  
rial subperenifolia relevo plano.

**PV** PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO ÁLICO câmbico Tb A mo-  
derado textura argilosa/muito argilosa fase floresta equatorial  
subperenifolia relevo plano.

**HGH** - GLEI HÚMICO ÁLICO Ta fase floresta equatorial higró-  
fila de várzea relevo plano de várzea.

**HGP** - Associação de GLEI POUCO HÚMICO EUTRÓFICO sólido Ta  
fase floresta equatorial higrófila de várzea + GLEI POUCO HÚ-  
MICO EUTRÓFICO Ta fase floresta equatorial higrófila de vár-  
zea relevo plano de várzea + GLEI HÚMICO DISTRÓFICO Ta  
fase floresta equatorial hidrófila de várzea relevo plano de vár-  
zea + SOLOS ALUVIAIS EUTRÓFICOS sólidos Ta fase flo-  
resta equatorial perenifolia relevo plano.

**A** - SOLOS ALUVIAIS ÁLICOS sólidos Ta fase floresta equa-  
torial perenifolia relevo plano.

**CONVENÇÕES**

- Perímetro da área
- Perfil
- ▲ Amostra extra