

EMBRAPA
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA
VINCULADA AO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA

SERVIÇO NACIONAL DE LEVANTAMENTO E CONSERVAÇÃO DE SOLOS

MAPA DE RECONHECIMENTO DE MÉDIA INTENSIDADE DOS SOLOS DE 21.000 HECTARES NO MUNICÍPIO DE TEFÉ, AMAZONAS

ESCALA 1:100.000

1 km 0 1 2 3 4 5 km

1983

CONTRATO EMADE/SNLCS-EMBRAPA

LEGENDA

PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO

PV1 — Associação de PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO relevo suave ondulado e ondulado bem drenado até 100 cm + PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO plíntico relevo suave ondulado bem drenado até 50 cm / moderadamente drenado, ambos ÁLICOS Tb A moderado textura média/argilosa fase floresta equatorial perenifólia.

PV2 — PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO ÁLICO Tb plíntico A moderado textura média/argilosa fase floresta equatorial perenifólia relevo plano e suave ondulado moderadamente drenado até 100 cm.

PV3 — PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO ÁLICO Tb plíntico A moderado textura média/argilosa fase floresta equatorial perenifólia relevo plano e suave ondulado moderadamente drenado até 70 cm/imperfeitamente drenado.

PLINTOSSOLO

PT — PLINTOSSOLO ÁLICO Tb A moderado textura média ou média/argilosa fase floresta equatorial perenifólia relevo plano (com depressões e meandros) imperfeitamente drenado.

SOLOS HIDROMÓRFICOS

Hi — SOLOS HIDROMÓRFICOS INDISCRIMINADOS ÁLICOS fase floresta equatorial perenifólia de várzea relevo plano mal e muito mal drenado.

Convenções

- Limite da área
- Rio e Igarapé
- Limite de unidade de mapeamento
- Área não mapeada

BASE CARTOGRÁFICA: Carta Planimétrica do ITERAM.