10978

CPATU

2001

FL-10978

Documentos

Número, 116

Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento

ISSN 1517-2201

Setembro, 2001

Avaliação da Aptidão Agrícola das Terras do Município de Tomé-Açu, Estado do Pará

Avaliação da aptidão agrícola

2001

FL-10978

Embrapa

39204-1

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Fernando Henrique Cardoso
Presidente

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Marcus Vinícius Pratini de Moraes
Ministro

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA

Conselho de Administração

Márcio Fortes de Almeida
Presidente

Alberto Duque Portugal
Vice-Presidente

Dietrich Gerhard Quast
José Honório Accarini
Sérgio Fausto
Urbano Campos Ribeiral
Membros

Diretoria-Executiva da Embrapa

Alberto Duque Portugal
Diretor-Presidente

Dante Daniel Giacomelli Scolari
Bonifácio Hideyuki Nakasu
José Roberto Rodrigues Peres
Diretores

Embrapa Amazônia Oriental

Emanuel Adilson de Souza Serrão
Chefe Geral

Miguel Simão Neto
Chefe Adjunto de Pesquisa e Desenvolvimento

Antonio Carlos Paula Neves da Rocha
Chefe Adjunto de Comunicação, Negócios e Apoio

Célio Armando Palheta Ferreira
Chefe Adjunto de Administração

Avaliação da Aptidão Agrícola das Terras do Município de Tomé-Açu, Estado do Pará

Tarcísio Ewerton Rodrigues
Paulo Lacerda dos Santos
Pedro Alberto Moura Rollim
Eduardo Santos
João Marcos Lima da Silva
Moacir Azevedo Valente
José Raimundo N.F. Gama

Exemplares desta publicação podem ser solicitados à:

Embrapa Amazônia Oriental

Trav. Dr. Enéas Pinheiro, s/n

Telefone: (91) 299-4544

Fax: (91) 276-9845

e-mail: cpatu@cpatu.embrapa.br

Caixa Postal, 48

66095-100 – Belém, PA

Tiragem: 200 exemplares

Comitê de Publicações

Leopoldo Brito Teixeira – Presidente

Antonio de Brito Silva

Expedito Ubirajara Peixoto Galvão

Joaquim Ivanir Gomes

José de Brito Lourenço Júnior

Maria do Socorro Padilha de Oliveira

Nazaré Magalhães – Secretária Executiva

Revisores Técnicos

Benedito Nelson Rodrigues da Silva - Embrapa Amazônia Oriental

Rafael David dos Santos - Embrapa Solos

Expediente

Coordenação Editorial: Guilherme Leopoldo da Costa Fernandes

Normalização: Silvio Leopoldo Lima Costa

Revisão Gramatical: Maria de Nazaré Magalhães dos Santos

Composição: Euclides Pereira dos Santos Filho

Avaliação da aptidão agrícola das terras do município de Tomé-Açu, Estado do Pará/Tarcísio Ewerton Rodrigues...[et al.]. - Belém: Embrapa Amazônia Oriental, 2001.

25p. ; 22cm. – (Embrapa Amazônia Oriental. Documentos, 116).
Inclui mapa

ISSN 1517-2201

1. Aptidão agrícola – Tomé-Açu - Pará – Brasil. 2. Uso da terra. I. Rodrigues, Tarcísio Ewerton. II. Série.

CDD-631.478115

Sumário

INTRODUÇÃO	5
METODOLOGIA	7
FATORES DE LIMITAÇÃO	8
NÍVEIS DE MANEJO CONSIDERADOS.....	10
CLASSE DE APTIDÃO AGRÍCOLA	11
VIABILIDADE DE MELHORAMENTO	13
ANÁLISES DE FATORES LIMITANTES.....	14
CLASSIFICAÇÃO DA APTIDÃO AGRÍCOLA	16
DESCRIÇÃO DAS CLASSES DE APTIDÃO	16
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES	20
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	21
ANEXO: mapa de aptidão agrícola	25

AVALIAÇÃO DA APTIDÃO AGRÍCOLA DAS TERRAS DO MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU, ESTADO DO PARÁ

Tarcísio Ewerton Rodrigues¹
Paulo Lacerda dos Santos²
Pedro Alberto Moura Rollim³
Eduardo Santos⁴
João Marcos Lima da Silva²
Moacir Azevedo Valente²
José Raimundo N.F. Gama¹

INTRODUÇÃO

A interpretação para uso dos solos da área foi embasada nos dados referente aos solos, meio ambiente e observações de campo e literatura pertinente. Para a avaliação de classe de aptidão agrícola foi empregado o Sistema de Avaliação de Aptidão Agrícola das Terras (Ramalho Filho & Beek; 1995; Incra, 1989).

A classe de aptidão foi determinada em função das condições agrícolas dos solos em relação ao solo ideal, quanto ao grau de deficiência de nutriente (f), deficiências de água (h), deficiência de oxigênio (o), susceptibilidade à erosão (e) e impedimento à mecanização (m). Estes fatores são quantificados em grau: nulo (0); ligeiro (1); moderado (2); forte (3) e muito forte (4).

¹Eng. Agrôn., D.Sc., Pesquisador da Embrapa Amazônia Oriental, Caixa Postal 48, CEP 66017-970, Belém, PA. E-mails: tarcisio@cpatu.embrapa.br, gama@cpatu.embrapa.br

²Eng. Agrôn., M.Sc., Pesquisador da Embrapa Amazônia Oriental. E-mails: lacerda@cpatu.embrapa.br, jmarcos@cpatu.embrapa.br, mvalente@cpatu.embrapa.br

³Téc. em Hidroclimatologia da Sudam/DRN.

⁴Eng. Ftal. Técnico da Sudam/DRN.

A viabilidade de redução desses fatores limitantes, conforme o nível de manejo A, B e C, refletem uma elevação do nível tecnológico, nesta ordem, um emprego mais intenso de capital e trabalho, indo de braçal com alguma tração animal (nível A) até à motomecanização em várias fases da preparação agrícola (nível C).

A comparação dos fatores limitantes dos solos com os níveis de manejo na forma de tabela vão expressar as classes de aptidão. Na determinação da classe de aptidão agrícola dos solos, são considerados os seguintes passos: a) síntese da influência das várias propriedades do ecossistemas que são fundamentais para as plantas ou para utilização agrícola; b) análise da intensidade dos fatores limitantes e a possibilidade e dificuldade de redução dos graus dos mesmos, considerando-se as opções dos níveis de manejo e determinação das classes de aptidão, ajustando-se as informações sobre os graus dos fatores limitantes e a viabilidade de melhoramento.

A avaliação da potencialidade dos solos leva em consideração a interpretação dos resultados obtidos pelos levantamentos de solos, em que se obtêm as propriedades e qualidades das terras que interferem ou não no uso dos solos. A avaliação da aptidão agrícola teve como objetivo, determinar e prever a melhor aptidão de uso das terras para uso agrícola e/ou outros usos, assim como estimar os níveis de deficiência dos fatores limitantes para os diversos tipos de utilização dos recursos de solos do Município de Tomé-Açu, elaborado na escala de 1:100.000 publicado na escala 1:250.000 (Rodrigues et al. 2001).

METODOLOGIA

O Município de Tomé-Açu situa-se na mesorregião do nordeste paraense, entre as coordenadas geográficas de $02^{\circ}54'45''$ e $3^{\circ}16'36''$ de latitude sul e de $47^{\circ}55'38''$ e $48^{\circ}26'44''$ de longitude a oeste de Greenwich (Fig. 1). O Município de Tomé-Açu tem uma superfície aproximada de 5.179 km^2 e população de 75 mil habitantes, que concentra sua maior parte na cidade de Tomé-Açu, sede municipal.

Fig. 1. Mapa de Localização do Município de Tomé-Açu, PA.

Na avaliação da potencialidade dos solos, utilizou-se a interpretação dos resultados, propriedades e qualidades obtidas e determinadas pelo levantamento de reconhecimento de solos do Município de Tomé-Açu, PA (Rodrigues et al. 2001).

A metodologia empregada para a avaliação da potencialidade dos solos consta do estabelecimento dos fatores limitantes, dos níveis (sistemas) de manejo, das classes de aptidão agrícola e viabilidade de melhoramento dos fatores limitantes ao uso agrícola.

FATORES DE LIMITAÇÃO

A premissa básica da interpretação reside na comparação do solo em condições naturais de fertilidade natural, deficiência hídrica, deficiência de oxigênio, suscetibilidade de erosão e impedimentos ao uso de implementos agrícolas, ao solo ideal (Ramalho Filho & Beek, 1995).

Os graus de deficiência de fertilidade foram definidos em função de: disponibilidade de macro e micronutrientes; presença ou ausência de sais solúveis e de outras substâncias tóxicas, pH, soma de bases trocáveis (S), capacidade de troca de cátions (CTC), saturação de bases (V) e saturação com alumínio (m) (Tabela 1).

A indisponibilidade de água para as plantas é determinada pela capacidade de retenção de água no solo, pelas condições climáticas, principalmente, precipitação e evapotranspiração. A disponibilidade de água para as plantas nos solos é resultante da combinação das propriedades do solo como: textura, estrutura, teor de matéria orgânica, tipo de argila e profundidade efetiva do solo.

O excesso de água ou deficiência de oxigênio é ocasionado pelo encharcamento do solo e está relacionado à drenagem natural, existindo, portanto, uma relação entre a classe de drenagem e a deficiência de oxigênio. A drenagem natural é resultante da interação de vários fatores como: clima (precipitação e evapotranspiração), relevo local, manejo e propriedades do solo (estrutura, textura, permeabilidade do solo, presença de camadas menos permeáveis, plintita, além de outras).

A susceptibilidade à erosão refere-se ao desgaste que a superfície do solo sofreria se fosse usada para agricultura, sem adoção de práticas conservacionistas. É influenciada por: clima (intensidade, duração e distribuição de chuvas), condições de relevo (declividade, comprimento de pendente, microrelevo), condições de solo (textura, estrutura, permeabilidade, profundidade, capacidade de retenção de água, presença ou ausência de camada compactada do solo, pedregosidade, teor de matéria orgânica) e cobertura vegetal.

Os impedimentos à mecanização referem-se às condições dos solos para suportar operações de máquinas e implementos agrícolas, as quais são influenciadas, principalmente, por profundidade do solo; grau e forma de declive, condições de drenagem natural, textura, tipo de argila, pedregosidade e rochiosidade superficial.

NÍVEIS DE MANEJO CONSIDERADOS

Os sistemas de manejo foram considerados em função do nível tecnológico que os agricultores podem dominar e em função das condições ecológicas das terras em suportar atividades agrícolas (Ramalho Filho e Beek 1995)

Nível de Manejo A: utiliza práticas agrícolas que refletem baixo nível tecnológico, depende, principalmente, do trabalho braçal. Praticamente não é aplicado capital no melhoramento e conservação do solo e das lavouras, os cultivos são alternados por pousios sucessivos.

Nível de Manejo B: utiliza práticas agrícolas que refletem nível tecnológico médio. Aplicação modesta de capital para melhoramento e conservação do solo e das lavouras. O trabalho é, principalmente, o braçal e tração animal.

Nível de Manejo C: empregam-se práticas agrícolas que refletem nível tecnológico alto. Aplicação intensiva de capital para manutenção, melhoramento e conservação do solo e das lavouras. As práticas de manejo empregadas são capazes de elevar a capacidade produtiva da terra. O trabalho utiliza mecanização em quase todas as fases da operação agrícola. Incluem práticas intensivas de drenagem, controle à erosão, rotação de culturas com sementes e mudas selecionadas e aplicações de fertilizantes, corretivos e defensivos agrícolas.

CLASSE DE APTIDÃO AGRÍCOLA

As classes de aptidão agrícola das terras (Tabela 2 e Fig. 2) expressam um determinado tipo de utilização em um nível de manejo definido. Segundo FAO (1976), as classes são assim definidas:

Classe boa: terras sem limitações para a produção sustentada de um determinado tipo de utilização, observando-se as condições do manejo considerado. Há um mínimo de restrições que não reduzem a produtividade ou os benefícios expressivamente e não aumentam os insumos acima de um nível aceitável.

Classe regular: terras que apresentam limitações moderadas para a produção sustentada de um determinado tipo de utilização, observando as condições de manejo consideradas. As limitações reduzem a produtividade ou os benefícios, elevando a necessidade de insumos de forma a aumentar as vantagens globais a serem obtidas do uso. Ainda que atrativas, essas vantagens são sensivelmente inferiores àquelas auferidas das terras de classe boa que não existem na área de estudo.

Tabela 2. Representação cartográfica das classes de aptidão agrícola das terras.

Classes de aptidão agrícola	Tipo de utilização					
	Lavoura			Pastagem plantada	Silvicultura	Pastagem natural
	Nível de manejo			Nível de manejo	Nível de manejo	Nível de manejo
	A	B	C	B	B	A
Boa	A	B	C	P	S	N
Regular	A	b	c	p	s	n
Restrita	(a)	(b)	(c)	(p)	(s)	(n)
Inapta	--	--	--	--	--	--

Fig. 2. Alternativas de utilização das terras de acordo com os grupos de aptidão agrícola.

Classe restrita: terras que apresentam limitações fortes para a produção de um determinado tipo de utilização, observando as condições de manejo considerado. Essas limitações reduzem a produtividade ou os benefícios, ou então aumentam os insumos necessários de tal maneira que os custos só seriam justificados marginalmente.

Classe não recomendada: terras que apresentam condições que parecem excluir a produção sustentada do tipo de utilização em questão. Ao contrário das demais, essa classe não é representada por símbolos. Sua interpretação é feita pela ausência das terras do tipo de utilização considerado. As terras consideradas inaptas para lavouras têm suas possibilidades analisadas para uso menos intensivos (pastagem plantada, silvicultura ou pastagem natural). No entanto, as terras consideradas inaptas para diversos tipos de utilização considerados, têm como alternativa serem indicadas para preservação da flora e fauna, extrativismo, recreação ou algum outro tipo de uso não agrícola.

VIABILIDADE DE MELHORAMENTO

Alguns problemas que interferem no desenvolvimento e produtividade das culturas podem ser minimizados em maior ou menor intensidade, com emprego de capital maior ou menor. Devem ser priorizados aqueles que possibilitem aumento da produtividade das culturas com lucratividade. A estimativa de melhoramento podem ser especificadas para os níveis de manejo B e C, nas seguintes classes (Ramalho Filho e Beek, 1995).

Classe 1: melhoramento viável com práticas simples e pequeno emprego de capital.

Classe 2: melhoramento viável com práticas intensivas e mais sofisticadas e considerável aplicação de capital. Esta classe ainda é considerada economicamente compensadora.

Classe 3: melhoramento viável somente com práticas de grande vulto, aplicados a projetos de larga escala que estão normalmente, além das possibilidades individuais dos agricultores.

Classe 4: sem viabilidade técnica ou econômica de melhoramento.

ANÁLISES DE FATORES LIMITANTES

Deficiência de nutrientes: a deficiência de fertilidade foi estimada em grau moderado/forte, na maioria dos solos da área em condições naturais (Latosolos e Argissolos), tornando-se inviável a sua utilização no sistema de manejo A, uma vez que o uso da terra está na dependência do nível de fertilidade natural. Estes solos possuem alguns nutrientes retidos praticamente no ciclo orgânico. Na área predominam as terras de boas propriedades físicas, com fertilidade natural baixa, que exigem a aplicação de fertilizantes e corretivos, para correção e manutenção de seu estado nutricional, bem como, um nível elevado de conhecimento técnico, para obtenção de bons rendimentos (níveis de manejo B e C; viabilidade de manejo - classe 2).

Deficiência de água: a deficiência de água foi considerada como grau ligeiro para a utilização dos solos da região, porque a mesma encontra-se sob condições de clima do tipo Am, onde ocorre deficiência hídrica pouco acentuada, que pode prejudicar o desenvolvimento de algumas culturas de ciclo longo mais sensíveis à falta de água. No entanto, algumas práticas de manejo podem ser feitas para manter a umidade disponível nos solos, como: manutenção do solo com cobertura morta, provenientes de restos de vegetais e viva como leguminosa.

Excesso de água: estima-se que a maioria dos solos (Latosolos e Argissolos) não apresentam limitação no que se refere à deficiência de oxigênio, em relação ao solo ideal. Os Argissolos Amarelos plínticos têm limitação forte durante o período chuvoso, enquanto que, solos de várzeas têm limitação forte a muito forte, onde se prevê que este desvio pode ser parcialmente reduzido, por exemplo, através de canais de drenagem.

Susceptibilidade à erosão: a limitação deste fator nos solos da área está relacionado com a conformação topográfica e a classe de textura que apresentam. Os solos encontrados em relevo plano e suave ondulado apresentam graus ligeiro de desvio. Este desvio pode ser reduzido com práticas simples de controle de erosão, tais como: cultivo em contorno, culturas em faixas, rotação de culturas, cobertura morta, cobertura verde, cordão de retenção, preparo reduzido do solo, além de outras.

Impedimento à mecanização: a limitação deste fator está, também, muito relacionada com o relevo do solo. Os Latossolos e Argissolos encontrados em relevo plano e suave ondulado apresentam desvio (grau) nulo de limitação à mecanização. Os solos de várzeas, pelas inundações anuais e os Latossolos e Argissolos concrecionários em relevo plano a forte ondulado têm desvios moderados a fortes, em função da alta concentração de concreções lateríticas (pedras) que dificulta o uso de mecanização no preparo do solo.

Estes graus de desvios atribuídos aos solos mapeados neste município são comparáveis aos observados em outras áreas (Sudam, 1988; Embrapa, 1982, 1983 a e b; Amaral et al. 1975; Brasil, 1973 e 1974; Rodrigues et al. 1999; Santos, 1993).

CLASSIFICAÇÃO DA APTIDÃO AGRÍCOLA

A aptidão agrícola está sendo usada no sentido amplo para lavouras, pastagens, silvicultura e preservação ambiental (Fig. 2) (Ramalho Filho et al. 1995). Observa-se uma relação do número de alternativas de uso com o aumento do grau de limitação. Os números de 1 a 6 que identificam o grupo de aptidão indicam a intensidade das limitações e o principal uso intensivo ainda possível.

A classe de aptidão é definida em relação ao nível de manejo e o tipo de utilização (Tabela 2). No exemplo 1(a) b C, o algarismo 1 representa a melhor classe de aptidão, uma vez que as terras pertencem à classe de aptidão boa, no nível de manejo C (grupo 1), classe de aptidão regular, no nível de manejo B (grupo 2) e classe de aptidão restrita, no nível de manejo A (grupo 3).

DESCRIÇÃO DAS CLASSES DE APTIDÃO

A previsão de utilização das terras para uso agrícola em lavouras, pastagens, silvicultura e áreas para serem preservadas, visaram, principalmente, o uso sustentável das terras, a qual condicionou o enquadramento das unidades de solos em classes de aptidão agrícola, baseada nas possibilidades de remoção e/ou minimização das limitações naturais do solo (Ramalho Filho & Beek, 1995).

Considerando as características físicas, químicas e morfológicas dos solos obtidos pelo levantamento pedológico, aspectos da paisagem e condições climáticas, foi possível estabelecer as principais limitações ao uso agrícola das terras, as quais são mencionadas a seguir:

a) baixa fertilidade natural, condicionada pelos baixos teores de soma de bases trocáveis de capacidade de troca de cátions, de fósforo, de nitrogênio, e elevada saturação

por alumínio extraível; b) drenagem deficiente, em parte das classes de solos; evidenciada pela inundação periódica, que durante o período chuvoso ocasiona a saturação do solo; c) susceptibilidade à erosão, condicionada pelo relevo ondulado em algumas unidades e à textura superficial arenosa de alguns dos solos; d) impedimento ao uso de máquinas e implementos agrícolas, devido à presença de concreções lateríticas e relevo ondulado e forte ondulado.

Analisando as principais limitações das terras com os parâmetros adotadas no sistema de interpretação (Ramalho Filho & Beek, 1995; Incra, 1989; Resende, 1995), foi possível estabelecer uma classe de aptidão agrícola para cada unidade de mapeamento de solos na escala 1:200.000 (Tabela 3), as quais, foram agrupadas de acordo com a mesma classe de aptidão nos três níveis (sistema) de manejo considerados, conforme visualizada na Tabela 4.

Deve ser salientado que, no caso de associações de solos, o símbolo representa a classe de aptidão dominante, levando-se em consideração todos os componentes da mesma. Neste caso, pode ocorrer, em menor proporção, terras com aptidão superior e/ou inferior à representada pela unidade de mapeamento.

CLASSE 1(a)bc: a classe de aptidão agrícola **1(a)bc** compreende terras aptas para lavouras, apresentando classe de aptidão **BOA** no sistema de manejo **C**, **REGULAR** no sistema de manejo **B** e **RESTRITA** no sistema de manejo **A**. Possui como principal fator limitante a baixa disponibilidade de nutrientes essenciais às plantas.

CLASSE 3(abc): a classe de aptidão agrícola **3(abc)** compreende terras aptas para lavouras, apresentando classe de aptidão restrita nos sistema de manejo **A**, **B** e **C**, devido, principalmente, a muito baixa disponibilidade de nutrientes essenciais às plantas e à drenagem moderada, ocasionando deficiência de oxigênio durante parte do ano.

Tabela 4. Legenda, área e porcentagem das classes de aptidão agrícola das terras.

Símbolo no mapa de aptidão das terras	Caracterização da classe	Área (ha)	%
1(a)bc	Compreende terras que apresentam classe de aptidão agrícola BOA para lavoura no sistema de manejo c, REGULAR no sistema de manejo B e RESTRITA no sistema de manejo A.	277.214	56,53
3(abc)	Compreende terras que apresentam classe de aptidão agrícola RESTRITA para lavoura nos sistemas de manejo A,B e C.	14.864	2,87
4p	Compreende terras que apresentam classe de aptidão regular para pastagem plantada.	212.404	41,1
6	Compreende terras inaptas para uso agrícola. São terras mais apropriadas à preservação ambiental.	13.438	2,59
Total		5.179,2	100

CLASSE 4p: a classe de aptidão agrícola 4p compreende terras apresentando classe de aptidão **REGULAR** para formação de pastagens, devido, principalmente, a deficiência de drenagem, presença de pedras (concreções lateríticas) e relevo ondulado.

CLASSE 6: a classe de aptidão agrícola 6 engloba as terras **INAPTAS** para utilização agrícola em geral, indicadas preferencialmente para áreas de preservação ambiental. A presença de concreções lateríticas (calhaus), relevo ondulado e forte ondulado e deficiência de oxigênio, são as principais limitações destas terras.

As classes de aptidão agrícola das terras determinadas para o Município de Tomé-Açu, PA, já foram admitidas para solos semelhantes mapeados em outras regiões (Brasil, 1973 e 1974; Embrapa, 1983 a e b e 1982; Santos, 1993).

A interpretação das propriedades e qualidades dos solos do Município de Tomé-Açu, empregadas na avaliação da potencialidade das terras para utilização agrícola, permitiram enquadrá-las nas seguintes classes de aptidão (Tabela 4):

- Terras que apresentam classes de aptidão para lavouras abrangem uma superfície de 292.078 hectares, representando 56,40% da área do município;
- Terras que apresentam classes de aptidão para pastagem plantada perfazem 212.404 hectares, correspondendo a 41,10% da área.
- Terras inaptas para utilização em lavouras, indicadas para preservação ambiental abrangem 13.438 ha e 2,59 % da área total.

As terras indicadas para lavouras podem ser utilizadas também para formação de pastagens. As áreas ainda florestadas indicadas para atividades agrícolas podem ser também utilizadas com exploração madeireira usando Sistema de Manejo Florestal Sustentável.

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

A interpretação dos resultados obtidos pelo levantamento pedológico do Município de Tomé-Açu, PA, para avaliação da potencialidade dos solos, permitiram estabelecer as seguintes conclusões:

- Os solos mapeados apresentam restrição para utilização com lavouras no sistema de manejo A, por apresentarem baixa reserva de nutrientes essenciais às plantas cultivadas
- Quanto à intensidade de uso das terras, estas foram distribuídas para lavouras: 277.214 hectares e 53,53%; destinadas à formação de pastagens: 212.404 hectares e 41,10%; indicadas para preservação ambiental: 13.438 hectares e 2,59% da área total do município.

- As áreas indicadas para lavoura como uso preferencial, podem, também, ser utilizadas em atividades menos intensivas, como formação de pastagens, silviculturas (reflorestamento) nas áreas alteradas e manejo florestal sustentável nas áreas ainda florestadas.

- A baixa reserva de nutrientes essenciais às plantas condiciona a utilização dos sistemas de manejo B e C, para essas terras, porque prevê aplicação de insumos agrícolas e de tecnologias capazes de proporcionar o uso sustentável desses recursos.

- Nas áreas consideradas aptas para lavouras, podem ser cultivadas culturas de ciclos curto e longo, adaptadas às condições climáticas da região.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMARAL, Z.P. do; LOPES, D. N.; REIS, C. M. dos ; REGO, R.S.; GAMA, J.R.N.F.; SANTOS, P. L. **Capacidade de uso da terra das micro - regiões do nordeste paraense**. Belém: IDESP, 1975. 199p. (IDESP. Monografias, 17).

BRASIL. Departamento Nacional da Produção Mineral. Projeto. RADAMBRASIL. **Folha SA-23- São Luiz e parte da folha AS- 24**: geologia, geomorfologia, pedologia, vegetação e uso potencial da terra. Rio de Janeiro. 1973. Paginação irregular. (Projeto RADAMBRASIL. Levantamento de Recursos Naturais, 4).

BRASIL. Departamento Nacional de Produção Mineral. Projeto RADAMBRASIL. **Folha SA-22- Belém**: geologia, geomorfologia, pedologia, vegetação e uso potencial da terra. Rio de Janeiro. 1974. Paginação irregular. (Projeto RADAMBRASIL. Levantamento de Recursos Naturais, v.5).

EMBRAPA. Serviço Nacional de Levantamento e Conservação de Solos. **Levantamento de média intensidade e avaliação da aptidão agrícola das terras do Polo Roraima.** Rio de Janeiro, 1983 a 368p. (Embrapa-SNLC. Boletim de Pesquisa, 18).

EMBRAPA. Serviço Nacional de Levantamento e Conservação de Solos. **Levantamento de reconhecimento de média intensidade dos solos e avaliação da aptidão agrícola das terras da área do Polo Tapajós.** 1983b. 284p. (Embrapa - SNLCS. Boletim de Pesquisa, 20).

EMBRAPA. Serviço Nacional de Levantamento e Conservação de Solos. **Levantamento de reconhecimento de média intensidade dos solos e avaliação da aptidão agrícola das terras do Polo Pré - Amazônia Maranhense.** Rio de Janeiro, 1982. 290p. (Embrapa - SNLCS - Boletim de Pesquisa, 15).

FAO. **A framework for land evaluation.** Rome, 1976. 72p. (FAO. Soils Bulletin, 32).

INCRA. **Levantamento exploratório com intensidade de solos do centro oeste do Estado do Pará.** Viçosa; 1989. 266p. Mimeografado.

RAMALHO FILHO, A.; BEEK, K.J. **Sistema de Avaliação da Aptidão Agrícola das Terras.** Brasília: SUPLAN: Embrapa-CNPS, 1995. 65p.

RESENDE, M. **Pedologia,** Viçosa, UFV, 1995. 100p.

RODRIGUES, T.E.; SANTOS, P.L. dos; ROLIM, P.A.M.; SANTOS, E.; SILVA, J.M.L. da; VALENTE, M.A. ; GAMA, J.R.N.F. **Caracterização e classificação dos solos do município de Tomé-Açú. Estado do Pará.** Belém: Embrapa Amazônia Oriental, 2001. (Embrapa Amazônia Oriental. Documentos, 117). No prelo.

RODRIGUES, T.E.; SANTOS, P.L. dos; SILVA, R. das C.; OLIVEIRA JÚNIOR, R.C. de; SILVA, J.M.L. da; GAMA, J.R.N.F.; VALENTE, M.A . **Caracterização e classificação dos solos do município de Paragominas – Estado do Pará.** Belém: Embrapa Amazônia Oriental, 1999. A publicar.

SANTOS, P. L. dos. **Zoneamento agroedafoclimático da bacia do Rio Candiru-Açú, Pará.** 1993. 153 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Ciências Agrárias do Pará, Belém.

SUDAM. **Diagnóstico de recursos naturais Área-Programa Guamá-Acará-Moju.** Belém: SUDAM:OEA, 1988. 177p. v.1: Solos e aptidão agrícola da terras – relatório técnico. Mimeografado.

ANEXO

**Mapa de Aptidão Agrícola das Terras do
Município de Tomé-Açu, PA.**

502° 00'

MAPA DE APTIDÃO AGRÍCOLA DAS TERRAS DO MUNICÍPIO DE TOMÉ-ÁÇU-PARÁ.

Projeção: UTM/SAD69
ESCALA 1:250.000
1 999

W48° 30'

W48° 30'

Departamento de Pesquisa Agropecuária e Assistência Rural
Laboratório de Aptidão e Uso das Terras Rurais

502° 00'

SOLHEIROS

- E-323
- Canal
- Canal Livre
- Limite rural
- Franquia de 100 metros

Nota: Elaborado a partir da interpretação cartográfica dos dados do SUDAM, SUDAM, SUDAM e SUDAM. A interpretação cartográfica foi realizada a partir dos dados de campo e de cartas planimétricas do Departamento de Engenharia Geodésica do SUDAM.

LEGENDA

SÍMBOLO DAS CLASSES DE APTIDÃO	CLASSES DE APTIDÃO AGRÍCOLA	QUANTIFICAÇÃO Área (ha)	%
1(a)bc	Terras pertencentes à classe de aptidão RQZ para os solos no nível de manejo C, REGULAR no nível B e superior no nível A.	2.772,14	53,53
4p	Terras pertencentes à classe de aptidão REGULAR para os solos no nível de manejo B e C.	148,64	2,87
6	Terras pertencentes à classe de aptidão REGULAR para os solos no nível de manejo B.	2.124,04	41,01
	Terras sem aptidão para uso agrícola. São indicadas para preservação ambiental.	134,38	2,59
TOTAL		5.179,20	100,00

NÍVEIS DE MANEJO

NÍVEL A - Baseado em práticas agrícolas que refletem um baixo nível tecnológico. As práticas agrícolas adotadas são condicionadas principalmente ao trabalho braço-de-obra animal.

NÍVEL B - Baseado em práticas agrícolas que refletem um nível tecnológico médio. Caracteriza-se por práticas agrícolas que refletem um nível tecnológico médio, com o uso de equipamentos agrícolas modernos, participando em atividades agrícolas e no uso de técnicas empíricas agrícolas simples.

NÍVEL C - Baseado em práticas agrícolas que refletem um alto nível tecnológico. Caracteriza-se por práticas agrícolas que refletem um alto nível tecnológico, com o uso de equipamentos agrícolas modernos e técnicas modernas de manejo e implementação agrícolas.

ANEXO I - CORRESPONDÊNCIA DAS CLASSES DE APTIDÃO AGRÍCOLA

CLASSES DE APTIDÃO AGRÍCOLA	TIPO DE UTILIZAÇÃO	USO	USO	USO	USO	USO	USO
		Nível de Manejo A	Nível de Manejo B	Nível de Manejo C	Nível de Manejo D	Nível de Manejo E	Nível de Manejo F
A	1	1	1	1	1	1	1
B	2	2	2	2	2	2	2
C	3	3	3	3	3	3	3
D	4	4	4	4	4	4	4
E	5	5	5	5	5	5	5
F	6	6	6	6	6	6	6

503° 00'

W48° 30'

W48° 30'

503° 00'

Amazônia Oriental
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Trav. Dr. Enéas Pinheiro s/n, Caixa Postal 48
Fax (91) 276-9845, Fone: (91) 299-4544
CEP 66095-100, Belém, PA
www.cpatu.embrapa.br

1 1 1 4 1 5

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO