

FD
00466

UNIDADE DEMONSTRATIVA MANEJO DE AÇAIZAIS NATIVOS EM ÁREA DE VÁRZEA



Foto: Vista Parcial da Unidade Demonstrativa sobre Manejo de Açazal Nativo, na Comunidade Ponta Verde, São Domingos do Capim, PA.

**Município de São Domingos do
Capim - Pará
2008**

 **Embrapa**

Amazônia Oriental

UNIDADE DEMONSTRATIVA MANEJO DE AÇAIZAIS NATIVOS EM ÁREA DE VÁRZEA

INTRODUÇÃO

O açazeiro (*Euterpe oleracea* Mart.), palmeira nativa da Amazônia, se destaca, entre os diversos recursos vegetais, pela sua abundância na região do estuário e por seus frutos produzirem importante alimento para as populações locais, cujo excedente é ainda comercializado para vários Estados brasileiros e alguns países. Por essa razão, a produção de frutos passou a ser obtida, também, de açazeais nativos manejados e de cultivos realizados em áreas de várzea e de terra firme. O interesse pela implementação da produção tem feito com que muitos produtores e extrativistas tenham procurado organizações de pesquisa, assistência técnica, cooperativismo e associativismo com o intuito de obter informações sobre sistemas de manejo que viabilizem a produção econômica de frutos.

Com a implantação dessa "Unidade Demonstrativa" pretende-se elaborar, validar, recomendar e difundir sistemas de manejo de populações naturais de açazeiros para as áreas de várzea que propiciem melhorias na renda das comunidades extrativistas ribeirinhas, na sustentabilidade ambiental e na diversificação de produtos.

Então envolvidas as instituições que atuam na região com assistência técnica e extensão rural, fomento, Secretaria Municipal de Agricultura e organização de produtores.

OBJETIVO

Disponibilização e apropriação de tecnologias sustentáveis para extrativistas familiares de áreas ribeirinhas do nordeste paraense, através do manejo sustentável de açazeais nativos.

METODOLOGIA

A "Unidade Demonstrativa" está implantada em área de várzea do Rio Guamá, na Comunidade de Ponta Verde, Município de São Domingos do Capim, Estado do Pará.

Para sua implantação foi seguida a seguinte as seguintes etapas:

a) Limpeza da área - a roçagem é o primeiro trabalho feito na área e consiste na eliminação das plantas de menor porte e cipós, retirando-se os galhos, visando facilitar o deslocamento das pessoas que implementarão as demais práticas.

b) Raleamento da vegetação: nesta etapa deve-se identificar e eliminar as árvores cujo produto não tenha valor no mercado, mantendo-se aquelas produtoras de madeira, frutos, fibras, látex, óleos e medicinais.

c) Desbaste das touceiras - nos açazais não manejados geralmente as touceiras apresentam-se com número excessivo de perfilhos (açazeiros). A prática de desbaste visa eliminar o excesso de estipes deixando-se de 3 a 4 em cada touceira, sendo cortados aqueles muito altos, finos, defeituosos ou que apresentem pouca produção de frutos.

d) Obtenção de mudas - as mudas de açazeiros para plantio nas áreas com baixa concentração de plantas dessa espécie podem ser obtidas a partir de plântulas oriundas da regeneração natural por sementes ou produzidas especificamente para esse fim, com utilização de sementes de açazeiros de várzea com boas características de produção de frutos e bom rendimento de polpa.

e) Manutenção do açazal - anualmente deve-se efetuar roçagem das plantas de valor desconhecido para que o açazal mantenha-se limpo e mais produtivo.

Deverão ser eliminadas as brotações novas que surgiram no período, deixando-se somente as que substituirão os açazeiros grandes indesejáveis com vistas a manter-se a população.

Na avaliação da "Unidade Demonstrativa" serão realizadas visitas técnicas periódicas no local em companhia do produtor proprietário da área e técnicos da Emater.

RESULTADOS PARCIAIS / RESUMO DA TECNOLOGIA

Todo o trabalho inicial de limpeza da área, raleamento, desbastes das touceiras formação de mudas e plantio das espécies no campo já foram implantados. Nessa área foram levadas mudas de espécies florestais e de fruteiras de interesse do produtor, além das mudas de açaf. As espécies implantadas se encontram em bom desenvolvimento vegetativo, mostrando que a prática implantada está dando resultado.

A utilização das florestas de várzea do estuário amazônico considera o açazeiro como elemento principal, porém, consorciado com espécies que ocorrem na própria área e com outras introduzidas, caracterizando dessa forma a manutenção e o enriquecimento da biodiversidade. O emprego dessa técnica de manejo não se utiliza de insumos tecnológicos, como adubos e fertilizantes e também quanto ao emprego de novos recursos naturais não se faz necessário tendo em vista que essa prática é utilizada em áreas já existentes. Não se faz necessário a utilização de recursos energéticos modernos..

Equipe Técnica

Oscar Lameira Nogueira
Exedito Ubirajara Peixoto Galvão
Adair Corrêa da Cruz

Tiragem: 100 exemplares
Belém-PA



Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Centro de Pesquisa Agroflorestal da Amazônia Oriental
Trav. Dr. Enéas Pinheiro s/n, Caixa Postal 48,
Fax (91) 3 276-9845 CEP: 66.095-100

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO.



MANEJO de açazais nativos ...

2008

FD-PP-00466



CPATU- 40767-1

