

## Agronômicas e Morfológicas

Recuperação ao corte (forragem)	Regular
Hábito	Ereto
Resistência ao acamamento	Moderada
Peso de 1000 grãos (g)	18
Comprimento do grão (cm)	1,1
Diâmetro do colmo	0,4
Uniformidade na floração	Total
Uniformidade na maturação	Total
Reação às ferrugens	Moderadamente suscetível*
Reação ao carvão	Suscetível**

\* Moderadamente suscetível qualitativamente e moderadamente resistente quantitativamente.

\*\* Nos campos de multiplicação, tratar as sementes com produtos próprios para o controle da

## Rendimento de matéria seca

Cultivar	Rendimento e incremento de matéria seca (kg/ha)			
	Centro-Oeste e Norte <sup>1</sup>		Centro-Sul <sup>2</sup>	
	Parte aérea (Palha)			
Embrapa 140 (Campeira-Mor)	7006	104	8753	103
Aveia preta comum	6732	100	8484	100
	Raiz			
Embrapa 140 (Campeira-Mor)	742	109	1312	102
Aveia preta comum	681	100	1284	100

<sup>1</sup> Rendimento médio de 1990 a 1993

<sup>2</sup> Rendimento médio de 1989, 1991 e 1993

### Texto:

Engº Agrº Celso de Almeida Gaudencio - Embrapa Soja

### Colaboradores:

Engº Agrº Joaquim Mariano Costa - COAMO

Téc. Agric Ademir Antônio Simionato - COAMO

Folder nº 03/98

Tiragem: 5.000 exemplares - Julho/98



COAMO  
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA  
MOURÃOENSE LTDA

ADM. CENTRAL: RUA FIORAVANTE JOÃO FERRI, 99 - JARDIM ALVORADA  
FONE: PABX (044) 821-0123 - FAX (044) 821-0465  
CX. POSTAL: 460 - CEP 87308-400 - CAMPO MOURÃO - PR

**Embrapa**

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária  
Centro Nacional de Pesquisa de Soja

Ministério da Agricultura e do Abastecimento

Telefone: (043) 371-6000 - Fax: (043) 371-6100  
Caixa Postal 231 - CEP: 86001-970 - Londrina, PR.



**AVEIA PRETA  
PARA COBERTURA  
VEGETAL DO SOLO**

**EMBRAPA 140  
(Campeira-Mor)**

**Embrapa**





# Cultivar de Aveia Preta (*Avena strigosa*)

## Embrapa 140 (Campeira-Mor)

Esta cultivar foi lançada, em 1995, pela Comissão Brasileira de Pesquisa de Aveia, para os estados do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul.

Pelo incremento de palha e raiz que proporciona ao solo, é especialmente indicada para cobertura vegetal do solo, na rotação de culturas e na semeadura direta.



## Origem

A Embrapa 140 (Campeira-Mor) foi obtida de seleção feita pela Embrapa Soja, com a participação da COAMO (Cooperativa Agropecuária Mourãoense), na fase de seleção de atributos de adaptação e agronômico para a cobertura vegetal do solo, no processo de semeadura direta.

A seleção foi pelo método de linhas puras, conduzido em Guarapuava, PR, a partir de aveia preta comum proveniente de Marilândia do Sul, PR.

Durante o processo de seleção, foram buscadas linhagens de diferentes ciclos com colmos fortes para evitar o acamamento e com tolerância à ferrugem da folha e à ferrugem do colmo.

## Características Fenológicas

### Ciclo Precoce

	RS	SC <sup>1</sup>	PR		
			Norte	Oeste <sup>2</sup>	Sul <sup>3</sup>
Emergência-Grão leitoso <sup>4</sup> (dias)	110-139	95-115	104	98	133
Emergência-Maturação <sup>5</sup> (dias)	125-155	154	132	122	175

<sup>1</sup> Planalto Catarinense

<sup>2</sup> Centro-Oeste do Paraná

<sup>3</sup> Centro-Sul do Paraná

<sup>4</sup> Panículas mais precoces com grão leitoso

<sup>5</sup> Panículas mais precoces com grão maduro (seco) e as intermediárias com grão ceráceo

### Estatura Alta

	RS	SC	PR	
			Norte	Centro-Sul
Altura de planta (cm)	113	125	149	113