



# **Sistemas 9 de Produção**

ISSN 1677-8499  
Outubro, 2005

## **Tecnologias de Produção de Soja Região Central do Brasil 2006**



*Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária  
Centro Nacional de Pesquisa de Soja  
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento*

ISSN 1677-8499  
Outubro, 2005

# **Sistemas de Produção 9**

## **Tecnologias de Produção de Soja - Região Central do Brasil 2006**

Londrina, PR  
2005

Exemplares desta publicação podem ser adquiridos na:

**Embrapa Soja**

Rodovia Carlos João Strass - Acesso Orlando Amaral

Caixa Postal 231

86001-970 - Londrina, PR

Fone: (43) 3371-6000 - Fax: 3371-6100

Home page: <http://www.cnpso.embrapa.br>

e-mail (sac): [sac@cnpso.embrapa.br](mailto:sac@cnpso.embrapa.br)

**Comitê de Publicações da Embrapa Soja**

Presidente: *João Flávio Veloso Silva*  
Secretária executiva: *Regina Maria Villas Bôas de Campos Leite*  
Membros: *Alexandre Magno Brighenti dos Santos*  
*Antonio Ricardo Panizzi*  
*Clara Beatriz Hoffmann-Campo*  
*Décio Luiz Gazzoni*  
*George Gardner Brown*  
*Ivan Carlos Corso*  
*Léo Pires Ferreira*  
*Waldir Pereira Dias*

Coordenador de editoração: *Odilon Ferreira Saraiva*

Normalização bibliográfica: *Ademir Benedito Alves de Lima*

Editoração eletrônica: *Neide Makiko Furukawa*

Capa: *Camila Giraldi*

**1ª Edição**

1ª impressão 10/2005: tiragem: 5000 exemplares

**Todos os direitos reservados.**

A reprodução não autorizada desta publicação, no todo ou em parte, constitui violação dos direitos autorais (Lei nº 9.610).

---

Tecnologias de produção de soja - região central do Brasil  
- 2006. - Londrina: Embrapa Soja: Embrapa Cerrados:  
Embrapa Agropecuária Oeste, 2005.  
220p. ; 21cm. - (Sistemas de Produção / Embrapa  
Soja, ISSN 1677-8499; n.9)

1. Soja-Pesquisa-Brasil. 2. Soja-Tecnologia-Brasil.  
3. Soja-Produção- Brasil. I. Título. II. Série.

CDD: 633.3409817

## ***Apresentação***

No agronegócio soja, o gerenciamento eficiente, através da indicação de tecnologias que visam reduzir riscos e custos e aumentar produtividade, tem especial importância, possibilitando ao profissional da área a participação em mercados cada vez mais globalizados e competitivos.

Pela sua abrangência e representação institucional, as **Tecnologias de Produção de Soja - Região Central do Brasil - 2006** são o resultado do esforço conjunto realizado pelas Instituições de Pesquisa, Ensino e Extensão Rural que têm contribuído para o aperfeiçoamento e o desenvolvimento da agropecuária na região central do Brasil. As informações aqui contidas foram atualizadas com base nas discussões durante a XXVII Reunião de Pesquisa de Soja da Região Central do Brasil, realizada no Aguativa Resort, em Cornélio Procópio, PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2005, e são fruto da participação efetiva dessas instituições nesse evento.

Esta publicação destina-se a profissionais da área da Assistência Técnica e Extensão Rural, atuando em instituições oficiais e empresas privadas do agronegócio da soja. Constitui-se em um conjunto de informações que visam subsidiar o desenvolvimento sustentável da cultura da soja na região central do Brasil, cabendo aos técnicos locais fazer os necessários ajustes e as adaptações do conteúdo aqui apresentado.

A Embrapa Soja e todas as instituições participantes esperam, assim, continuar contribuindo na busca de aumentos da produção e da economia desta cultura no Brasil.

***Vania Beatriz Rodrigues Castiglioni***

Chefe Geral  
Embrapa Soja

***João Flavio Veloso Silva***

Chefe Adjunto de Pesquisa e  
Desenvolvimento  
Embrapa Soja

***Roberto Teixeira Alves***

Chefe Geral  
Embrapa Cerrados

***Mario Artemio Urchei***

Chefe Geral  
Embrapa Agropecuária Oeste

## ***Instituições Participantes Credenciadas e/ou que Apresentaram Trabalhos na XXVII RPSRCB***

- ♦ Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios - APTA
- ♦ AGENCIARURAL
- ♦ Associação Nacional de Defesa Vegetal - ANDEF
- ♦ Associação Nacional de Produtores e Importadores de Inoculantes - ANPII
- ♦ Bayer Crop Science
- ♦ Centro Tecnológico de Pesquisas Agropecuárias Ltda - CTPA
- ♦ Cooperativa Agrícola Castrolanda
- ♦ Cooperativa Agropecuária Mista de Programa de Assentamento Dirigido do Alto Paranaíba - COOPADAP
- Cooperativa Central Agropecuária de Desenvolvimento Tecnológico e Econômico Ltda - COODETEC
- ♦ Embrapa Agropecuária Oeste
- ♦ Embrapa Amazônia Oriental
- ♦ Embrapa Arroz e Feijão
- ♦ Embrapa Cerrados
- ♦ Embrapa Roraima
- ♦ Embrapa Soja
- ♦ Embrapa Transferência de Tecnologia
- ♦ Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola S.A. - EBDA
- ♦ Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais - EMATER-MG
- ♦ Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - EPAMIG
- ♦ Empresa Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural - EMATER-PR
- ♦ Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" - ESALQ/USP
- ♦ Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias - FCAV/UNESP

- ♦ Faculdade de Ciências Agronômicas - FCA/UNESP
- ♦ Faculdade de Engenharia Agrícola - FEAGRI/UNICAMP
- ♦ Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária - FAPA
- ♦ Fundação Bahia
- ♦ Fundação Centro de Experimentação e Pesquisa Fecotrigo - Fundacep Fecotrigo
- ♦ Fundação Faculdade de Agronomia "Luiz Meneghel" - FFALM
- ♦ Fundação Medridional
- ♦ Fundação MS
- ♦ Fundação Rio Verde
- ♦ Fundação Universidade do Tocantins - UNITINS
- ♦ Fundação Universidade Estadual de Londrina - FUEL
- ♦ Fundação Vegetal
- ♦ Instituto Agronômico de Campinas - IAC
- ♦ Instituto Agronômico do Paraná - IAPAR
- ♦ Instituto Biológico - IB
- ♦ Japan International Research Center for Agricultural Sciences - JIRCAS
- ♦ Monsanto do Brasil Ltda
- ♦ Nidera Sementes Ltda
- ♦ Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná - Seab
- ♦ Sementes Selecta
- ♦ Stoller do Brasil Ltda
- ♦ Tecnologia Agropecuária Ltda - TAGRO
- ♦ Universidade de Marília - UNIMAR
- ♦ Universidade de Rio Verde - FESURV
- ♦ Universidade Estadual de Maringá - UEM
- ♦ Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG
- ♦ Universidade Federal de Goiás - UFG
- ♦ Universidade Federal de Uberlândia - UFU
- ♦ Universidade Federal de Viçosa - UFV

## *Sumário*

<b>1</b>	<b>Exigências Climáticas</b> .....	11
1.1	Exigências hídricas .....	11
1.2	Exigências térmicas e fotoperiódicas .....	12
<b>2</b>	<b>Rotação de Culturas</b> .....	15
2.1	Seleção de espécies para compor esquemas de rotação .....	16
2.2	Planejamento da propriedade .....	17
2.3	Sugestão de um esquema de rotação de culturas .....	18
<b>3</b>	<b>Manejo do Solo</b> .....	21
3.1	Sistema plantio direto .....	21
3.2	Preparo do solo .....	29
3.3	Alternância do uso de implementos no preparo do solo .....	33
3.4	Rompimento da camada compactada .....	33
<b>4</b>	<b>Correção e Manutenção da Fertilidade do Solo</b> .....	35
4.1	Amostragem e análise do solo .....	35
4.2	Acidez do solo .....	35
4.3	Calagem .....	37
4.4	Calagem no sistema de semeadura direta .....	42
4.5	Qualidade e uso do calcário .....	43
4.6	Correção da acidez subsuperficial .....	43
4.7	Exigências minerais e adubação para a cultura da soja .....	44
4.8	Adubação .....	46
<b>5</b>	<b>Cultivares</b> .....	59

<b>6</b>	<b>Tecnologia de Sementes e Colheita</b> .....	89
6.1	Qualidade da semente .....	89
6.2	Armazenamento das sementes .....	90
6.3	Padronização da nomenclatura do tamanho das sementes, após classificação por tamanho .....	93
6.4	Tratamento de sementes com fungicidas .....	93
6.5	Seleção do local para produção de sementes .....	98
6.6	Avaliação da qualidade na produção de sementes - DIACOM (Diagnóstico Completo da Qualidade da Semente de Soja) .....	98
6.7	Metodologia alternativa para o teste de germinação de sementes de soja .....	99
6.8	Remoção de torrões para prevenir a disseminação do nematóide de cisto .....	100
6.9	Colheita .....	101
<b>7</b>	<b>Inoculação das Sementes com Bradyrhizobium</b> .....	105
7.1	Introdução .....	105
7.2	Qualidade e quantidade dos inoculantes .....	105
7.3	Aplicação de fungicidas às sementes junto com o inoculante .....	107
7.4	Aplicação de micronutrientes nas sementes .....	108
7.5	Aplicação de fungicidas e micronutrientes nas sementes, junto com o inoculante .....	109
7.6	Inoculação em áreas com cultivo anterior de soja .....	109
7.7	Inoculação em áreas de primeiro cultivo com soja .....	109
7.8	Nitrogênio mineral .....	110
<b>8</b>	<b>Instalação da Lavoura</b> .....	111
8.1	Umidade e temperatura do solo .....	111
8.2	Cuidados na semeadura .....	111
8.3	Época de semeadura .....	113

8.4	Diversificação de cultivares .....	114
8.5	População e densidade de semeadura .....	114
8.6	Cálculo da quantidade de sementes e regulagem da semeadora .....	115
<b>9</b>	<b>Controle de Plantas Daninhas .....</b>	<b>119</b>
	Informações importantes: .....	135
	Semeadura direta .....	136
	Manejo de plantas daninhas na soja RR (Roundup Ready) ....	137
	Disseminação .....	138
	Resistência .....	139
	Dessecação em pré-colheita da soja .....	139
	Manuseio de herbicidas e descarte de embalagens .....	140
<b>10</b>	<b>Manejo de Insetos-Pragas .....</b>	<b>141</b>
10.1	Espécies de insetos que atacam a soja .....	144
10.2	Níveis de dano para tomada de decisão de controle .....	145
10.3	Medidas de controle .....	145
10.4	Pragas de difícil controle .....	155
10.5	Manuseio de inseticidas e descarte de embalagens .....	160
<b>11</b>	<b>Doenças e Medidas de Controle .....</b>	<b>163</b>
11.1	Considerações gerais .....	163
11.2	Doenças identificadas no Brasil .....	164
11.3	Principais doenças e medidas de controle .....	167
11.4	Manuseio de fungicidas e descarte de embalagem .....	213
<b>12</b>	<b>Retenção Foliar e Haste Verde .....</b>	<b>215</b>
<b>13</b>	<b>Literatura Citada .....</b>	<b>217</b>

# 1

## Exigências Climáticas

---

### 1.1 Exigências hídricas

A água constitui aproximadamente 90% do peso da planta, atuando em, praticamente, todos os processos fisiológicos e bioquímicos. Desempenha a função de solvente, através do qual gases, minerais e outros solutos entram nas células e movem-se pela planta. Tem, ainda, papel importante na regulação térmica da planta, agindo tanto no resfriamento como na manutenção e distribuição do calor.

A disponibilidade de água é importante, principalmente, em dois períodos de desenvolvimento da soja: germinação-emergência e floração-enchimento de grãos. Durante o primeiro período, tanto o excesso quanto o déficit de água são prejudiciais à obtenção de uma boa uniformidade na população de plantas. A semente de soja necessita absorver, no mínimo, 50% de seu peso em água para assegurar boa germinação. Nessa fase, o conteúdo de água no solo não deve exceder a 85% do total máximo de água disponível e nem ser inferior a 50%.

A necessidade de água na cultura da soja vai aumentando com o desenvolvimento da planta, atingindo o máximo durante a floração-enchimento de grãos (7 a 8 mm/dia), decrescendo após esse período. Déficits hídricos expressivos, durante a floração e o enchimento de grãos, provocam alterações fisiológicas na planta, como o fechamento estomático e o enrolamento de folhas e, como consequência, causam a queda prematura de folhas e de flores e abortamento de vagens, resultando, por fim, em redução do rendimento de grãos.

A necessidade total de água na cultura da soja, para obtenção do máximo rendimento, varia entre 450 a 800 mm/ciclo, dependendo das condições climáticas, do manejo da cultura e da duração do ciclo.

Para minimizar os efeitos do déficit hídrico, indica-se semear apenas cultivares adaptadas à região e à condição de solo; semear em época

recomendada e de menor risco climático; semear com adequada umidade em todo o perfil do solo; e adotar práticas que favoreçam o armazenamento de água pelo solo. A irrigação é medida eficaz porém de custo elevado.

## 1.2 Exigências térmicas e fotoperiódicas

A soja melhor se adapta a temperaturas do ar entre 20°C e 30°C; a temperatura ideal para seu crescimento e desenvolvimento está em torno de 30°C.

Sempre que possível, a semeadura da soja não deve ser realizada quando a temperatura do solo estiver abaixo de 20°C porque prejudica a germinação e a emergência. A faixa de temperatura do solo adequada para semeadura varia de 20°C a 30°C, sendo 25°C a temperatura ideal para uma emergência rápida e uniforme.

O crescimento vegetativo da soja é pequeno ou nulo a temperaturas menores ou iguais a 10°C. Temperaturas acima de 40°C têm efeito adverso na taxa de crescimento, provocam distúrbios na floração e diminuem a capacidade de retenção de vagens. Esses problemas se acentuam com a ocorrência de *déficits* hídricos.

A floração da soja somente é induzida quando ocorrem temperaturas acima de 13°C. As diferenças de data de floração, entre anos, apresentadas por uma cultivar semeada numa mesma época, são devido às variações de temperatura. Assim, a floração precoce ocorre, principalmente, em decorrência de temperaturas mais altas, podendo acarretar diminuição na altura de planta. Esse problema pode se agravar se, paralelamente, houver insuficiência hídrica e/ou fotoperiódica durante a fase de crescimento. Diferenças de data de floração entre cultivares, numa mesma época de semeadura, são devido, principalmente, à resposta diferencial das cultivares ao comprimento do dia (fotoperíodo).

A maturação pode ser acelerada pela ocorrência de altas temperaturas. Quando vêm associadas a períodos de alta umidade, as altas temperatu-

ras contribuem para diminuir a qualidade da semente e, quando associadas a condições de baixa umidade, predispõem a semente a danos mecânicos durante a colheita. Temperaturas baixas na fase da colheita, associadas a período chuvoso ou de alta umidade, podem provocar atraso na data de colheita, bem como haste verde e retenção foliar.

A adaptação de diferentes cultivares a determinadas regiões depende, além das exigências hídricas e térmicas, de sua exigência fotoperiódica. A sensibilidade ao fotoperíodo é característica variável entre cultivares, ou seja, cada cultivar possui seu fotoperíodo crítico, acima do qual o florescimento é atrasado. Por isso, a soja é considerada planta de dia curto. Em função dessa característica, a faixa de adaptabilidade de cada cultivar varia à medida que se desloca em direção ao norte ou ao sul. Entretanto, cultivares que apresentam a característica "período juvenil longo" possuem adaptabilidade mais ampla, possibilitando sua utilização em faixas mais abrangentes de latitudes (locais) e de épocas de semeadura.



# 2

## Rotação de Culturas

---

A monocultura ou mesmo o sistema contínuo de sucessão do tipo trigo-soja ou milho safrinha-soja, tende a provocar a degradação física, química e biológica do solo e a queda da produtividade das culturas. Também proporciona condições mais favoráveis para o desenvolvimento de doenças, pragas e plantas daninhas. Nas regiões dos Cerrados predomina a monocultura de soja entre as culturas anuais. Há a necessidade de introduzir, no sistema agrícola, outras espécies, de preferência gramíneas, como milho, pastagem e outras.

A rotação de culturas consiste em alternar, anualmente, espécies vegetais, numa mesma área agrícola. As espécies escolhidas devem ter, ao mesmo tempo, propósitos comercial e de recuperação do solo.

As vantagens da rotação de culturas são inúmeras. Além de proporcionar a produção diversificada de alimentos e outros produtos agrícolas, se adotada e conduzida de modo adequado e por um período suficientemente longo, essa prática melhora as características físicas, químicas e biológicas do solo; auxilia no controle de plantas daninhas, doenças e pragas; repõe matéria orgânica e protege o solo da ação dos agentes climáticos e ajuda a viabilização do Sistema de Semeadura Direta e dos seus efeitos benéficos sobre a produção agropecuária e sobre o ambiente como um todo.

Para a obtenção de máxima eficiência, na melhoria da capacidade produtiva do solo, o planejamento da rotação de culturas deve considerar, preferencialmente, plantas comerciais e, sempre que possível, associar espécies que produzam grandes quantidades de biomassa e de rápido desenvolvimento, cultivadas isoladamente ou em consórcio com culturas comerciais.

Nesse planejamento, é necessário considerar que não basta apenas estabelecer e conduzir a melhor seqüência de culturas, dispondo-as nas diferentes glebas da propriedade. É necessário que o agricultor utilize

todas as demais tecnologias à sua disposição, entre as quais destacam-se: técnicas específicas para controle de erosão; calagem, adubação; qualidade e tratamento de sementes, época e densidade de semeadura, cultivares adaptadas, controle de plantas daninhas, pragas e doenças.

## **2.1 Seleção de espécies para compor esquemas de rotação**

Um esquema de rotação deve ter flexibilidade, de modo a atender as particularidades regionais e as perspectivas de comercialização dos produtos.

O uso da rotação de culturas conduz à diversificação das atividades na propriedade, possibilitando estabelecer esquemas que envolvam apenas culturas anuais, tais como: soja, milho, arroz, sorgo, algodão, feijão e girassol, ou de culturas anuais e pastagem. Em ambos os casos, o planejamento da propriedade a médio e longo prazos faz-se necessário para que a implementação seja exequível e economicamente viável.

As espécies vegetais envolvidas na rotação de cultura, devem ser consideradas do ponto de vista de sua exploração comercial ou destinadas somente à cobertura do solo e adubação verde. Opções de espécies para sucessão e rotação de cultura envolvendo a soja são apresentadas no Capítulo 3.

A escolha da cobertura vegetal do solo deve, sempre que possível, ser feita no sentido de obter grande quantidade de biomassa. Plantas forrageiras, gramíneas e leguminosas, anuais ou semiperenes são apropriadas para essa finalidade. Além disso, deve-se dar preferência a plantas fixadoras de nitrogênio, com sistema radicular profundo e abundante, para promover a reciclagem de nutrientes.

A seleção de espécies deve basear-se na diversidade botânica. Plantas com diferentes sistemas radiculares, hábitos de crescimento e exigências nutricionais podem ter efeito na interrupção dos ciclos de pragas e doenças, na redução de custos e no aumento do rendimento da cultura princi-

pal (soja). As principais opções são milho, sorgo, milheto (principal espécie cultivada em sucessão: safrinha) e, em menor escala, o girassol.

Para a recuperação de solos degradados, indicam-se espécies que produzam grande quantidade de massa verde e tenham abundante sistema radicular. Para isso, lançar mão de consorciação de culturas comerciais e leguminosas, como por exemplo, milho-guandu, ou de mistura de culturas para cobertura do solo, como por exemplo, braquiária + milheto, e seqüências de culturas de grande potencial para produção de biomassa. Para estabelecer o consórcio milho-guandu, semear milho precoce em setembro-outubro e, cerca de 30 dias após a emergência do milho, semear o guandu nas entrelinhas do milho.

Em áreas onde ocorre o cancro da haste da soja, o guandu e o tremoço não devem ser cultivados, antecedendo a soja. O guandu, apesar de não mostrar sintomas da doença durante o estágio vegetativo, reproduz o patógeno nos restos de cultivo. Desse modo, após o consórcio milho-guandu, usar uma cultivar de soja resistente ao cancro da haste. O tremoço é altamente suscetível ao cancro da haste.

Em áreas infestadas com nematóides de galhas da soja, não devem ser usados tremoço e lab lab, por serem hospedeiros e fonte de inóculo desse patógeno.

## 2.2 Planejamento da propriedade

A rotação de culturas envolve o cultivo de diferentes espécies numa mesma safra e, portanto, aumenta o número e a complexidade tarefas na propriedade. Exige o planejamento do uso do solo segundo princípios básicos, onde deve ser considerada a aptidão agrícola de cada gleba.

A área destinada à implantação dos sistemas de rotação deve ser dividida em tantas glebas, ou piquetes, quantos forem os anos de rotação. Após essa definição, estabelecer o processo de implantação sucessivamente, ano após ano, nos diferentes talhões, previamente, determinados. A execução do planejamento deve ser gradativa para não causar trans-

tornos organizacionais ou econômicos ao produtor, devendo ser iniciada em uma parte da propriedade e ir anexando novas glebas até que toda a área esteja incluída no esquema de rotação.

### **2.3 Sugestão de um esquema de rotação de culturas**

Com base em observações locais no sul do Maranhão e de acordo com as possibilidades dos cultivos das culturas componentes dos sistemas de rotação, sugere-se, ainda que preliminarmente, um esquema de rotação a ser conduzido ao longo de um ciclo de oito anos (Tabela 2.1). Em cada talhão cultiva-se a soja por dois anos contínuos, seguido por dois anos do cultivo de outras culturas (milho, arroz, algodão e sorgo). Eventualmente, pode-se ter três anos com soja, no máximo. Maior número de anos implicará em problemas mais sérios com pragas e doenças.

As proporções de culturas, dentro da rotação, poderão ser alteradas em função das necessidades.

**Tabela 2.1.** Sugestão para rotação de culturas com 50% de soja no sul do Maranhão.

Ano Talhão	1º		2º		3º		4º		5º		6º		7º		8º	
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
1	AR/FJ		PS <sup>1</sup> /MT		SJ/MS		SJ/PS		AL <sup>2</sup> /PS		ML/MT <sup>3</sup>		SJ/PS		SJ/PS <sup>+</sup>	
2			AR/FJ		PS <sup>1</sup> /MT		SJ/MS		SJ/PS		AL <sup>2</sup> /PS		ML/MT <sup>3</sup>		SJ/PS	
3					AR/FJ		PS <sup>1</sup> /MT		SJ/MS		SJ/PS		AL <sup>2</sup> /PS		ML/MT <sup>3</sup>	
4							AR/FJ		PS <sup>1</sup> /MT		SJ/MS		SJ/PS		AL <sup>2</sup> /PS	
5									AR/FJ		PS <sup>1</sup> /MT		SJ/MS		SJ/PS	
6											AR/FJ		PS <sup>1</sup> /MT		SJ/MS	
7													AR/FJ		PS <sup>1</sup> /MT	
8															AR/FJ	

Continua...

...Continuação Tabela 2.1

Ano Talhão	9º		10º		11º		12º		13º		14º		15º	
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														

A = Primeira Cultura (outono/inverno): 50% Soja (SJ); 12,5% Milho (ML); 12,5% Algodão (AL); 12,5% Pousio (PS); 12,5% Arroz (AR) = 87,5% Grãos.

B = Segunda Cultura (Safrinha ou primavera/verão): 12,5% Feijão (FJ); 25,0% Milheto (MT); 12,5% Milho Safrinha (MS); 50,0% Pousio (PS) = 25% Grãos.

<sup>1</sup> O Pousio pode ser substituído por Milho (25%) ou Soja (62,5%).

<sup>2</sup> O Algodão pode ser substituído por Milho ou Soja ou Arroz (25%).

<sup>3</sup> O Milheto pode ser substituído por Girassol (?) ou outra cultura safrinha ou cobertura vegetal.



# 3

## Manejo do Solo

---

O manejo do solo consiste num conjunto de operações realizadas com objetivos de propiciar condições favoráveis à sementeira, ao desenvolvimento e à produção das plantas cultivadas, por tempo ilimitado. Para que esses objetivos sejam atingidos, é imprescindível a adoção de diversas práticas, dando-se prioridade ao uso do Sistema Plantio Direto visto que envolve, simultaneamente, todas as boas práticas conservacionistas. Alternativamente justificado, poderão ser utilizadas práticas racionais de preparo do solo.

### 3.1 Sistema plantio direto

Trata-se de sistema de produção conservacionista, que se contrapõe ao sistema tradicional de manejo. Envolve o uso de técnicas para produzir, preservando a qualidade ambiental. Fundamenta-se na ausência de preparo do solo e na cobertura permanente do terreno através de rotação de culturas.

#### 3.1.1 Requisitos para a implantação

Para a implantação do Sistema Plantio Direto (SPD) é necessário que sejam atendidos alguns requisitos relativos aos recursos humanos, técnicos e de infra-estrutura, como os listados a seguir.

##### 3.1.1.1 Conscientização

O sistema de produção de soja na região central do Brasil, algumas vezes ainda, tem como forma de preparo do solo o uso continuado de grades de discos, com várias operações anuais. Como resultado, ocorre degradação de sua estrutura, com formação de camadas compactadas, encrostamento superficial e perdas por erosão.

O SPD pode ser a melhor opção para diminuir a maioria dos problemas antes apontados, pois, o uso contínuo das tecnologias que compõem o SPD proporcionam efeitos significativos na conservação e na melhoria do solo, da água, no aproveitamento dos recursos e insumos como os fertilizantes, na redução dos custos de produção, na estabilidade de produção e nas condições de vida do produtor rural e da sociedade.

Para que esses benefícios aconteçam, tanto os agricultores, como a assistência técnica, devem estar predispostos a mudanças, conscientes de que o sistema é importante para alcançar êxito e sustentabilidade na atividade agrícola.

### **3.1.1.2 Levantamento dos recursos**

O conhecimento detalhado da propriedade agrícola é essencial para obtenção de sucesso no SPD. Para tanto, é necessário o levantamento dos seguintes recursos:

**Solos:** Coletar e organizar informações referentes ao tipo de solo, à fertilidade, à presença de camadas compactadas, à distribuição e espécies de plantas daninhas, à topografia, à ocorrência de erosão, às práticas conservacionistas existentes, às vias de acesso, à drenagem, aos córregos, aos açudes, etc.

**Plantas daninhas:** O levantamento e o mapeamento da ocorrência de plantas daninhas será muito útil, para definir o herbicida a ser utilizado e a programação das aplicações dos mesmos.

**Máquinas e equipamentos:** No SPD, é essencial a existência de pulverizador de herbicidas devidamente equipado com bicos adequados para as diferentes condições e controladores de pressão. O uso de equipamentos de avaliação das condições climáticas é também muito útil nesse caso. Quanto às semeadoras, existem disponíveis no mercado vários modelos específicos para o SPD. No entanto, na fase inicial de implantação do sistema, podem-se utilizar semeadoras tradicionais com adaptações, fazendo com que os agricultores reduzam as despesas.

**Humanos:** Para a execução do SPD, a mão-de-obra deverá estar cons-

cientizada dos princípios do sistema e adequadamente informada quanto ao uso das tecnologias que o compõem. São necessários treinamentos, especialmente para os operadores de máquinas, quanto ao uso de semeadoras e pulverizadores e tecnologia de aplicação (características de bicos, horário de aplicação, etc.) de defensivos, além de conhecimentos sobre plantas daninhas e herbicidas. O treinamento da mão-de-obra deve ser planejado de forma que, no momento de realizar as operações, haja conhecimento suficiente para realizar as ações de forma adequada. A participação do produtor e da assistência técnica em associações ou grupos de troca de informações e experiências como Grupo de Plantio Direto, Clube Amigos da Terra, etc, são importantes para facilitar e impulsionar a adoção do SPD.

O manuseio de tais informações deve gerar mapas e/ou planilhas de uso e da situação atual da propriedade, a serem utilizados como base, para o planejamento das atividades a serem implementadas.

### **3.1.1.3 Planejamento**

Em qualquer atividade, o planejamento é fator importante para reduzir erros e riscos e aumentar as chances de sucesso. São etapas do planejamento: a) análise dos resultados e produtos do levantamento dos recursos humanos e materiais; b) elaboração e interpretação de mapas, croquis e esquemas de trabalho; c) divisão da fazenda em glebas e a seleção cronológica das mesmas para adoção do SPD, tendo a rotação de culturas como tecnologia essencial. Para isso, deve-se dividir a propriedade em glebas ou talhões, tomando como base as informações obtidas nos levantamentos, principalmente de fertilidade, topografia, vias de acesso, etc. Não existem padrões estabelecidos de tamanho das áreas, devendo o critério técnico prevalecer nessa decisão. É importante, ao adotar o SPD, fazê-lo apenas em parte da propriedade, iniciando pelas melhores glebas, para familiarizar-se com as novas tecnologias e elevar as chances de sucesso. Incluir novas glebas de forma gradual, até abranger o total da propriedade, mesmo que vários anos sejam necessários; e d) elaboração de cronograma de ações, onde devem ser organizadas, para cada gleba, as ações para correções de acidez e fertilidade, operações

de incorporação de adubos e corretivos, descompactação, pulverizações, manejo de coberturas vegetais, semeadura, sucessão de culturas, etc.

O cultivo da soja em SPD, em áreas de campo bruto, com correções superficiais e sem incorporação, embora haja alguns exemplos de sucesso no Rio Grande do Sul e no Paraná, ainda não está indicada para as condições dos Cerrados, estando em fase de estudos e experimentações.

### **3.1.2 Cobertura do solo**

O Sistema de Plantio Direto pressupõe a cobertura permanente do solo que, preferencialmente, deve ser de culturas comerciais ou, quando não for possível, culturas de cobertura do solo. Tal cobertura deverá resultar do cultivo de espécies que disponham de certos atributos, como: produzir grande quantidade de massa seca, possuir elevada taxa de crescimento, ter certa resistência à seca e ao frio, não infestar áreas, ser de fácil manejo, ter sistema radicular vigoroso e profundo, ter elevada capacidade de reciclar nutrientes, ser de fácil produção de sementes, apresentam elevada relação C/N, entre outras.

A pequena produção de palha pela soja, principal cultura dos Cerrados, aliada à rápida decomposição dos seus resíduos, pode tornar-se grande à viabilização do SPD, especialmente quando essa leguminosa é cultivada como monocultura. Para contornar essa dificuldade, a soja deve compor sistemas de rotação de culturas adequadamente planejados. Com isso haverá permanente cobertura e suficiente reposição de palhada sobre a superfície do solo, viabilizando o SPD.

#### **3.1.2.1 Espécies para a cobertura do solo**

As indicações das espécies a serem cultivadas para cobertura e produção de palha devem ser regionalizadas o máximo possível.

##### **♦ Centro-Sul de Mato Grosso do Sul**

Nessa região, as condições climáticas são favoráveis ao cultivo o ano todo, incluindo várias culturas de inverno, possibilitando um bom número

de opções para a cobertura do solo, atendendo satisfatoriamente a um programa de rotação de culturas no SPD.

Outono - a semeadura das culturas de outono/inverno, em sucessão às culturas de verão, vai do início de abril até meados de maio, podendo ir até o final de maio, se houver boa disponibilidade de água no solo. São indicadas a aveia, o nabo forrageiro, a ervilhaca peluda, o centeio, a ervilha forrageira e outras produtoras de grãos como o trigo, o milho (safrinha), o sorgo, o triticale, a aveia branca, o girassol, o feijão e a canola. Resultados de pesquisa apontam melhores rendimentos com as seguintes sucessões, por ordem preferencial: soja após aveia, trigo, triticale, ou centeio; e milho após nabo forrageiro, ervilhaca peluda, canola, aveia.

Primavera - neste caso, indica-se o uso de espécies, principalmente para cobertura viva e produção de palha (milheto comum, milheto africano, sorgo e *Crotalaria juncea*). Em pequena escala, é possível cultivar o girassol, visando a produção de grãos. O milheto destaca-se como uma das principais culturas, devido ao seu rápido desenvolvimento vegetativo, pois atinge 5 a 8 t/ha de matéria seca aos 45 a 60 dias após a semeadura, proporcionando excelente cobertura do solo. O uso dessas alternativas, e principalmente do milheto, visa a reposição de palhada em área de plantio direto com deficiência de cobertura. Essa opção exige uma programação, visto que, em seqüência, vem a cultura da soja cuja semeadura ocorrerá já em final da sua época indicada (final de novembro a início de dezembro), praticamente inviabilizando a semeadura da safrinha de milho. Em sucessão ao girassol e à *Crotalaria juncea*, é indicada a semeadura de milho.

Safrinha - consiste na semeadura em época imediatamente posterior à indicada para a cultura, na safra normal, resultando geralmente em produtividades inferiores às normalmente obtidas. A principal cultura utilizada é o milho, que, nesse caso, deve ser semeado logo após a colheita da soja até, no máximo, 15 de março, quando esperam-se produções relativamente razoáveis de grãos e boa quantidade de palha. O girassol também pode ser cultivado nesse período, visando produção de grãos e supressão de plantas daninhas, podendo ser semeado até o final de março. A "safrinha", mesmo que feita com espécie diferente da cultivada anteriormente, na época normal, deve ser utilizada com cuidado, visto que pode

transformar-se em meio de propagação e disseminação de doenças e pragas, inviabilizando a própria cultura comercial principal. O cultivo do sorgo para grãos ou forragem, também é viável, mas para a produção de grãos, a semeadura vai até o final de fevereiro. O milheto é semeado nessa época, principalmente para produção de sementes, e sua semeadura vai até 20 de março.

Verão - o cultivo de leguminosas solteiras no verão apresenta excelentes resultados na recuperação e/ou no melhoramento do solo, mas isso geralmente implica na impossibilidade de cultivar soja ou milho em sua melhor época. Algumas tentativas de consorciação de leguminosas (mucuna-preta, calopogônio, feijão-bravo, crotálarias, etc.) com milho, arroz e girassol foram desenvolvidas na região e adaptam-se perfeitamente para consórcio com milho: mucuna preta, guandú, feijão-bravo do ceará e feijão de porco. O arroz com calopogônio também é uma forma de consórcio tecnicamente viável. Os consórcios não têm despertado interesse dos agricultores, devido algumas dificuldades de manejo e condução das culturas consorciadas, mas são perfeitamente viáveis nas pequenas propriedades.

O milho com guandú ou calopogônio são consórcios que permitem a mecanização normal das culturas envolvidas, adaptando-se para áreas maiores, como pode ser visto no capítulo sobre rotação de culturas.

Pastagens - a semeadura de soja sobre pastagem dessecada vem destacando-se como uma interessante forma de adoção do SPD, pois a pastagem apresenta excelentes coberturas viva e morta, contribui para aumentar a matéria orgânica do solo e permite a rotação de culturas. Essa tecnologia consiste na implementação da integração entre lavoura e pastagem, num sistema de elevada produtividade. Já existem alguns resultados de pesquisa disponíveis e experiências de sucesso com produtores na região, que dão suporte à indicação desse sistema de produção. O sistema é indicado para áreas de pastagem ainda com razoável capacidade de suporte de animais e fertilidade do solo, compatível com o cultivo de soja.

♦ Centro-Norte do Mato Grosso do Sul, Chapadões (MS, GO, MT) e Sul do MT

Em função das condições climáticas nessas regiões, a semeadura de espécies para cobertura e produção de palha fica muito limitada. Pode-se, no entanto, utilizar as fases inicial e final das chuvas para a semeadura de espécies visando a cobertura do solo. Em geral, são viáveis as semeaduras realizadas após a colheita das culturas de verão, soja ou milho, aproveitando as últimas chuvas do período e a umidade do solo. Tais semeaduras são chamadas de "safrinha", e as espécies possíveis de serem cultivadas são: o milheto, sorgo, milho, girassol, nabo forrageiro, guandu e outros.

Eventualmente, com a ocorrência de chuvas antecipadas, no final de setembro, parte da área poderá ser semeada com milheto ou sorgo, a serem dessecados antes da semeadura de soja.

#### ♦ Médio-Norte, Centro-Leste do Mato Grosso

A partir de alguns resultados disponíveis para a região de Lucas do Rio Verde, indica-se a semeadura de milheto, sorgo ou milho imediatamente após a colheita da soja (cultivar precoce, de preferência), de modo a permitir um bom estabelecimento das culturas de cobertura com as últimas chuvas do período.

### **3.1.2.2 Manejo de restos de culturas e da cobertura do solo**

Qualquer que seja o sistema adotado para a implantação da cultura principal, a queima dos restos culturais ou das vegetações de cobertura do solo deve ser evitada. Além de reduzir a infiltração de água e aumentar a suscetibilidade à erosão, contribui para a diminuição do teor de matéria orgânica do solo e, conseqüentemente, influi na capacidade da retenção de cátions trocáveis.

Na colheita, o picador deve ser regulado de modo a promover uma trituração mínima dos resíduos. Faz-se, no entanto, indispensável uma perfeita distribuição da palha através da adequada regulagem do espalhador de palha, para facilitar as operações de semeadura e o controle de invasoras através de herbicidas. Para a cultura do milho, no caso de não se usar o picador de palha, e se a palha dificultar a semeadura da cultura posterior,

haverá necessidade de uma operação complementar para picar melhor os resíduos. Para tanto, indica-se a utilização da roçadora, da segadeira, do tarup, do rolo-faca ou triturador.

O manejo das culturas destinadas à proteção, à recuperação do solo e à adubação verde deve ser realizado através do uso da roçadora, da segadeira, do tarup, do rolo-faca ou de herbicidas, durante a fase de florescimento. Embora o rolo-faca seja usado e indicado, deve-se ter em mente que é um implemento que pode causar compactação, devendo ser utilizado quando a umidade do solo for baixa.

O manejo da cobertura do solo, mecânico ou químicos, constitui-se em operação que objetiva matar as plantas, mantendo os restos culturais (palha) sobre a superfície do solo, formando a camada de palha que protege o solo e permite aumentar a eficiência do SPD. As diferentes espécies indicadas apresentam particularidades de manejo, que devem ser conhecidas e utilizadas de modo a obter os melhores resultados, quanto à cobertura do solo, ao controle de ervas, à reciclagem de nutrientes e à facilidade de semeadura da soja. A cultura da aveia preta normalmente pode ser manejada no final da floração e início de formação das primeiras sementes. Se o manejo da aveia for mecânico, principalmente nos anos de maior precipitação, pode ocorrer rebrota e maturação de muitas plantas, fazendo que a mesma seja infestante no ano seguinte, caso seja cultivado o trigo. O nabo forrageiro deve ser manejado na fase final de floração e quando apresentar a formação das primeiras sementes. Essa cultura apresenta elevada taxa de decomposição (relação C/N baixa). Assim, as formas de manejo que fragmentam mais intensamente a massa verde e proporcionam maior contato com o solo resultarão na decomposição mais rápida. Nesse caso, a cobertura do solo será menos duradoura, porém a disponibilização dos nutrientes reciclados se dará antecipadamente. O manejo químico deverá ser efetuado com os herbicidas específicos.

### 3.1.2.3 Sucessão e rotação de culturas

A escolha do melhor sistema, para compor um programa de rotação de culturas, deve levar em conta vários fatores, dentre os quais, o principal objetivo do sistema. Para cobertura do solo e/ou suprimento inicial de

palha, optar por espécies e cultivares que produzam quantidades elevadas de massa seca de relação C:N elevada e que permitam manejo que retarde a decomposição. Considerar também o custo das sementes e o possível retorno financeiro na comercialização dos grãos. Sendo o objetivo minimizar a ocorrência de pragas, nematóides e doenças, considerar o ciclo e os hábitos destes, o tipo de patógeno e o sistema de culturas implantado.

Algumas sucessões, além de melhorar o rendimento da cultura principal, proporcionam condições específicas:

- Aveia preta - Milheto - Soja (para produção de palha).
- Aveia - Soja - Nabo forrageiro - Milho (para elevada reciclagem de nutrientes K<sub>e</sub> e N para o milho).
- Rotação Soja-soja-milho ou soja (2/3) e milho (1/3) (para controle de doenças na soja).
- Nabo forrageiro-milheto na primavera - Soja (boa descompactação superficial do solo, alta produção de palha reciclagem de potássio e controle de invasoras).
- Soja-girassol safrinha - Milho (bom para produtividade do milho e estruturação do solo).

O esquema de rotação deve permitir flexibilidade na mudança das culturas envolvidas, pois além dos aspectos técnicos conhecidos, os aspectos econômicos influenciam e podem variar num curto espaço de tempo. Por isto, é importante conhecer as indicações apresentadas nas Tabelas 3.1 e 3.2. Verificar também no item 2 a sugestão para o Sul do Maranhão.

### 3.2 Preparo do solo

Primeiramente, considerar que SPD é o sistema mais adequado. Em caso de impossibilidade de adotá-lo, considerar que o preparo do solo compreende um conjunto de práticas que, quando usadas racionalmente, podem

**Tabela 3.1.** Sugestões de culturas sucessoras em sistemas de rotação e sucessão de culturas para o Centro-Sul do Mato Grosso do Sul<sup>1</sup>.

Preferencial	Com restrição
..... Soja..... Milheto, girassol, nabo forrageiro, sorgo, trigo, aveia, arroz, milho e ervilhaca peluda	
..... Milho..... Aveia, soja, nabo forrageiro, trigo, girassol, milheto, feijão, sorgo e arroz	
..... Algodão..... Aveia, nabo forrageiro, trigo, soja, milho, sorgo, arroz e milheto	Ervilhaca peluda, feijão e girassol
..... Girassol..... Arroz, milho, milheto, aveia, trigo, nabo forrageiro e sorgo	Soja, algodão e feijão
..... Feijão..... Milho, sorgo, arroz, trigo, milheto e aveia	Algodão, nabo forrageiro, soja e girassol
..... Sorgo..... Girassol, feijão, nabo forrageiro, ervilhaca peluda, mucuna, guandu, soja e aveia	Milho, milheto, arroz e trigo
..... Arroz de sequeiro..... Girassol, nabo forrageiro, guandu, ervilhaca peluda, mucuna, feijão, soja e aveia	Trigo, sorgo, milheto e milho
..... Trigo..... Mucuna, girassol, crotalária, soja, feijão, algodão, milheto, guandu e sorgo	Milho e arroz
..... Aveia..... Todas	Trigo após aveia preta para semente

<sup>1</sup> Adaptado do relato da Comissão de Ecologia, Fisiologia e Práticas Culturais, da publicação: Reunião de Pesquisa de Soja da Região Central do Brasil, 18., 1996: Uberlândia. Ata e Resumos. UFU/DEAGRO, 1997. 446p.

**Tabela 3.2.** Sugestões de culturas antecessoras em sistemas de rotação e sucessão de culturas para o Centro-Sul do Mato Grosso do Sul<sup>1</sup>.

Preferencial	Com restrição
..... Soja .....	
Milho, sorgo, arroz, aveia, milheto, trigo, mucuna, guandu e girassol	Nabo forrageiro, feijão e ervilhaca peluda
..... Milho .....	
Ervilhaca peluda, mucuna, guandu, crotalária, nabo forrageiro, soja, girassol e aveia	Sorgo, arroz, milheto e trigo
..... Algodão .....	
Milho, soja, milheto, trigo e aveia	Nabo forrageiro, girassol, guandu, feijão e ervilhaca peluda
..... Girassol .....	
Milho, soja, sorgo, arroz, milheto, aveia e trigo	Nabo forrageiro, feijão, guandu, ervilhaca peluda e mucuna
..... Feijão .....	
Milho, sorgo, arroz, milheto, aveia e mucuna	Ervilhaca, nabo forrageiro, girassol, algodão, guandu e soja
..... Sorgo .....	
Milho, soja, guandu, aveia, mucuna, crotalária, ervilhaca, trigo e nabo forrageiro	Milheto e arroz
..... Arroz de sequeiro .....	
Nabo forrageiro, mucuna, guandu, soja, ervilhaca peluda, girassol, crotalária, aveia, milho e feijão	Trigo, sorgo e milheto
..... Trigo .....	
Mucuna, guandu, girassol, feijão, crotalária, soja, milho e algodão	Arroz de sequeiro, sorgo e aveia preta para semente
..... Aveia .....	
Todas	Nenhuma

<sup>1</sup> Adaptado do relato da Comissão de Ecologia, Fisiologia e Práticas Culturais, da publicação: Reunião de Pesquisa de Soja da Região Central do Brasil, 18., 1996: Uberlândia. Ata e Resumos. UFU/DEAGRO, 1997. 446p.

permitir preservação do solo e boas produtividades das culturas a baixo custo. Entretanto, quando usadas de maneira incorreta, tais práticas podem levar, rapidamente, o solo às degradações física, química e biológica e, paulatinamente, diminuir o seu potencial produtivo.

É necessário que cada operação seja realizada com implementos adequados. O solo deve ser preparado com o mínimo de movimentação, não implicando isso em diminuição da profundidade de trabalho, mas sim na redução do número de operações, deixando rugosa a superfície do solo e mantendo o máximo de resíduos culturais sobre a superfície.

Em áreas onde o solo foi sempre preparado superficialmente, principalmente no caso de solos distróficos e álicos, o preparo profundo poderá trazer para a superfície a camada de solo não corrigida, contendo alumínio, manganês e ferro em níveis tóxicos e com baixa disponibilidade de fósforo, podendo prejudicar o desenvolvimento das plantas. Nesse caso, é necessário conhecer a distribuição dos nutrientes e o pH no perfil do solo.

O preparo primário do solo (aração, escarificação ou gradagem pesada), deve atingir profundidade adequada ao próprio equipamento. Em substituição à gradagem pesada, deve-se utilizar aração ou esca-rificação. A escarificação, como alternativa de preparo, substitui, com vantagem, a aração e a gradagem pesada, desde que se reduza o número de gradagens niveladoras. Além disso, possibilita a permanência, do máximo possível, de resíduos culturais na superfície, o que é desejável.

O preparo secundário do solo (gradagens niveladoras), se necessário, deve ser feito com o mínimo de operações e próximo da época de semeadura.

As semeadoras, para operarem eficazmente em áreas com preparo mínimo e com resíduos culturais, devem ser equipadas com disco duplo para a colocação da semente e roda reguladora de profundidade para propiciar um pequeno adensamento na linha de semeadura.

O preparo do solo, portanto, deve ser realizado considerando o implemento, a profundidade de trabalho, a umidade adequada e as condições de fertilidade.

A condição ideal de umidade para preparo do solo pode ser detectada

facilmente a campo: um torrão de solo, coletado na profundidade média de trabalho do implemento, submetido a uma leve pressão entre os dedos polegar e indicador, deve desagregar-se sem oferecer resistência.

Quando for usado o arado e a grade, para preparar o solo, considerar como umidade ideal a faixa variável de 60% a 70% da capacidade de campo, para solos argilosos, e de 60% a 80%, para solos arenosos, ou seja, quando o solo estiver na faixa de umidade friável. Quando for usado o escarificador, visando a quebra de camadas compactadas, a faixa ideal de umidade será de 30% a 40% da capacidade de campo, para solos argilosos.

### **3.3 Alternância do uso de implementos no preparo do solo**

O uso excessivo de um mesmo implemento no preparo do solo, operando sistematicamente na mesma profundidade e, principalmente, em condições de solo úmido, tem provocado a formação de camada compactada. A alternância de implementos de preparo do solo, que trabalham a diferentes profundidades e possuam diferentes mecanismos de corte, além da observância do teor adequado de umidade para a movimentação do solo, são de relevante importância para minimizar a sua degradação. Além disso, utilizar alternadamente os implementos de discos e os implementos de dentes.

### **3.4 Rompimento da camada compactada**

A compactação do solo é provocada pela ação e pressão dos implementos de preparo do solo, especialmente quando essas operações são feitas em condições de solo muito úmido, continuamente na mesma profundidade, e quando o tráfego de máquinas agrícolas é intenso. A presença de camada compactada no solo pode acarretar baixa infiltração de água, ocorrência de enxurrada, raízes deformadas, estrutura degradada e resistência à penetração dos implementos de preparo, exigindo maior potência do trator.

Após a identificação do problema, a utilização de pequenas trincheiras possibilita a determinação da profundidade de ocorrência de compactação, através da observação do aspecto morfológico da estrutura do solo, ou da verificação da resistência oferecida pelo solo ao toque com um instrumento pontiagudo qualquer. Normalmente, o limite inferior da camada compactada não ultrapassa 30cm de profundidade.

O rompimento da camada compactada deve ser feito com um implemento que alcance profundidade imediatamente abaixo do seu limite inferior. Podem ser empregados, com eficiência, arado, subsolador ou escarificador, desde que sejam utilizados na profundidade adequada.

O sucesso do rompimento da camada compactada está na dependência de alguns fatores:

- ♦ profundidade de trabalho: o implemento deve ser regulado para operar na profundidade imediatamente abaixo da camada compactada;
- ♦ umidade do solo: no caso de arado, seja de disco ou aiveca, a condição de umidade apropriada é aquela em que o solo está na faixa friável; em solos muito úmidos, há aderência deste nos componentes ativos dos implementos e em solos secos há maior dificuldade de penetração (arado de discos). Para escarificar ou subsolar, a condição apropriada é aquela em que o solo esteja seco. Quando úmido, o solo não sofre descompactação mas amassamento entre as hastes do implemento e selamento dos poros, no fundo e nas laterais do sulco; e
- ♦ espaçamento entre as hastes: quando for usado o escarificador ou o subsolador, o espaçamento entre as hastes determina o grau de rompimento da camada compactada pelo implemento. O espaçamento entre as hastes deverá ser de 1,2 a 1,3 vezes a profundidade de trabalho pretendida.

A efetividade dessa prática está condicionada ao manejo do solo adotado após a descompactação. São indicadas, em seqüência a essa operação, a implantação de culturas com alta produção de massa vegetativa, com alta densidade de plantas e com sistema radicular abundante e agressivo, além de redução na intensidade dos preparos de solo subsequentes.

# 4

## Correção e Manutenção da Fertilidade do Solo

---

### 4.1 Amostragem e análise do solo

Em áreas que não necessitam de calagem, a amostragem para fins de indicação de fertilizantes poderá ser feita logo após a maturação fisiológica da cultura anterior àquela que será instalada. Caso haja necessidade de calagem, a retirada da amostra tem que ser feita de modo a possibilitar que o calcário esteja incorporado pelo menos três meses antes da semeadura da cultura de verão.

Na retirada de amostra do solo com vistas à caracterização da fertilidade, o interesse é pela camada arável do solo que, normalmente, é a mais intensamente alterada, seja por arações e gradagens, seja pela adição de corretivos, fertilizantes e restos culturais. A amostragem deverá, portanto, contemplar essa camada, ou seja, os primeiros 20 cm de profundidade.

No sistema de semeadura direta indica-se que, sempre que possível, a amostragem seja realizada em duas profundidades (0-10 e 10-20 cm), com o objetivo principal de se avaliar a disponibilidade de cálcio, magnésio e a variação da acidez entre as duas profundidades.

As indicações de adubação devem ser orientadas pelos teores dos nutrientes determinados na análise de solo. Na Tabela 4.1 são apresentados os parâmetros para a interpretação da análise de solo.

### 4.2 Acidez do solo

Os nutrientes têm sua disponibilidade determinada por vários fatores, entre eles o valor do pH, medida da concentração (atividade) de íons hidrogênio na solução do solo.

**Tabela 4.1.** Níveis de alguns componentes do solo para efeito da interpretação de resultados de análise química do solo, para a cultura da soja.<sup>1</sup>

Níveis	cmol <sub>c</sub> dm <sup>-3</sup> de solo			g kg <sup>-1</sup>		Saturação na CTC (%) <sup>2</sup>			Relações <sup>2</sup>		
	Al <sup>3+</sup>	Ca <sup>2+</sup>	Mg <sup>2+</sup>	C	M.O.	Ca <sup>2+</sup>	Mg <sup>2+</sup>	K <sup>+</sup>	Ca/Mg	Ca/K	Mg/K
Baixo	<0,02	<2	<0,4	8	<15	<35	<13	<3	<1,5	<8	<3
Médio	0,02-1,5	2-4	0,4-0,8	8-14	15-25	35-50	13-20	3-5	1,5-3,5	8-16	3-6
Alto	>1,5	>4	>0,8	>14	>25	>50	>20	>5	>3,5	>16	>6

<sup>1</sup> Para fósforo (P) e potássio (K) extraído por Mehlich I, verificar nas Tabelas 4.9 e 4.11.

<sup>2</sup> Sfredo et al, 1999.

A Fig. 4.1 ilustra a tendência da disponibilidade dos diversos elementos químicos às plantas, em função do pH do solo. A disponibilidade varia como conseqüência do aumento da solubilidade dos diversos compostos na solução do solo.




Figura 4.1. Relação entre o pH e a disponibilidade dos elementos no solo

### 4.3 Calagem

A avaliação da necessidade de calagem é realizada a partir da interpretação dos resultados da análise da camada 0 a 20 cm do solo.

O cálculo da quantidade de calcário a ser aplicada ao solo pode ser feito segundo duas metodologias básicas de análise do solo:

#### a) Neutralização do $Al^{3+}$ e suprimento de $Ca^{2+}$ e $Mg^{2+}$

Este método é, particularmente, adequado para solos sob vegetação de Cerrados, nos quais ambos os efeitos são importantes.

O cálculo da necessidade de calagem (NC) é feito através da seguinte fórmula:

$$NC \text{ (t ha}^{-1}\text{)} = Al^{3+} \times 2 + [2 - (Ca^{2+} + Mg^{2+})] \text{ (PRNT} = 100\%)$$

## b) Saturação por bases do solo

Este método consiste na elevação da saturação por bases trocáveis para um valor que proporcione o máximo rendimento econômico do uso de calcário.

O cálculo da necessidade de calcário (NC) é feito através da seguinte fórmula:

$$NC \text{ (t ha}^{-1}\text{)} = \frac{(V_2 - V_1) \times T \times f}{100}$$

em que:

$V_1$  = valor da saturação por bases trocáveis do solo, em porcentagem, antes da correção. ( $V_1 = 100 \text{ S/T}$ ) sendo:

$S = Ca^{2+} + Mg^{2+} + K^+$  ( $\text{cmol}_c \text{ dm}^{-3}$ );

$V_2$  = Valor da saturação por bases trocáveis que se deseja;

$T$  = capacidade de troca de cátions,  $T = S + (H+Al^{3+})$  ( $\text{cmol}_c \text{ dm}^{-3}$ );

$f$  = fator de correção do PRNT do calcário  $f = 100/\text{PRNT}$ .

Quando o potássio é expresso em  $\text{mg dm}^{-3}$ , na análise do solo, há necessidade de transformar para  $\text{cmol}_c \text{ dm}^{-3}$  pela fórmula:

$$\text{cmol}_c \text{ dm}^{-3} \text{ de K} = (0,0026) \text{ mg dm}^{-3} \text{ de K}$$

O valor adequado da saturação por bases é variável para cada estado ou região. Para o Estado do Paraná, 70%, para os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, 60%. Nos demais estados da Região Central, formados basicamente por solos sob vegetação de Cerrados, o valor adequado de saturação é de 50%.

## c) Calagem para solos arenosos

Quando se tratar de solos arenosos (teor de argila menor que 20%), a quantidade de calcário a ser utilizada (NC) é dada pelo maior valor encontrado de uma destas duas fórmulas:

$$NC \text{ (t ha}^{-1}\text{)} = (2 \times Al) \times f$$

$$NC \text{ (t ha}^{-1}\text{)} = [2 - (\text{Ca} + \text{Mg})] \times f$$

### 4.3.1 Estado de Minas Gerais

#### a. Correção da acidez superficial

Para o Estado de Minas Gerais, na estimativa da necessidade de calagem (NC) pelo "Método da neutralização da acidez trocável e da elevação dos teores de cálcio e magnésio trocáveis", leva-se em consideração, além das características do solo (Y), as exigências da cultura, considerando-se a máxima saturação por  $\text{Al}^{3+}$  tolerada pela soja (mt), de 20% e a exigência em  $\text{Ca}^{2+} + \text{Mg}^{2+}$  (X) de  $2,0 \text{ cmol}_c \text{ dm}^{-3}$ . Já pelo "Método da saturação por bases" considera-se uma saturação desejada ou esperada (Ve), de 50%.

Pelo primeiro método, o valor de Y pode ser calculado em função do teor de argila (r) ou do fósforo remanescente (P-rem), pelas expressões abaixo, utilizando-se os dados das Tabelas 4.2 e 4.3:

$$Y = c + \frac{(r - a)(d - c)}{(b - a)} \qquad Y = c + \frac{(P \text{ rem} - a)(d - c)}{(b - a)}$$

O valor de Y também pode ser definido de forma contínua, em função do teor de argila (r) ou do valor do fósforo remanescente (P-rem), pelas equações:

$$(1) Y = 0,0302 + 0,06532 r - 0,000257 r^2; \\ R^2 = 0,9996$$

ou

$$(2) Y = 4,002 - 0,125901 P\text{-rem} + 0,001205 P\text{-rem}^2 - 0,00000362 P\text{-rem}^3; \\ R^2 = 0,9998$$

A expressão para cálculo da necessidade de calagem (NC), em  $\text{t ha}^{-1}$ , é:

$$NC = Y \left[ \text{Al}^{3+} - \left( 20 \times \frac{t}{100} \right) \right] + [2 - (\text{Ca}^{2+} + \text{Mg}^{2+})]$$

onde:  $\text{Al}^{3+}$  = alumínio trocável ( $\text{cmol}_c \text{ dm}^{-3}$ )

t = capacidade de troca de cátions efetiva do solo, em  $\text{cmol}_c \text{ dm}^{-3}$

$\text{Ca}^{2+}$  = cálcio trocável ( $\text{cmol}_c \text{ dm}^{-3}$ )

$Mg^{2+}$  = magnésio trocável ( $cmol_c dm^{-3}$ )

Pelo Método da saturação por bases, tem-se:

$$NC = T \times \frac{(50 - Va)}{100}$$

onde: T = CTC a pH 7,0 = soma de bases (SB) + Acidez potencial (H+Al), em  $cmol_c dm^{-3}$ ;

Va = saturação por bases atual do solo, em %.

**Tabela 4.2.** Valores para cálculo da capacidade tampão de acidez do solo (Y), de acordo com a textura.

Solo	Argila		Y			
	(a)	(b)	(c)	(d)		
Arenoso	0	a	15	0,0	a	1,0
Textura média	15	a	35	1,0	a	2,0
Argiloso	35	a	60	2,0	a	3,0
Muito argiloso	60	a	100	3,0	a	4,0

**Tabela 4.3.** Valores para cálculo da capacidade tampão de acidez do solo (Y), de acordo com o valor do fósforo remanescente (P-rem).

P-rem			Y			
(a)	(b)	(c)	(d)			
0	a	4	4,0	a	3,5	
4	a	10	3,5	a	2,9	
10	a	19	2,9	a	2,0	
19	a	30	2,0	a	1,2	
30	a	44	1,2	a	0,5	
44	a	60	0,5	a	0,0	

### b. Correção da acidez subsuperficial

Corresponde à correção da acidez nas camadas abaixo de 20 cm de pro-

fundidade e, para tal, recomenda-se a aplicação de gesso agrícola. A necessidade de gesso (NG) pode ser estimada com base na textura do solo, no valor do P-rem, ou com base na necessidade de calagem.

### b.1. Recomendação com base na textura do solo

A necessidade de gesso para camadas subsuperficiais de 20 cm de espessura, em função do teor de argila pode ser estimada pela fórmula abaixo e de acordo com os dados apresentados na Tabela 4.4.

$$NG = c + \frac{(r - a)(d - c)}{(b - a)}$$

onde: r = teor de argila do solo; em dag kg<sup>-1</sup>

A necessidade de gesso (NG) pode também ser apresentada, de forma contínua, como função do teor de argila (r) em %, pela equação:

$$NG = 0,00034 - 0,002445 r^{0,5} + 0,0338886 r - ,00176366 r^{1,5};$$

$$R^2 = 0,99995$$

**Tabela 4.4.** Valores para cálculo da necessidade de gesso (NG) de acordo com o teor de argila do solo.

Argila			NG		
(a)	(b)	(c)	(d)		
0	a	15	0,0	a	0,4
15	a	35	0,4	a	0,8
35	a	60	0,8	a	1,2
60	a	100	1,2	a	1,6

### b.2. Recomendação com base na determinação do fósforo remanescente

A quantidade de gesso a aplicar (Tabela 4.5), pode também ser estimada em função do valor do fósforo remanescente (P-rem):

$$NG = c + \frac{(P \text{ rem} - a)(c - d)}{(b - a)}$$

**Tabela 4.5.** Necessidade de gesso (N0G) e o fornecimento Ca de acordo com o valor de fósforo remanescente (P-rem) de uma camada subsuperficial de 20 cm de espessura.

P-rem (mg L <sup>-1</sup> )			NG						
		Ca (kg ha <sup>-1</sup> )				Gesso (t ha <sup>-1</sup> )			
(a)	(b)	(c)	(d)	(c)	(d)	(c)	(d)	(c)	(d)
0	a	4	315	a	250	1,680	a	1,333	
4	a	10	250	a	190	1,333	a	1,013	
10	a	19	190	a	135	1,013	a	0,720	
19	a	30	135	a	85	0,720	a	0,453	
30	a	44	85	a	40	0,453	a	0,213	
44	a	60	40	a	0	0,213	a	0,000	

### b.3. Recomendação com base na determinação da NC

$$NG = 0,25 \text{ NC} \times \frac{EC}{20}$$

onde: EC = espessura de terra (cm) corrigida.

## 4.4 Calagem no sistema de semeadura direta

Preferencialmente, antes de iniciar o sistema semeadura direta em áreas sob cultivo convencional, indica-se corrigir integralmente a acidez do solo, sendo esta etapa fundamental para a adequação do solo a esse sistema. O corretivo, na quantidade recomendada, deve ser incorporado, uniformemente, na camada arável do solo, ou seja, até 20 cm de profundidade.

Após a implementação da semeadura direta, os processos de acidificação do solo irão ocorrer e será necessário, depois de algum tempo, a correção da acidez. Para a identificação da necessidade de calagem, o solo sob semeadura direta já implantada de maneira correta, deve ser amostrado na profundidade de 0 a 20 cm, podendo-se aplicar até 1/3 da quantidade

necessária. Para os solos que já receberam calcário na superfície, a amostragem deve ser realizada de 0 a 10 e 10 a 20 cm de profundidade. Portanto, em solos que já receberam calcário em superfície, sugere-se que, para o cálculo da recalagem, sejam utilizados os valores médios das duas profundidades, aplicando-se até 1/3 da quantidade indicada.

#### 4.5 Qualidade e uso do calcário

Para que a calagem atinja os objetivos de neutralização do alumínio trocável e/ou de elevação dos teores de cálcio e magnésio, algumas condições básicas devem ser observadas:

- ♦ todo o calcário deve passar em peneira com malha de 2 mm;
- ♦ o calcário deve apresentar teores de  $\text{CaO} + \text{MgO} > 38\%$ , com preferência ao uso de calcário dolomítico ( $>12,0\% \text{MgO}$ ) ou magnesiano (entre  $5,1\%$  e  $12,0\% \text{MgO}$ ), em solos com relação elevada de  $\text{Ca/Mg}$  ( $>3/1$ );
- ♦ na escolha do corretivo, em solos que contenham menos de  $0,8 \text{ cmol}_c \text{ dm}^{-3}$  de Mg, deve ser dada preferência para materiais que contenham o magnésio (calcário dolomítico e ou magnesiano) a fim de evitar que ocorra um desequilíbrio entre os nutrientes. Como os calcários dolomíticos encontrados no mercado contém teores de magnésio elevados, deve-se acompanhar a evolução dos teores de Ca e Mg no solo e, caso haja desequilíbrio, pode-se aplicar calcário calcítico ( $<5,0\% \text{MgO}$ ) para aumentar a relação  $\text{Ca/Mg}$ ; e
- ♦ a distribuição desuniforme e/ou a incorporação muito rasa do calcário pode causar ou agravar a deficiência de manganês, resultando em queda de produtividade.

#### 4.6 Correção da acidez subsuperficial

Os solos do Brasil apresentam problemas de acidez subsuperficial, uma

vez que a incorporação profunda do calcário nem sempre é possível. Assim, camadas mais profundas do solo (abaixo de 20 cm) podem continuar com excesso de alumínio tóxico. Esse problema, aliado à baixa capacidade de retenção de água desses solos, limita a produtividade, principalmente nas regiões onde é mais freqüente a ocorrência de veranicos (Sousa et al., 1996).

A aplicação de gesso agrícola diminui, em menor tempo, a saturação por alumínio nessas camadas mais profundas. Desse modo, criam-se condições para o sistema radicular das plantas se aprofundar no solo e, conseqüentemente, minimizar o efeito de veranicos. Deve ficar claro, porém, que o gesso não neutraliza a acidez do solo.

O gesso deve ser utilizado em áreas onde a análise de solo, na profundidade de 20 a 40 cm, indicar a saturação por alumínio maior que 20% e/ou quando a saturação por cálcio for menor que 60% (cálculo feito com base na capacidade de troca efetiva de cátions). A dose de gesso agrícola (15% de S) a aplicar é de 700, 1200, 2200 e 3200 kg ha<sup>-1</sup> para solos de textura arenosa, média, argilosa e muito argilosa, respectivamente. O efeito residual dessas dosagens é de, no mínimo, cinco anos.

## **4.7 Exigências minerais e adubação para a cultura da soja**

### **4.7.1 Exigências minerais**

A absorção de nutrientes por uma determinada espécie vegetal é influenciada por diversos fatores, entre eles as condições climáticas como chuvas e temperaturas, as diferenças genéticas entre cultivares de uma mesma espécie, o teor de nutrientes no solo e os diversos tratos culturais. Na tabela 4.6, são apresentadas as quantidades médias de nutrientes, contidos em 1.000 kg de restos culturais de soja e em 1.000 kg de grãos de soja.

**Tabela 4.6.** Quantidade absorvida e exportação de nutrientes pela cultura da soja.

Parte da planta	N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O	Ca	Mg	S	B	Cl	Mo	Fe	Mn	Zn	Cu
	kg (1000 kg) <sup>-1</sup> ou g kg <sup>-1</sup>						g (1000 kg) <sup>-1</sup> ou mg kg <sup>-1</sup>						
Grãos	51	10,0	20	3,0	2,0	5,4	20	237	5	70	30	40	10
Restos culturais	32	5,4	18	9,2	4,7	10,0	57	278	2	390	100	21	16
Total	83	15,4	38	12,2	6,7	15,4	77	515	7	460	130	61	26
% Exportada	61	65	53	25	30	35	26	46	71	15	23	66	38

Obs.: à medida que aumenta a matéria seca produzida por hectare, a quantidade de nutrientes nos restos culturais da soja não segue modelo linear.

#### 4.7.2 Diagnóstico foliar

Além da análise do solo, para indicação de adubação, existe a possibilidade complementar da Diagnóstico Foliar, principalmente para micronutrientes, pois os níveis críticos desses no solo, apresentados na seção 4.8.6, são ainda preliminares. Assim, a Diagnóstico Foliar apresenta-se como uma ferramenta complementar na interpretação dos dados de análise de solo, para fins de indicação de adubação, principalmente para a safra seguinte.

Basicamente, a Diagnóstico Foliar consiste em analisar, quimicamente, as folhas e interpretar os resultados conforme a Tabela 4.7. Os trifólios a serem coletados, sem o pecíolo, são o terceiro e/ou o quarto, a partir do ápice de, no mínimo, 40 plantas no talhão, no início do florescimento (Estádio R1). Quando necessário, para evitar a contaminação com poeira de solo nas folhas, sugere-se mergulhá-las em água, simplesmente para a remoção de resíduos de poeira e em seguida colocadas para secar à sombra e após embaladas em sacos de papel (não usar plástico).

Para os Estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, a interpretação dos resultados de análise foliar é feita a partir de faixas de teores definidas na Tabela 4.8. Nestes estados, adota-se como folha índice o terceiro trifólio e/ou quarto trifólio com pecíolo, a partir do ápice, coletado no estágio de florescimento pleno (R2).

**Tabela 4.7.** Concentrações de nutrientes usadas na interpretação dos resultados das análises de folhas de soja do terço superior no início do florescimento (Estádio R1). Embrapa Soja. Londrina, PR. 1985<sup>1</sup>.

Elemento	Deficiente ou muito baixo	Baixo	Suficiente ou médio	Alto	Excessivo ou muito alto
..... g kg <sup>-1</sup> .....					
N	<32,5	32,5 a 45,0	45,0 a 55,0	55,0 a 70,0	>70,0
P	<1,6	1,6 a 2,5	2,5 a 5,0	5,0 a 8,0	>8,0
K	<12,5	12,5 a 17,0	17,0 a 25,0	25,0 a 27,5	>27,5
Ca	<2,0	2,0 a 3,5	3,5 a 20,0	20,0 a 30,0	>30,0
Mg	<1,0	1,0 a 2,5	2,5 a 10,0	10,0 a 15,0	>15,0
S	* <1,5	1,5 a 2,0	2,0 a 4,0	>4,0	–
..... mg kg <sup>-1</sup> .....					
Mn	<15	15 a 20	20 a 100	100 a 250	>250
Fe	<30	30 a 50	50 a 350	350 a 500	>500
B	<10	10 a 20	20 a 55	55 a 80	>80
Cu <sup>1</sup>		<6	6 a 14	>14	
Zn	<11	11 a 20	20 a 50	50 a 75	>75
Mo	<0,5	0,5 a 1	1 a 5,0	5,0 a 10	>10

<sup>1</sup> Sfredo, Borkert e Klepker, 2001.

## 4.8 Adubação

### 4.8.1 Nitrogênio

A soja obtém a maior parte do nitrogênio que necessita através da fixação simbiótica que ocorre com bactérias do gênero *Bradyrhizobium*.

Os procedimentos corretos para a inoculação encontram-se descritos no capítulo 7.

**Tabela 4.8.** Teores de nutrientes usados na interpretação dos resultados das análises de folhas de soja para o MS e MT (Estádio R2)<sup>1</sup>.

Elemento	Baixo	Suficiente	Alto
		..... g kg <sup>-1</sup> .....	
N	<34,7	34,7 a 45,2	>45,2
P	<2,4	2,4 a 3,7	>3,7
K	<17,6	17,6 a 26,3	>26,3
Ca	<7,5	7,5 a 13,1	>13,1
Mg	<2,9	2,9 a 4,5	>4,5
S	<2,0	2,0 a 3,1	>3,1
		..... mg kg <sup>-1</sup> .....	
B	<33	33 a 50	>50
Cu	<5	5 a 11	>11
Fe	<58	58 a 114	>114
Mn	<31	31 a 71	>71
Zn	<33	33 a 68	>68

<sup>1</sup> Terceiro e/ou quarto trifólio com pecíolo.

## 4.8.2 Região de Cerrados

### 4.8.2.1 Adubação fosfatada

A indicação da quantidade de nutrientes, principalmente em se tratando de adubação corretiva, é feita com base nos resultados da análise do solo.

Na Tabela 4.9 são apresentados os teores de P extraível, obtidos pelo método Mehlich I e a correspondente interpretação, que varia em função dos teores de argila.

Duas proposições são apresentadas para a indicação de adubação fosfatada corretiva: a correção do solo de uma só vez, com posterior manutenção do nível de fertilidade atingido e a correção gradativa, através de aplicações anuais no sulco de semeadura (Tabela 4.10).

**Tabela 4.9.** Interpretação de análise de solo para indicação de adubação fosfatada (fósforo extraído pelo método Mehlich I), para solos de Cerrado.

Teor de argila (%)	Teor de P (mg dm <sup>-3</sup> )			
	Muito baixo	Baixo <sup>1</sup>	Médio	Bom
>60	≤ 1	1 a 2	2 a 3	>3
40 a 60	≤ 3	3 a 6	6 a 8	>8
20 a 40	≤ 5	5 a 10	10 a 14	>14
≤20	≤ 6	6 a 12	12 a 18	>18

Fonte: Sousa & Lobato (1996).

<sup>1</sup> Ao atingir níveis de P extraível acima dos valores estabelecidos nesta classe, utilizar somente adubação de manutenção.

**Tabela 4.10.** Indicação de adubação fosfatada corretiva, a lanço e adubação fosfatada corretiva gradual no sulco de semeadura, de acordo com a classe de disponibilidade de P e o teor de argila, para solos de Cerrados.

Teor de argila (%)	Adubação fosfatada (kg P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ha <sup>-1</sup> ) <sup>1</sup>			
	Corretiva total <sup>2</sup>		Corretiva gradual <sup>3</sup>	
	P muito baixo <sup>4</sup>	P baixo <sup>4</sup>	P muito baixo <sup>4</sup>	P baixo <sup>4</sup>
>60	240	120	100	90
40 a 60	180	90	90	80
20 a 40	120	60	80	70
≤20	100	50	70	60

Fonte: Sousa & Lobato (1996).

<sup>1</sup> Fósforo solúvel em citrato de amônio neutro mais água, para os fosfatos acidulados; solúvel em ácido cítrico 2% (relação 1:100); para termofosfatos, fosfatos naturais e escórias.

<sup>2</sup> Além da dose de correção total, usar adubação de manutenção.

<sup>3</sup> No sulco de semeadura, em substituição à adubação de manutenção.

<sup>4</sup> Classe de disponibilidade de P, ver Tabela 4.9.

A adubação corretiva gradual pode ser utilizada quando não há a possibilidade de fazer a correção do solo de uma só vez. Esta prática consiste em aplicar, no sulco de semeadura, uma quantidade de P de modo a acumular, com o passar do tempo, o excedente e atingindo, após alguns

anos, a disponibilidade de P desejada. Ao utilizar as doses de adubo fosfatado sugeridas na Tabela 4.10, espera-se que, num período máximo de seis anos, o solo apresente teores de P em torno do nível crítico.

Quando o nível de P no solo estiver classificado como Médio ou Bom (Tabela 4.9), usar somente a adubação de manutenção, que corresponde a 20 kg de  $P_2O_5$  ha<sup>-1</sup>, para cada 1000 kg de grãos produzidos.

#### 4.8.2.2. Adubação potássica

A indicação para adubação corretiva com potássio, de acordo com a análise do solo, é apresentada na Tabela 4.11. Esta adubação deve ser feita a lanço, em solos com teor de argila maior que 20%. Em solos de textura arenosa (<20% de argila), não se deve fazer adubação corretiva de potássio, devido às acentuadas perdas por lixiviação.

**Tabela 4.11.** Adubação corretiva de potássio para solos de Cerrados com teor de argila >20%, de acordo com dados de análise de solo.

Teores de K extraível		Adubação indicada (kg ha <sup>-1</sup> de K <sub>2</sub> O) <sup>1</sup>
mg dm <sup>-3</sup>	cmol <sub>c</sub> dm <sup>-3</sup>	
≤25	≤0,06	100
25 a 50	0,06 a 0,13	50
>50	>0,13	0

Fonte: Sousa & Lobato (1996).

<sup>1</sup>Aplicação parcelada de 1/3 na sementeira da soja e 2/3 em cobertura 20 a 30 dias após a sementeira.

Estando o nível de K extraível acima do valor crítico (50 mg dm<sup>-3</sup> ou 0,13 cmol<sub>c</sub> dm<sup>-3</sup>), indica-se a adubação de manutenção de 20 kg de K<sub>2</sub>O para cada tonelada de grão a ser produzida.

Na sementeira da soja, como manutenção, aplicar 20kg de K<sub>2</sub>O para cada 1.000 kg de grãos que se espera produzir.

Nas dosagens de K<sub>2</sub>O acima de 50 kg ha<sup>-1</sup> ou quando o teor de argila for <40%, fazer a adubação de 1/3 da quantidade total indicada na sementeira e 2/3 em cobertura, 30 ou 40 dias após a germinação, respectivamente para cultivares de ciclo mais precoce e mais tardio.

### 4.8.3 Estado de Minas Gerais

Adubação fosfatada, potássica e com enxofre.

Na Tabela 4.12 são apresentadas as classes de interpretação da disponibilidade, para fósforo, de acordo com o teor de argila do solo ou com o valor de fósforo remanescente, e para potássio.

Na tabela 4.13 são indicadas as doses de P e K a serem aplicadas de acordo com os níveis destes nutrientes no solo.

**Tabela 4.12.** Classes de interpretação da disponibilidade para fósforo de acordo com o teor de argila do solo ou com o valor de fósforo remanescente (P-rem) e para potássio.

Classe	Classificação				
	Muito baixo	Baixo	Médio	Bom	Muito bom
Argila (%)	..... Fósforo disponível <sup>1</sup> (mg dm <sup>-3</sup> ) <sup>2</sup> .....				
>60	<2,8	2,8 a 5,4	5,4 a 8,0	8,0 a 12,0	>12,0
35 a 60	<4,1	4,1 a 8,0	8,0 a 12,0	12,0 a 18,0	>18,0
15 a 35	<6,7	6,7 a 12,0	12,0 a 20,0	20,0 a 30,0	>30,0
<15	<10,1	10,1 a 20,0	20,0 a 30,0	30,0 a 45,0	>45,0
P-rem <sup>3</sup> (mg L <sup>-1</sup> )	..... Potássio disponível (K) <sup>1</sup> .....				
0 - 4	< 3,0	3,0 - 4,3	4,3 - 6,0 <sup>4</sup>	6,0 - 9,0	>9,0
4 - 10	< 4,0	4,0 - 6,0	6,0 - 8,3	8,3 - 12,5	>12,5
10 - 19	< 6,0	6,0 - 8,3	8,3 - 11,4	11,4 - 17,5	>17,5
19 - 30	< 8,0	8,0 - 11,4	11,4 - 15,8	15,8 - 24,0	>24,0
30 - 44	<11,0	11,0 - 15,8	15,8 - 21,8	21,8 - 33,0	>33,0
44 - 60	<15,0	15,0 - 21,8	21,8 - 30,0	30,0 - 45,0	>45,0
cmol <sub>c</sub> dm <sup>-3</sup>	<0,04	0,04 a 0,10	0,10 a 0,18	0,18 a 0,31	> 0,31
mg dm <sup>-3</sup>	<15	15 a 40	40 a 70 <sup>4</sup>	70 a 120	> 120

<sup>1</sup> Método Mehlich 1.<sup>2</sup> mg dm<sup>-3</sup> = ppm (m/v).<sup>3</sup> P-rem = fósforo remanescente, concentração de fósforo da solução de equilíbrio após agitar durante 1 h a TFSA com solução de CaCl<sub>2</sub> 10 mmol L<sup>-1</sup>, contendo 60 mg L<sup>-1</sup> de P, na relação 1:10.<sup>4</sup> O limite superior desta classe indica o nível crítico.

**Tabela 4.13.** Adubação com P e K para uma produtividade de 3.000 kg de grãos.

Disponibilidade de P <sup>1</sup>			Disponibilidade de K <sup>1</sup>		
Baixa	Média	Boa	Baixa	Média	Boa
..... kg ha <sup>-1</sup> de P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .....			..... kg ha <sup>-1</sup> de K <sub>2</sub> O <sup>2</sup> .....		
120	80	40	120	80	40

<sup>1</sup> Utilizar os critérios para interpretação da fertilidade do solo apresentados na Tabela 4.12.

<sup>2</sup> Não aplicar no sulco, em uma única vez, quantidade superior a 50 kg ha<sup>-1</sup>.

**Tabela 4.14.** Classes de interpretação da disponibilidade para o enxofre<sup>1</sup> de acordo com o valor de fósforo remanescente (P-rem).

P-rem	Classificação				
	Muito baixo	Baixo	Médio <sup>2</sup>	Bom	Muito bom
mg L	..... (mg dm <sup>-3</sup> ) <sup>3</sup> .....				
	Enxofre disponível (S)				
0-4	< 1,8	1,8-2,5	2,5-3,6	3,6-5,4	>5,4
4-10	< 2,5	2,5-3,6	3,6-5,0	5,0-7,5	>7,5
10-19	< 3,4	3,4-5,0	5,0-6,9	6,9-10,3	>10,3
19-30	< 4,7	4,7-6,9	6,9-9,4	9,4-14,2	>14,2
30-44	< 6,5	6,5-9,4	9,4-13,0	13,0-19,6	>19,6
44-60	< 9,0	9,0-13,0	13,0-18,0	18,0-27,0	>27,0

<sup>1</sup> Método Hoef et al., 1973 (Ca(H<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>, 500 mg L<sup>-1</sup> de P, em HOAc 2 mol L<sup>-1</sup>).

<sup>2</sup> Esta classe indica os níveis críticos de acordo com o valor de P-rem.

<sup>3</sup> mg dm<sup>-3</sup> = ppm (m/v).

#### 4.8.4 Estado de São Paulo

Na Tabela 4.15 constam as doses de P e K a serem aplicadas e que variam com a análise do solo e a produtividade esperada.

**Tabela 4.15.** Adubação mineral de semeadura para o Estado de São Paulo.

Produtividade esperada <sup>1</sup>	P resina, mg dm <sup>-3</sup>				K <sup>+</sup> trocável, mmol <sub>c</sub> dm <sup>-3</sup>			
	<7	7 a 16	16 a 40	>40	<0,8	0,8 a 1,5	1,5 a 3,0	>3,0
* ..... t ha <sup>-1</sup> .....	.....P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , kg ha <sup>-1</sup> .....				.....K <sub>2</sub> O, kg ha <sup>-1</sup> .....			
<2,0	50	40	30	20	60	40	20	0
2,0 a 2,5	60	50	40	20	70	50	30	20
2,5 a 3,0	80	60	40	20	70	50	50	20
3,0 a 3,5	90	70	50	30	80	60	50	30
>3,5	-	80	50	40	80	60	60	40

Fonte: Mascarenhas & Tanaka, 1997.

### 4.8.5 Estado do Paraná

**Tabela 4.16.** Indicação de adubação com fósforo e potássio para a soja no Estado do Paraná em solos com teor de argila >40%<sup>1</sup>. (Sfredo, Lantmann e Borkert, 1999, modificada de Sfredo e Borkert, 1993).

Análise do solo			Quantidade a aplicar		
mg dm <sup>-3</sup>		cmol <sub>c</sub> dm <sup>-3</sup>	kg ha <sup>-1</sup>		
P <sup>2</sup>	K <sup>2</sup>	K <sup>2</sup>	N <sup>3</sup>	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> <sup>4</sup>	K <sub>2</sub> O <sup>5</sup>
<3,0	<40	<0,10	0	100	90
	40 a 80	0,10 a 0,20	0	100	70
	80 a 120	0,20 a 0,30	0	100	50
	>120	>0,30	0	100	40
3,0 a 6,0	<40	<0,10	0	80	90
	40 a 80	0,10 a 0,20	0	80	70
	80 a 120	0,20 a 0,30	0	80	50
	>120	>0,30	0	80	40
>6,0	<40	<0,10	0	60	90
	40 a 80	0,10 a 0,20	0	60	70
	80 a 120	0,20 a 0,30	0	60	50
	>120	>0,30	0	60	40

<sup>1</sup> Em solos com teor de argila <40%, usar as Tabelas 4.9 a 4.11.

<sup>2</sup> Extrator de P e K : Mehlich I.

<sup>3</sup> O nitrogênio deve ser suprido através da inoculação.

<sup>4</sup> Pode-se usar até 10 kg a menos do que o indicado na Tabela.

<sup>5</sup> Quando o teor no solo for muito baixo, menor que 0,08 cmol<sub>c</sub> dm<sup>-3</sup> ou 31 mg dm<sup>-3</sup>, fazer adubação corretiva com 140 kg ha<sup>-1</sup> de K<sub>2</sub>O a lançar e incorporar com grade, além da adubação de manutenção na semeadura, indicada na tabela acima.

### 4.8.6 Adubação com enxofre

Para determinar corretamente a necessidade de enxofre (S), deve-se fazer a análise de solo em duas profundidades, 0 a 20 cm e 20 a 40 cm, devido à mobilidade do nutriente no solo e o seu acúmulo na segunda camada. A tabela 4.17 apresenta as quantidades recomendadas, de acordo

**Tabela 4.17.** Indicação de adubação de correção e de manutenção com enxofre (S), conforme as faixas de teores de S no solo ( $\text{mg dm}^{-3}$ ), a duas profundidades no perfil do solo, para a cultura da Soja. 2ª aproximação<sup>1</sup>.

		Análise de S no solo <sup>2</sup>				Quantidade de S a aplicar ( $\text{kg ha}^{-1}$ )
Faixas para interpretação		Solo argiloso >40% de argila		Solo arenoso ≤40% de argila		
		Profundidade (cm)				
0 a 20	20 a 40	0 a 20	20 a 40	0 a 20	20 a 40	
		..... $\text{mg dm}^{-3}$ .....				
Baixo	Baixo	<5	<20	<2	<6	80+M <sup>3</sup>
Baixo	Médio	<5	20 a 35	<2	6 a 9	60+M
Baixo	Alto	<5	>35	<2	>9	40+M
Médio	Baixo	5 a 10	<20	2 a 3	<6	60+M
Médio	Médio	5 a 10	20 a 35	2 a 3	6 a 9	40+M
Médio	Alto	5 a 10	>35	2 a 3	>9	M
Alto	Baixo	>10	<20	>3	<6	40+M
Alto	Médio	>10	20 a 35	>3	6 a 9	M
Alto	Alto	>10	>35	>3	>9	M

<sup>1</sup> Sfredo, Klepker, Ortiz e Oliveira Neto, 2003.

<sup>2</sup> Métodos: Extração- $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$  0,01  $\text{M L}^{-1}$ ; Determinação-Turbidimetria.

<sup>3</sup> M=Manutenção: 10 kg para cada 1000 kg de produção de grãos esperada.

com a classe de teores. No solo, os níveis críticos são  $10 \text{ mg dm}^{-3}$  e  $35 \text{ mg dm}^{-3}$  para solos argilosos (> 40% de argila) e  $3 \text{ mg dm}^{-3}$  e  $9 \text{ mg dm}^{-3}$  para solos arenosos (≤ 40% de argila), respectivamente nas profundidades 0 a 20 cm e 20 a 40 cm (Sfredo et al., 2003).

Considerando a absorção e a exportação do nutriente, a adubação de manutenção corresponde a 10 kg de S para cada 1.000 de produção de grãos esperada.

A análise de folhas deve ser realizada caso haja dúvidas com a análise de solo. A faixa de suficiência de S nas folhas varia de 2,1 a  $4,0 \text{ g kg}^{-1}$  (Tabela 4.7, item 4.7.2).

No mercado, encontram-se algumas fontes de S, que são: gesso agrícola (15% de S), superfosfato simples (12% de S) e “flor” de enxofre ou enxofre elementar (98% de S). Além disso, há várias fórmulas N-P-K no mercado que contém S.

#### 4.8.7 Adubação com micronutrientes

Como sugestão para interpretação de micronutrientes em análises de solo, com os extratores Mehlich I e DTPA, e boro (B), pela água quente, respectivamente, são apresentados os teores limites para as faixas baixo, médio e alto (Tabela 4.18).

A indicação da aplicação de doses de micronutrientes no solo está contida na Tabela 4.19.

Esses elementos, de fontes solúveis ou insolúveis em água, são aplicados a lanço, desde que o produto satisfaça a dose indicada. O efeito residual dessa indicação atinge, pelo menos, um período de cinco anos. Para reaplicação de qualquer um desses micronutrientes, consultar a análise foliar como instrumento indicador. A análise de folhas, para diagnosticar possíveis deficiências ou toxicidade de micronutrientes em soja, constitui-se em argumento efetivo para correção via adubação de algum desequilíbrio nutricional (Tabela 4.7) Porém, as correções só se viabilizam na próxima safra, considerando que, para as análises, a amostragem de folhas é indicada no período da floração, a partir do qual não é mais possível realizar correção de ordem nutricional.

A aplicação de micronutrientes no sulco de semeadura tem sido bastante utilizada pelos produtores. Nesse caso, aplica-se 1/3 da indicação a lanço por um período de três anos sucessivos.

**Tabela 4.18.** Limites para a interpretação dos teores de micronutrientes no solo, extraídos por dois métodos de análise, para culturas anuais, nos Cerrados.

Níveis	Métodos							
	Água quente	Mehlich I			DTPA			
	B	Cu	Mn	Zn	Cu	Fe	Mn	Zn
	..... mg dm <sup>-3</sup> .....							
Baixo	<0,3	<0,5	<2,0	<1,1	<0,3	<5	<1,3	<0,6
Médio	0,3-0,5	0,5-0,8	2,0-5,0	1,1-1,6	0,3-0,8	5-12	1,3-5,0	0,6-1,2
Alto	>0,5	>0,8	>5,0	>1,6	>0,8	>12	>5,0	>1,2

Fonte: - Mehlich I: Galvão (1998), dados não publicados.

DTPA: Raij, B.van; Quaggio, A.J.; Cantarella, H. & Abreu, C.A. Interpretação de análise de solo. In: Raij, B.van; Cantarella, H.; Quaggio, A.J.; Furlani, A.M.C. Indicações de adubação e calagem para o Estado de São Paulo. 2ed.rev.atual. Campinas, Instituto Agrônomo/ Fundação IAC, 1997. p.8-13. (Boletim Técnico, 100).

**Tabela 4.19.** Indicação da aplicação de doses de micronutrientes no solo.

Teor	B	Cu	Mn	Zn
	..... kg ha <sup>-1</sup> .....			
Baixo	1,5	2,5	6,0	6,0
Médio	1,0	1,5	4,0	5,0
Alto	0,5	0,5	2,0	4,0

Fonte: <sup>1</sup>Sfredo, Lantmann e Borkert, 1999.

#### **4.8.8 Adubação foliar com macro e micronutrientes**

No caso de deficiência de manganês, constatada através de exame visual, indica-se a aplicação de 350 g ha<sup>-1</sup> de Mn (1,5 kg de MnSO<sub>4</sub>) diluído em 200 litros de água com 0,5% de uréia.

Essa prática não é indicada a outros macro ou micronutrientes para a cultura da soja.

#### **4.8.9 Adubação com Co e Mo**

Consultar a seção 7.

# 5

## Cultivares

---

A divulgação das cultivares de soja indicadas para cultivo em cada estado, através desta publicação, tem o propósito de informar, aos técnicos e empresários do setor produtivo, os avanços que ocorrem, a cada ano, nesse aspecto tecnológico.

As tabelas a seguir referem-se às cultivares indicadas pelas instituições detentoras para cultivo no País, nos diversos estados. Na quase totalidade, essas cultivares estão inscritas no Registro Nacional de Cultivares - RNC/MAPA. Entretanto, um número considerável de cultivares registradas não consta nas tabelas, pelo fato de não terem sido apresentadas nas Reuniões de Pesquisa de Soja da Região Central do Brasil – foro de informações para a elaboração deste documento de indicações técnicas.

Cultivares melhoradas, portadoras de genes capazes de expressar alta produtividade, ampla adaptação e boa resistência/tolerância a fatores bióticos ou abióticos adversos, representam usualmente uma das mais significativas contribuições à eficiência do setor produtivo. O ganho genético proporcionado pelas novas cultivares ao setor produtivo tem sido muito significativo - maior que 1% ao ano.

Mais recentemente, diversas instituições vêm dedicando grande parcela das suas atividades ao desenvolvimento de cultivares geneticamente modificadas para tolerância a herbicidas pós-emergentes. Até agosto de 2004, 41 cultivares tolerantes ao glyphosate, denominadas 'Roundup Ready' (RR), haviam sido registradas. No entanto, tal registro não as credenciava à comercialização. O registro era de caráter provisório, dado o impedimento legal, à época, do uso de organismos geneticamente modificados no Brasil. Por esta razão, embora nove cultivares RR tenham sido apresentadas pela Embrapa na reunião de pesquisa de 2004, elas não constaram nas tabelas de cultivares da publicação 'Tecnologias de Produção de Soja 2005'.

Com a instituição da Lei nº 11.105, de 24/03/2005, que “estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam organismos geneticamente modificados - OGM e seus derivados”, as nove cultivares RR apresentadas em 2004 passam a integrar as tabelas desta publicação.

De agosto de 2004 a agosto de 2005 foram registradas, no RNC/MAPA, outras 22 cultivares RR de soja, totalizando 63 até então.

As cultivares apresentadas na RPSRCB deste ano (sete cultivares RR e dezoito não transgênicas) passam, também, a compor as aludidas tabelas. Outras dez cultivares tiveram ampliadas suas abrangências geográficas de indicação.

Vários desafios, no campo da sanidade, continuam ocupando sobremaneira a atenção dos geneticistas, melhoristas, fitopatologistas e entomologistas brasileiros de soja, nos últimos anos. Citam-se a prospecção e a transferência de genes de resistência à ferrugem, ao vírus da necrose da haste e ao nematóide de cisto, visando eliminar ou reduzir riscos de prejuízos sérios causados por essas enfermidades. A resistência ou tolerância a insetos-pragas, principalmente os sugadores, é outro campo de grande interesse de avanço, com vistas à redução de uso de agroquímicos e à viabilização do processo orgânico de produção.

As Tabelas 5.1 a 5.13 apresentam as cultivares por Unidade da Federação e por grupo de maturação, visando facilitar a tomada de decisão dos usuários quanto às épocas de semeadura, à diversidade de ciclos das cultivares nas propriedades e aos sistemas de sucessão/rotação com outras culturas. Os poucos casos de cultivares não constantes no Registro Nacional, em 09 de setembro de 2005, são informados em nota de rodapé das tabelas.

**Tabela 5.1.** Cultivares de soja inscritas no Registro Nacional de Cultivares e indicadas para o Estado do Paraná - Safra 2005/06.

Grupo de maturação			
Precoce (até 115 dias)	Semiprecoce (116 a 125 dias)	Médio (126 a 137 dias)	Semitardio (138 a 150 dias)
BRS 132	* BR 16	BR 37	KI-S 801
BRS 137	BR 36	BRS 134	*****
BRS 155 <sup>3</sup>	BRS 133	BRS 136	
BRS 183	BRS 154	BRS 215	
BRS 212	BRS 156	BRS 233	
BRS 213	BRS 184	BRS 247RR <sup>1</sup>	
BRS 230	BRS 185	BRS 256RR <sup>1</sup>	
BRS 242RR <sup>1</sup>	BRS 214	BRS 261 <sup>1</sup>	
BRS 243RR <sup>1</sup>	BRS 216	BRS 262 <sup>1</sup>	
BRS 255RR <sup>1</sup>	BRS 231	BRS Cambona	
BRS 257 <sup>1</sup>	BRS 232	BRS Candiero	
BRS Macota	BRS 244RR <sup>1</sup>	BRS Guapa	
CD 202	BRS 245RR <sup>1</sup>	BRS Torena <sup>4</sup>	
CD 203	BRS 246RR <sup>1</sup>	BRS Sinuelo <sup>4</sup>	
CD 207	BRS 258 <sup>1,7</sup>	CD 204	
CD 210	BRS 259 <sup>1</sup>	CD 205	
CD 212RR <sup>1</sup>	BRS 260 <sup>1</sup>	CD 211 <sup>2,6</sup>	
CD 213RR <sup>1</sup>	BRS Invernada	CD 218	
CD 214RR <sup>1</sup>	BRS Raiana	CS 935142 <sup>5</sup>	
CD 215	BRS Tebana <sup>4</sup>	Embrapa 60	
CD 216	CD 208	M-SOY 7602	
CD 221 <sup>1</sup>	CD 201	KI-S 702	
Embrapa 48	CD 206	M-SOY 7501	
IAS 5	CD 209	M-SOY 7603	
ICA 3	CD 217	M-SOY 7701	
ICA 4	CD 223AP <sup>1</sup>	OC 16 <sup>3</sup>	
ICASC 1	CDFAPA 220	*****	
M-SOY 5942	Embrapa 59		

Continua...

Grupo de maturação			
Precoce (até 115 dias)	Semiprecoce (116 a 125 dias)	Médio (126 a 137 dias)	Semitardio (138 a 150 dias)
...Continuação Tabela 5.1			
M-SOY 6101	ICA 6 <sup>7</sup>	—	—
M-SOY 6302	KI-S <sub>602</sub> RCH		
M-SOY 6350	M-SOY 2002		
NK 412113	M-SOY 7001		
OC 14	M-SOY 7101		
RB 501	M-SOY 7202		
RB 502	OC 13 <sup>3</sup>		
Spring <sup>7</sup>	RB 603		
*****	RB 604		
	RB 605		

<sup>1</sup> Cultivar em lançamento.

<sup>2</sup> Cultivar em extensão de indicação.

<sup>3</sup> Cultivar a ser excluída de indicação em 2006.

<sup>4</sup> Cultivar indicada para as regiões centro-sul e sudoeste do estado.

<sup>5</sup> Cultivar indicada para as regiões norte e noroeste do estado.

<sup>6</sup> Cultivar indicada para a região norte do estado.

<sup>7</sup> Cultivar não constante no Registro Nacional de Cultivares em 09/09/2005.

**Nota:** Foram excluídas de indicação para o Estado do Paraná, em 2005, as cultivares BR 4, BR 30, BRS 135, BRS 157, Embrapa 1 (IAS 5 RC), Embrapa 4 (BR 4 RC), Embrapa 58, Embrapa 61, Embrapa 62, FT 5 (Formosa), FT 7 (Tarobá), FT 9 (Inaê), FT 10 (Princesa), FT 2000, FT Abyara, FT Cometa, FT Cristalina, FT Estrela, FT Guaíra, FT Iramaia, FT Líder, FT Manacá, FT Saray, M-SOY 6401, M-SOY 6402, M-SOY 7001, M-SOY 7204 e M-SOY 7518.

**Tabela 5.2.** Cultivares de soja inscritas no Registro Nacional de Cultivares e indicadas para o Estado de São Paulo - Safra 2005/06.

Grupo de maturação			
Precoce (até 120 dias)	Semiprecoce (121 a 130 dias)	Médio (131 a 140 dias)	Semitardio (141 a 150 dias)
BR 4 <sup>3</sup>	BR 37	BRS 134	IAC 25 <sup>7</sup>
BR 16	BRS 133	BRS 136	IAC 26 <sup>7</sup>
BRS 132	BRS 156	BRS 215	M-SOY 8200
BRS 183	BRS 184	BRS 233	M-SOY 8400
BRS 212	BRS 185	BRS 247RR <sup>1</sup>	*****
BRS 213	BRS 214	BRS 256RR <sup>1</sup>	
BRS 230	BRS 216	BRS 261 <sup>1</sup>	
BRS 242RR <sup>1</sup>	BRS 231	BRS 262 <sup>1</sup>	
BRS 243RR <sup>1</sup>	BRS 232	BRS Cambona	
BRS 255RR <sup>1</sup>	BRS 244RR <sup>1</sup>	BRS Candiero	
BRS 257 <sup>1</sup>	BRS 245RR <sup>1</sup>	BRS Guapa	
BRS Macota	BRS 246RR <sup>1</sup>	BRSGO 204 [Goiânia]	
CD 201	BRS 258 <sup>1,7</sup>	BRSMG 68 [Vencedora]	
CD 202	BRS 260 <sup>1</sup>	BRSMG 250 [Nobreza]	
CD 212RR <sup>1</sup>	BRS Invernada	CAC 1	
CD 213RR <sup>1,5</sup>	BRS Raiana	CD 211 <sup>2</sup>	
CD 214RR <sup>1,5</sup>	BRSMG Liderança	CS 801 <sup>1,6</sup>	

Continua...

Grupo de maturação			
Precoce (até 120 dias)	Semiprecoce (121 a 130 dias)	Médio (131 a 140 dias)	Semitardio (141 a 150 dias)
...Continuação Tabela 5.2			
CD 215 <sup>2,5</sup>	CD 205	CS 821 <sup>1,6</sup>	-
CD 216 <sup>2,5</sup>	CD 208	CS 935142 <sup>4</sup>	.
Embrapa 48	CD 209	Dourados <sup>3</sup>	
Emgopa 316	CD 218 <sup>2,5</sup>	Embrapa 60	
IAC 13	CD 219RR <sup>1</sup>	Emgopa 315 (Rio Vermelho)	
IAC 16	CD 222 <sup>1</sup>	IAC 8-2	
IAC 17	Embrapa 59	IAC 19	
IAC 20	Foster (IAC)	IAC PL-1	
IAC 22	IAC 12	IAC/Holambra Stewart-1	
IAC 23	IAC 15	KI-S 801	
IAC Foscarin 31	IAC 15-1	MG/BR 46 (Conquista)	
IAS 5	IAC 18	M-SOY 7901	
ICA 4	IAC 24	M-SOY 8001	
ICA 6 <sup>7</sup>	IAC 100	*****	
ICASC 1	KI-S 602 RCH		
M-SOY 2002	KI-S 702		
M-SOY 5942	M-SOY 7501		
M-SOY 6101	M-SOY 7602		
M-SOY 6302	M-SOY 7603		

Continua...

Grupo de maturação			
Precoce (até 120 dias)	Semiprecoce (121 a 130 dias)	Médio (131 a 140 dias)	Semitardio (141 a 150 dias)
...Continuação Tabela 5.2			
M-SOY 6402	M-SOY 7701	—	—
M-SOY 7101	*****		
NK412113			
OC 14 <sup>3</sup>			
RB 501			
RB 502			
RB 603			
RB 604			
RB 605			

<sup>1</sup> Cultivar em lançamento.

<sup>2</sup> Cultivar em extensão de indicação.

<sup>3</sup> Cultivar a ser excluída de indicação em 2006.

<sup>4</sup> Cultivar indicada para a região do Médio Paranapanema.

<sup>5</sup> Cultivar indicada para as regiões sul e oeste do estado.

<sup>6</sup> Cultivar indicada para a região norte do estado.

<sup>7</sup> Cultivar não constante do Registro Nacional de Cultivares em 09/09/2005.

**Nota:** Foram excluídas de indicação para o Estado de São Paulo, em 2005, as cultivares BRSMG Confiança, Embrapa 1 (IAS 5 RC), Embrapa 4 (BR 4 RC), Embrapa 58, Embrapa 62, FT 5 (Formosa), FT 9 (Inaê), FT 10 (Princesa), FT 14 (Piracema), FT 20 (Jáú), FT 100, FT 2000, FT 25500 (Cristal), FT Abyara, FT Cometa, FT Estrela, FT Guáira, FT Iramaia, M-SOY 6401, M-SOY 7001, M-SOY 7204, M-SOY 7518 e M-SOY 7601.

**Tabela 5.3.** Cultivares de soja inscritas no Registro Nacional de Cultivares e indicadas para o Estado de Mato Grosso do Sul - Safra 2005/06.

Grupo Precoce/Médio			Grupo Semitardio			Grupo Tardio		
Cultivar	Região		Cultivar	Região		Cultivar	Região	
A 7001 <sup>1</sup>	CN	- -	A 7002	CN	- -	BR/Emgopa 314		
A 7005 <sup>1</sup>	CN	- -	BRS 182	-	- S	(Garça Branca)	CN	- -
BR 16	-	SO S	BRSO Raíssa <sup>2</sup>	CN	SO S	BRSMS Curimbatá <sup>4</sup>	CN	- -
BRS 133	-	- S	BRSMS Mandi	CN	SO -	BRSMS Piracanjuba	CN	SO -
BRS 134	-	- S	BRSMS Taquari	CN	SO S	BRSMS Piraputanga	CN	SO -
BRS 181	CN	SO S	CAC 1	CN	SO S	BRSMS Surubi	CN	SO -
BRS 206	-	- S	CD 211	CN	- S	BRSMS Tuiuiú	CN	SO -
BRS 239	-	- S	CD 222 <sup>1</sup>	CN	- -	Elite	CN	- -
BRS 240	-	- S	Dourados <sup>3</sup>	CN	SO S	Embrapa 20(Doko RC) <sup>3</sup>	CN	SO S
BRS 241	-	- S	IAC 8	CN	SO S	Emgopa 313	CN	SO -
BRS Cambona	-	- S	IAC 8-2	CN	- -	FT 106	CN	- -
BRS Candiero	-	- S	Monarca	CN	- -	MS/BR 34 (Empaer 10)	CN	SO S
BRS Guapa	-	- S	M-SOY 109	CN	SO S	M-SOY 8914	CN	- -
BRMSMS Acará <sup>4</sup>	-	SO S	M-SOY 8400	CN	SO S	M-SOY 9001	CN	- -
BRMSMS Apaiari	-	- S	M-SOY 8411	CN	SO S	M-SOY 9010	CN	- -
BRMSMS Bacuri	CN	SO S	M-SOY 8800	CN	- -	M-SOY 9030	CN	- -
BRMSMS Carandá	CN	SO S	MT/BR 45 (Paiaguás)	CN	SO S	*****	**	** **
BRMSMS Lambari	CN	SO S	OC 16 <sup>3</sup>	CN	SO S			
BRMSMS Piapara	CN	SO S	Performa <sup>3</sup>	CN	- -			

Continua...

Grupo Precoce/Médio				Grupo Semitardio				Grupo Tardio			
Cultivar		Região		Cultivar		Região		Cultivar		Região	
...Continuação Tabela 5.3											
BRSMS Sauá <sup>4</sup>	-	SO	S	P98C81	CN	SO	S	-	-	-	-
CD 201	CN	-	S	P98N71	CN	SO	S				
CD 202	-	-	S	P98N82	CN	SO	S				
CD 204	CN <sup>2</sup>	-	S	Santa Rosa	CN	SO	S				
CD 205	-	-	S	Suprema	CN	SO	-				
CD 206	-	-	S	*****	**	**	**				
CD 208	-	-	S								
CD 209	-	-	S								
CD 213RR <sup>1</sup>	-	-	S								
CD 214RR <sup>1</sup>	-	-	S								
CD 215 <sup>2</sup>	-	-	S								
CD 216	CN <sup>2</sup>	SO <sup>2</sup>	S								
CD 217	CN	SO	S								
CD 218	-	-	S								
CD 219RR <sup>1</sup>	CN	-	S								
CD 221 <sup>1</sup>	-	-	S								
CS 801 <sup>1</sup>	CN	-	-								
CS 821 <sup>1</sup>	CN	-	-								
CS 935142	CN	SO	S								
Embrapa 48	-	-	S								

Continua...

Grupo Precoce/Médio			Grupo Semitardio				Grupo Tardio		
Cultivar	Região		Cultivar	Região		Cultivar	Região		
...Continuação Tabela 5.3									
FT 5 (Formosa)	-	SO	S	-	-	-	-	-	
IAS 5	-	SO	S						
ICA 4	CN	SO	S						
ICA 6 <sup>4</sup>	CN	SO	S						
ICASC 1	CN	SO	S						
MS/BR 19 (Pequi)	CN	SO	S						
M-SOY 2002	-	-	S						
M-SOY 5942	-	-	S						
M-SOY 6302	-	-	S						
M-SOY 6402	-	-	S						
M-SOY 7101	-	-	S						
M-SOY 7201	-	-	S						
M-SOY 7501	-	-	S						
M-SOY 7602	-	-	S						
M-SOY 7603	-	-	S						
M-SOY 7701	-	-	S						
M-SOY 7901	CN	SO	S						
M-SOY 8001	CN	SO	S						
M-SOY 8200	CN	-	-						
M-SOY 8757	CN	-	-						

Continua...

Grupo Precoce/Médio			Grupo Semitardio				Grupo Tardio		
Cultivar		Região	Cultivar		Região		Cultivar		Região
...Continuação Tabela 5.3									
NK412113	-	-	S	-	-	-	-	-	-
OC 13 <sup>3</sup>	-	-	S						
P98C21	CN	SO	S						
P98N41	CN	SO	S						
Spring <sup>1</sup>	-	-	S						
UFV/ITM 1	CN	SO	S						

<sup>1</sup> Cultivar em lançamento.

<sup>2</sup> Cultivar em extensão de indicação.

<sup>3</sup> Cultivar a ser excluída de indicação em 2006.

<sup>4</sup> Cultivar não constante do Registro Nacional de Cultivares em 09/09/2005.

**Notas:** - Regiões: CN = centro-norte; SO = sudoeste; S = sul.

- A denominação anterior da cultivar UFUS Impacta era UFU 801.

- Foram excluídas de indicação para o Estado de Mato Grosso do Sul, em 2005, as cultivares BR 6 (Nova Bragg), BR 9 (Savana), BR 37, BRS 65, Embrapa 4 (BR 4 RC), Embrapa 64 (Ponta Porã), FT 10 (Princesa), FT 18 (Xavante), FT 20 (Jaú), FT 101, FT 107, FT 2000, FT 2001, FT Abyara, FT Cristalina, FT Cristalina RCH, FT Estrela, FT Jatobá, FT Líder, FT Maracaju, M-SOY 108, M-SOY 6401, M-SOY 7001, M-SOY 7204, M-SOY 7518 e M-SOY 8720.

**Tabela 5.4.** Cultivares de soja inscritas no Registro Nacional de Cultivares e indicadas para o Estado de Minas Gerais - Safra 2005/06.

Grupo de maturação			
Semiprecoce (101 a 110 dias)	Médio (111 a 125 dias)	Semitardio (126 a 145 dias)	Tardio ( > 145 dias)
A 7001 <sup>1</sup>	BRS 217 [Flora]	A 7002	BRS Celeste
A 7005 <sup>1</sup>	BRS 218 [Nina]	BRS 252 [Serena]	BRS Nova Savana
CD 204 <sup>2</sup>	BRS Favorita RR <sup>1</sup>	BRS Carla	BRS Pétala
CD 205	BRS Rosa	BRS Milena	BRS Raimunda
CD 217	BRSGO 204 [Goiânia]	BRS Valiosa RR <sup>1</sup>	BRSGO Amaralina
CS 935142	BRSGO Caiapônia	BRSGO Indiara	BRSGO Chapadões
DM 118	BRSGO Iara <sup>1</sup>	BRSGO Raíssa <sup>2</sup>	BRSGO Ipameri
DM Rainha	BRSMG 68 [Vencedora]	BRSMG 250 [Nobreza]	BRSGO Jataí
Emgopa 316	BRSMG Liderança	BRSMG 251 [Robusta]	BRSGO Luziânia
M-SOY 2002 <sup>5</sup>	CD 211	BRSMT Pintado	BRSGO Paraíso
M-SOY 6101	CD 222 <sup>1</sup>	CAC 1	BRSGO Santa Cruz
M-SOY 7901 <sup>5</sup>	CS 201	Emgopa 315 (Rio Vermelho)	BRSMG Garantia
M-SOY 8001	CS 801 <sup>1</sup>	MG/BR 46 (Conquista)	BRSMT Uirapuru
OC 16	CS 821 <sup>1</sup>	Monarca	DM 309
P98C21	DM 247	M-SOY 8757	DM 339
P98N41	DM Soberana	M-SOY 8800	DM Nobre
UFV 20 (Florestal)	FMT Tucunaré	M-SOY 8914	DM Vitória
	M-SOY 109	P98C81	Elite
	M-SOY 8400	P98N71	Emgopa 313

Continua...

Grupo de maturação			
Semiprecoce (101 a 110 dias)	Médio (111 a 125 dias)	Semitardio (126 a 145 dias)	Tardio ( > 145 dias)
...Continuação Tabela 5.4			
—	M-SOY 8411	P98N82	M-SOY 9010
	M-SOY 8550	Performa	M-SOY 9030
	UFU Futura <sup>1</sup>	Suprema	UFV 18 (Patos de Minas)
	UFUS Riqueza <sup>6</sup>	UFU Milionária	UFVS 2003
	UFV-16 (Capinópolis)	UFUS Impacta <sup>6</sup>	UFVS 2004
	UFV 19 (Triângulo)	UFV 17 (Minas Gerais)	UFVS 2005
	UFVS 2001	UFVS 2002	UFVS 2010
	UFVS 2006 <sup>4</sup>	UFVS 2017	UFVS 2011
	UFVS 2008	UFVS 2018	UFVTN 102
	UFVS 2009	UFVTN 101	UFVTN 104
	UFVS 2013	UFVTN 103	*****
	*****	UFVTN 105 <sup>6</sup>	
		UFVTNK 106 <sup>6</sup>	

<sup>1</sup> Cultivar em lançamento.

<sup>2</sup> Cultivar em extensão de indicação.

<sup>3</sup> Cultivar a ser excluída de indicação em 2006.

<sup>4</sup> Indicada para cultivo ao sul do paralelo 18° S.

<sup>5</sup> Indicada para cultivo apenas na região oeste do estado (Triângulo).

<sup>6</sup> Cultivar não constante no Registro Nacional de Cultivares em 09/09/2005.

**Notas:** - Foram excluídas de indicação para o Estado de Minas Gerais, em 2005, as cultivares BR 9 (Savana), BR 16, BR/IAC 21, BRSMG Confiança, BRSMG Renascença, BRSMG Segurança, Embrapa 20 (Doko RC), FT 104, FT 107, FT 2000, FT 2001, FT Cristalina RCH, FT Estrela, FT Líder, MG/BR 48 (Garimpo RCH), M-SOY 108, M-SOY 8015, M-SOY 8110, M-SOY 8720 e MT/BR 45 (Paiaguás).

- A denominação anterior da cultivar UFUS Riqueza era UFU 501 e a da UFUS Impacta era UFU 801.

**Tabela 5.5.** Cultivares de soja inscritas no Registro Nacional de Cultivares e indicadas para o Estado de Goiás e o Distrito Federal - Safra 2005/06.

Grupo de maturação		
Precoce (até 125 dias)	Médio (126 a 140 dias)	Tardio (> de 140 dias)
A 7001 <sup>1,7</sup>	A 7002	BR/Emgopa 314 (Garça Branca)
A 7005 <sup>1,7</sup>	BR/IAC 21 <sup>4</sup>	BRS 252 [Serena]
BR 4 <sup>6</sup>	BRS Carla <sup>4</sup>	BRS Aline <sup>8</sup>
BRS 217 [Flora]	BRS Eva <sup>8</sup>	BRS Celeste <sup>4</sup>
BRS 218 [Nina]	BRS Milena	BRS Diana <sup>8</sup>
BRS Rosa	BRS Valiosa RR <sup>1</sup>	BRS Marina <sup>8</sup>
BRSGO 204 [Goiânia]	BRSGO Indiará	BRS Nova Savana
BRSGO Caiapônia	BRSGO Luziânia	BRS Pétala
BRSGO Iara <sup>1</sup>	BRSGO Raíssa	BRS Raimunda
BRSGO Mineiros	BRSGO Santa Cruz	BRS Sambaíba
BRSMG 68 [Vencedora]	BRSMG Garantia	BRSGO Amaralina
BRSMG Liderança	BRSMT Crixás	BRSGO Bela Vista
BRSMG 250 [Nobreza]	BRSMT Pintado <sup>5</sup>	BRSGO Catalão <sup>3</sup>
CD 204 <sup>5</sup>	CAC 1	BRSGO Chapadões
CD 217 <sup>5</sup>	CD 211 <sup>5</sup>	BRSGO Goiatuba
CD 219RR <sup>1,5</sup>	CD 222 <sup>1</sup>	BRSGO Ipameri
CS 201	CS 801 <sup>1,5</sup>	BRSGO Jataí

Continua...

Grupo de maturação		
Precoce (até 125 dias)	Médio (126 a 140 dias)	Tardio (> de 140 dias)
...Continuação Tabela 5.5		
CS 935142	CS 821 <sup>1,5</sup>	BRSO Paraíso
DM 118 <sup>4</sup>	DM 247	BRSMG 251 [Robusta]
DM Rainha <sup>4</sup>	DM Soberana	BRSMT Uirapuru <sup>5</sup>
Emgopa 302 <sup>4</sup>	Emgopa 315 (Rio Vermelho) <sup>4</sup>	DM 309
Emgopa 304 (Campeira) <sup>3,4</sup>	FMT Tucunaré <sup>5</sup>	DM 339
Emgopa 309 (Goiana) <sup>3,4</sup>	MG/BR 46 (Conquista)	DM Nobre
Emgopa 316 <sup>4</sup>	Monarca	DM Vitória
IAS 5 <sup>6</sup>	M-SOY 109	Elite <sup>5</sup>
M-SOY 2002 <sup>4</sup>	M-SOY 8200	Embrapa 20 (Doko RC)
M-SOY 6101 <sup>4</sup>	M-SOY 8400	Emgopa 313
M-SOY 7901 <sup>4</sup>	M-SOY 8411	FT 106
M-SOY 8001 <sup>4</sup>	M-SOY 8550	M-SOY 8757
P98C21	Performa <sup>3</sup>	M-SOY 8800
P98N41	Suprema	M-SOY 9001
UFV 16 (Capinópolis) <sup>5</sup>	UFV 17 (Minas Gerais) <sup>5</sup>	M-SOY 9010
*****	UFV 19 (Triângulo) <sup>5</sup>	M-SOY 9030
	UFVS 2001 <sup>5</sup>	M-SOY 9350
	*****	P98C81
		P98N71

Continua...

Grupo de maturação		
Precoce (até 125 dias)	Médio (126 a 140 dias)	Tardio (> de 140 dias)
...Continuação Tabela 5.5		
-	-	P98N82 UFUS Impacta <sup>2</sup> UFUS Milionária* <sup>2</sup> UFV 18 (Patos de Minas) UFVS 2003 <sup>5</sup>

<sup>1</sup> Cultivar em lançamento.

<sup>2</sup> Cultivar em extensão de indicação.

<sup>3</sup> Cultivar a ser excluída de indicação em 2006.

<sup>4</sup> Cultivar indicada apenas para a região sul de Goiás e o Distrito Federal (latitude maior que 15° S).

<sup>5</sup> Cultivar indicada apenas para o Estado de Goiás.

<sup>6</sup> Cultivar indicada apenas para a região sudeste de Goiás (Quirinópolis, Gouvelândia e Acreúna).

<sup>7</sup> Cultivar indicada apenas para as regiões sudoeste e leste de Goiás.

<sup>8</sup> Cultivar não constante do Registro Nacional de Cultivares em 09/09/2005.

**Notas:** - Foram excluídas de indicação para o Estado de Goiás e o Distrito Federal, em 2005, as cultivares BR 9 (Savana), Embrapa 1 (IAS 5 RC), Embrapa 4 (BR 4 RC), FT 104, FT 107, FT 2000, FT 2001, FT Cristalina RCH, FT Estrela, MG/BR 48 (Garimpo RCH), M-SOY 108, M-SOY 8110, M-SOY 8720 e M-SOY 8757.

- A denominação anterior da cultivar UFUS Impacta era UFU 801.

**Tabela 5.6.** Cultivares de soja inscritas no Registro Nacional de Cultivares e indicadas para o Estado do Mato Grosso - Safra 2005/06.

Grupo de maturação		
Precoce/Semiprecoce	Médio	Semitardio/Tardio
A 7001 <sup>1</sup>	A 7002	BR/Emgopa 314 (Garça Branca)
A 7005 <sup>1</sup>	BR/IAC 21	BRS Aurora
BRS 217 [Flora]	BRS 252 [Serena]	BRS Celeste
BRS 218 [Nina]	BRS Apiakás <sup>5</sup>	BRS Curicaca <sup>3</sup>
BRS Milena	BRS Bororo <sup>5</sup>	BRS Gralha
BRS Rosa	BRS Jiripoca	BRS Nova Savana
BRSGO Caiapônia	BRS Piraíba	BRS Pétala
BRSGO Santa Cruz	BRSGO 204 [Goiânia]	BRS Pirarara
BRSMG 68 [Vencedora]	BRSGO Bela Vista	BRS Raimunda
BRSMG 250 [Nobreza]	BRSGO Luziânia	BRS Sambaíba
BRSMG Liderança	BRSMT Pintado	BRS Seleta
BRSMG Segurança	CAC 1 <sup>3</sup>	BRS Tianá <sup>1</sup>
CD 211	CD 204 <sup>2</sup>	BRSGO Chapadões
CD 217	DM Vitória	BRSGO Ipameri
CD 219RR <sup>1</sup>	Emgopa 315 (Rio Vermelho)	BRSGO Jataí
CD 222 <sup>1,4</sup>	FMT Cachara <sup>5</sup>	BRSGO Paraíso
CS 201	FMT Tabarana	BRSMG 251 [Robusta]
CS 935142	FMT Tucunaré	BRSMG Garantia

Continua...

Grupo de maturação		
Precoce/Semiprecoce	Médio	Semitardio/Tardio
...Continuação Tabela 5.6		
DM 118	Monarca	BRSMT Uirapuru
DM 247	M-SOY 8400	DM 309
DM Soberana	M-SOY 8411	DM 339
Emgopa 316	M-SOY 8550	DM Nobre
FMT Matrinxã	M-SOY 8757	Elite
ICA 6 <sup>5</sup>	MT/BR 45 (Paiguás)	Embrapa 20 (Doko RC) <sup>3</sup>
ICASC 1 <sup>4</sup>	MT/BR 50 (Parecis)	Emgopa 313
KI-S 801	MT/BR 51 (Xingu)	FMT Anhumas <sup>5</sup>
MG/BR 46 (Conquista)	Performa <sup>3</sup>	FMT Arara Azul
M-SOY 109	SL 8801 <sup>4,5</sup>	FMT Beija-Flor
M-SOY 8200	SL 8802 <sup>4,5</sup>	FMT Kaíabi
P98C21	Suprema	FMT Maritaca
P98N41	UFU Imperial <sup>1,5</sup>	FMT Mutum
RB 604	UFV 17 (Minas Gerais)	FMT Nambu
UFV 16 (Capinópolis)	UFVS 2002	FMT Perdiz
UFV 19 (Triângulo)	UFVS 2003	FMT Sabiá
UFVS 2014 <sup>5</sup>	UFVS 2004	FMT Saíra
*****	UFVS 2201 <sup>5</sup>	FT 106
	UFVS 2202 <sup>5</sup>	FT Cristalina RCH
	UFVS 2203 <sup>5</sup>	ICASC 2

Continua...

Precoce/Semiprecoce	Grupo de maturação	
	Médio	Semitardio/Tardio
...Continuação Tabela 5.6		
-	-	ICASC 3
		ICASC 4
		M-SOY 8914
		M-SOY 9001
		M-SOY 9010
		M-SOY 9030
		M-SOY 9350
		MT/BR 47 (Canário) <sup>3</sup>
		MT/BR 52 (Curió)
		MT/BR 53 (Tucano)
		P98C81
		P98N71
		P98N82
		SL 8901 <sup>5</sup>
		SL 8902 <sup>5</sup>
		UFU Milionária <sup>2,5</sup>
		UFU Impacta <sup>2,5</sup>
		UFV 18 (Patos de Minas)
		UFVS 2007

Continua...

Precoce/Semiprecoce	Grupo de maturação	
	Médio	Semitardio/Tardio
...Continuação Tabela 5.6		
-	-	UFVS 2015 <sup>5</sup>
		UFVS 2016 <sup>5</sup>
		UFVS 2301 <sup>5</sup>
		UFVS 2302 <sup>5</sup>
		UFVS 2303 <sup>5</sup>

<sup>1</sup> Cultivar em lançamento.

<sup>2</sup> Cultivar em extensão de indicação.

<sup>3</sup> Cultivar a ser excluída de indicação em 2006.

<sup>4</sup> Cultivar indicada apenas para a região sul do estado (latitude maior que 15° S).

<sup>5</sup> Cultivar não constante no Registro Nacional de Cultivares em 09/09/2005.

**Notas:** - Foram excluídas de indicação para o Estado de Goiás e o Distrito Federal, em 2005, as cultivares FT 101, FT 103, FT 104, FT 107, FT 2000, FT Estrela, M-SOY 108, M-SOY 8110, M-SOY 8605, M-SOY 8720 e M-SOY 8998.

- A denominação anterior da cultivar UFUS Impacta era UFU 801.

**Tabela 5.7.** Cultivares de soja inscritas no Registro Nacional de Cultivares e indicadas para o Estado de Rondônia - Safra 2005/06.

Grupo de maturação		
Precoce (até 110 dias)	Médio (111 a 125 dias)	Tardio (> 125 dias)
MG/BR 46 (Conquista) *****	BR/Emgopa 314 (Garça Branca) Embrapa 20 (Doko RC) <sup>3</sup> Emgopa 313 MT/BR 50 (Parecis) MT/BR 51 (Xingu) MT/BR 53 (Tucano) *****	BRS Aurora BRS Pirarara BRS Seleta BRS Tianá <sup>1</sup> BRSMT Uirapuru ICASC 4 MT/BR 47 (Canário) <sup>3</sup> MT/BR 52 (Curió)

<sup>1</sup> Cultivar em lançamento.<sup>2</sup> Cultivar em extensão de indicação (não há em 2005/06).<sup>3</sup> Cultivar a ser excluída de indicação em 2006.

**Tabela 5.8.** Cultivares de soja inscritas no Registro Nacional de Cultivares e indicadas para o Estado de Tocantins - Safra 2005/06.

Grupo de maturação		
Precoce (até 120 dias)	Médio (121 a 135 dias)	Tardio ( > 135 dias)
A 7005 <sup>1,5</sup>	A 7002 <sup>4</sup>	BRS Babaçu <sup>5</sup>
BR/IAC 21	BR/Emgopa 314 (Garça Branca)	BRS Carnaúba <sup>1,5,6</sup>
BRS 219 [Boa Vista] <sup>5</sup>	BRS Candeia <sup>5</sup>	BRS Sambaíba <sup>5</sup>
BRS Milena	BRS Celeste	BRSGO Chapadões
BRS Tracajá <sup>5</sup>	BRS Juçara <sup>5</sup>	BRSGO Paraíso
BRSGO 204 [Goiânia]	BRS Pétala	BR SMA Seridó RCH <sup>5</sup>
BRSGO Jataí	BRS Raimunda	DM 309 <sup>4</sup>
BRSGO Santa Cruz	BRSGO Bela Vista <sup>4</sup>	DM 339 <sup>4</sup>
BR SMA Pati <sup>5</sup>	BRSGO Goiatuba	DM Nobre <sup>4</sup>
EMGOPA 313	BRSGO Ipameri	DM Vitória <sup>4</sup>
MG/BR 46 (Conquista) <sup>4</sup>	BRSGO Luziânia	ICASC 4
M-SOY 8550 <sup>4</sup>	DM Soberana <sup>4</sup>	M-SOY 9350 <sup>4</sup>
*****	Embrapa 20 (Doko RC)	*****
	Emgopa 305 (Caraíba)	
	Emgopa 308 (Serra Dourada)	
	FT 106 <sup>4</sup>	
	M-SOY 9001 <sup>4</sup>	

Continua ...

Grupo de maturação		
Precoce (até 120 dias)	Médio (121 a 135 dias)	Tardio ( > 135 dias)
...Continuação Tabela 5.8		
—	M-SOY 9010 <sup>4</sup>	—
	P98N71	
	P98C81	
	P98N82	
	Suprema <sup>4</sup>	

<sup>1</sup> Cultivar em lançamento.

<sup>2</sup> Cultivar em extensão de indicação (não há em 2005/06).

<sup>3</sup> Cultivar a ser excluída de indicação em 2006 (não há).

<sup>4</sup> Cultivar indicada para a micro-região de Gurupi.

<sup>5</sup> Cultivar indicada para a micro-região de Pedro Afonso.

<sup>6</sup> Cultivar não constante no Registro Nacional de Cultivares em 09/09/2005.

**Nota:** Foram excluídas de indicação para o Estado de Tocantins, em 2005, as cultivares BRSMA Parnaíba, Embrapa 63 (Mirador), FT 107, FT Cristalina RCH, M-SOY 108 e M-SOY 8998.

**Tabela 5.9.** Cultivares de soja inscritas no Registro Nacional de Cultivares e indicadas para o Estado da Bahia - Safra 2005/06.

	Grupo de maturação		
	Médio (até 120 dias)	Semitardio (121 a 130 dias)	Tardio (> 130 dias)
A 7002		BR/Emgopa 314 (Garça Branca)	BRS Barreiras
BRS 217 [Boa Vista]		BRS 263 [Diferente] <sup>1</sup>	BRS Raimunda
BRS Carla		BRS Celeste	BRS Sambaíba
BRS Corisco		BRSGO Amaralina	BRSGO Paraíso
BRSGO 204 [Goiânia]		BRSGO Goiatuba	BRSMG Garantia
BRSGO Caiapônia		BRSGO Ipameri	BRSMT Uirapuru
BRSGO Luziânia		BRSGO Jataí	DM 309
BRSMG 250 [Nobreza]		BRSGO Raíssa <sup>2</sup>	DM 339
BRSMG Segurança		BRSGO Santa Cruz	DM Nobre
BRSMS Piracanjuba		BRSMG 68 [Vencedora]	Elite
BRSMT Crixás		BRSMG Liderança	FT 106
CAC 1		BRSMG 251 [Robusta]	ICASC 4
DM 247		Embrapa 20 (Doko RC)	M-SOY 9001
DM Soberana		ICASC 2	M-SOY 9010
DM Vitória		ICASC 3	M-SOY 9350
Emgopa 315 (Rio Vermelho)		M-SOY 8914	MT/BR 52 (Curió)
ICA 6 <sup>4</sup>		MT/BR 53 (Tucano)	P98N71

Continua...

	Grupo de maturação		
	Médio (até 120 dias)	Semitardio (121 a 130 dias)	Tardio (> 130 dias)
...Continuação Tabela 5.9			
ICASC 1	P98C81		P98N82
MG/BR 46 (Conquista)		*****	*****
Monarca			
M-SOY 109			
M-SOY 8411			
M-SOY 8550			
MT/BR 50 (Parecis)			
MT/BR 51 (Xingu)			
Performa <sup>3</sup>			
Suprema			
UFV 18 (Patos de Minas)			

<sup>1</sup> Cultivar em lançamento.

<sup>2</sup> Cultivar em extensão de indicação.

<sup>3</sup> Cultivar a ser excluída de indicação em 2006.

<sup>4</sup> Cultivar não constante no Registro Nacional de Cultivares em 09/09/2005.

**Nota:** Foram excluídas de indicação para o Estado da Bahia, em 2005, as cultivares Embrapa 63 (Mirador), FT 103, FT 104, FT 107, FT 2000, FT Estrela, M-SOY 108 e M-SOY 8998.

**Tabela 5.10.** Cultivares de soja inscritas no Registro Nacional de Cultivares e indicadas para o Estado do Maranhão - Safra 2005/06.

	Grupo de maturação		
	Precoce (até 110 dias)	Médio (111 a 125 dias)	Tardio ( > 125 dias)
A 7002		BRS Candeia	BRS Babaçu
BRS 219 [Boa Vista]		BRS Carnaúba <sup>1,4</sup>	BRSMA Seridó RCH
BRS Tracajá		BRS Juçara	DM 309
BRSMA Pati		BRS Sambaíba	DM 339
DM Soberana		DM Vitória	DM Nobre
Embrapa 20 (Doko RC) <sup>3</sup>		FT 106	ICASC 4
Emgopa 308 (Serra Dourada)		ICASC 2	M-SOY 9350
ICA 6 <sup>4</sup>		ICASC 3	P98C81
Suprema		M-SOY 9001	*****
*****		M-SOY 9010	

<sup>1</sup> Cultivar em lançamento.

<sup>2</sup> Cultivar em extensão de indicação (não há em 2005/06).

<sup>3</sup> Cultivar a ser excluída de indicação em 2006.

<sup>4</sup> Cultivar não constante no Registro Nacional de Cultivares em 09/09/2005.

**Nota:** Foram excluídas de indicação para o Estado do Maranhão, em 2005, as cultivares BRSMA Parnaíba, Embrapa 63 (Mirador), FT 104, FT 107, FT Cristalina RCH e M-SOY 108.

**Tabela 5.11.** Cultivares de soja inscritas no Registro Nacional de Cultivares e indicadas para o Estado do Piauí - Safra 2005/06.

	Grupo de Maturação		
	Precoce (até 110 dias)	Médio (111 a 125 dias)	Tardio (> 125 dias)
BRS 219 [Boa Vista]		BRS Candeia	BRS Babaçu
BRS Tracajá		BRS Carnaúba <sup>1, 4</sup>	BRSMA Seridó RCH
BRSMA Pati		BRS Juçara	M-SOY 9350
Suprema		BRS Sambaíba	*****
*****		FT 106	
		M-SOY 9001	
		M-SOY 9010	

<sup>1</sup> Cultivar em lançamento.

<sup>2</sup> Cultivar em extensão de indicação (não há em 2005/06).

<sup>3</sup> Cultivar a ser excluída de indicação em 2006 (não há).

<sup>4</sup> Cultivar não constante no Registro Nacional de Cultivares em 09/09/2005.

**Nota:** Foram excluídas de indicação para o Estado do Piauí, em 2005, as cultivares BRSMA Parnaíba, Embrapa 63 (Mirador), FT 104, FT 107, FT Cristalina RCH e M-SOY 108.

**Tabela 5.12.** Cultivares de soja inscritas no Registro Nacional de Cultivares e indicadas para o Estado do Pará - Safra 2005/06.

Grupo de maturação		
Precoce (até 110 dias)	Médio (111 a 125 dias)	Tardio ( > 125 dias)
BRS Tracajá <sup>4, 5, 6</sup> *****	BRS Candeia <sup>5</sup> BRS Carnaúba <sup>1, 4, 5, 6, 7</sup> BRS Sambaíba <sup>4, 5, 6</sup>	BRS Babaçu <sup>5, 6</sup> BR SMA Seridó RCH <sup>4, 5, 6</sup> *****

<sup>1</sup> Cultivar em lançamento.

<sup>2</sup> Cultivar em extensão de indicação (não há em 2005/06).

<sup>3</sup> Cultivar a ser excluída de indicação em 2006 (não há).

<sup>4</sup> Cultivar indicada para a região sul do estado (Redenção).

<sup>5</sup> Cultivar indicada para a região nordeste do estado (Paragominas).

<sup>6</sup> Cultivar indicada para a região oeste do estado (Santarém).

<sup>7</sup> Cultivar não constante no Registro Nacional de Cultivares em 09/09/2005.

**Nota:** Foi excluída de indicação para o Estado do Pará, em 2005, a cultivar Embrapa 63 (Mirador).

**Tabela 5.13.** Cultivares de soja inscritas no Registro Nacional de Cultivares e indicadas para o Estado de Roraima - Safra 2005/06.

Grupo de maturação		
Precoce (até 105 dias)	Médio (106 a 115 dias)	Tardio ( > 115 dias)
BRS 219 [Boa Vista]	BR/Emgopa 314 (Garça Branca)	—
BRS Celeste	BRS Tracajá	
BRS Raimunda <sup>2</sup>	BRSMG Nova Fronteira <sup>3</sup>	
BRS Sambaíba	MG/BR 46 (Conquista)	
BRS GO Luziânia	*****	
BRSMA Pati		

<sup>1</sup> Cultivar em lançamento (não há em 2005/06) .

<sup>2</sup> Cultivar em extensão de indicação.

<sup>3</sup> Cultivar a ser excluída de indicação em 2006 (não há).

**Nota:** Foram excluídas de indicação para o Estado de Roraima, em 2005, as cultivares BRSMA Parnaíba e Embrapa 63 (Mirador).



# 6

## Tecnologia de Sementes e Colheita

---

No Brasil, dois sistemas de produção de sementes operam integrados nos diversos estados, o de certificação e o de fiscalização, que ofertam sementes certificadas e fiscalizadas, respectivamente. Nessas duas classes de sementes, a qualidade é garantida através de padrões mínimos de germinação, purezas física e varietal e sanidade, exigidos por normas de produção e comercialização estabelecidas e controladas pelo governo.

### 6.1 Qualidade da semente

Na compra de sementes, indica-se que o agricultor conheça a qualidade do produto que está adquirindo. Para isso, existem laboratórios oficiais e particulares de análise de sementes que podem prestar esse tipo de serviço, informando a germinação, as purezas física e varietal e a qualidade sanitária da semente.

Outra maneira de conhecer a qualidade do produto que se está adquirindo é consultando os documentos que atestam a qualidade das sementes, que são o Boletim de Análise de Sementes, o Atestado de Origem Genética, o Certificado de Sementes, ou o Termo de Conformidade das sementes produzidas, que podem ser fornecidos pelo produtor ou comerciante das mesmas. Esses documentos transcrevem as informações dos resultados oficiais de análise de semente, que têm validade de seis meses, após a data de análise. Ao consultar esses documentos, o agricultor deve prestar atenção às informações referentes à germinação (%), pureza [semente pura (%), material inerte (%), outras sementes (%)]. Nesse último item, observar os índices de semente de outra espécie cultivada, de semente silvestre, de semente nociva tolerada e de semente nociva

proibida. Além disso, observar também a verificação de sementes de outras cultivares. Esses valores devem estar de acordo com os padrões nacionais mínimos de qualidade de semente, estabelecidos para a soja, conforme constam na Tabela 6.1.

Além desses resultados, diversos produtores dispõem de resultados de análises complementares e os resultados podem também ser solicitados para facilitar a escolha dos lotes de sementes a serem adquiridos, como por exemplo o teste de emergência em campo em condições ideais de umidade e de temperatura de solo. Alguns produtores dispõem também de resultados de testes de vigor, como por exemplo, o de tetrazólio e o de envelhecimento acelerado. Esses resultados são de grande valia, visando à aquisição de sementes que comprovadamente apresentam boa qualidade.

## 6.2 Armazenamento das sementes

Após a aquisição, as sementes são armazenadas na propriedade, até a época de semeadura. As sementes, como ser biológico, devem receber todos os cuidados necessários para se manterem vivas e apresentarem boa germinação e emergência no campo. Assim sendo, devem ser tomados cuidados especiais no seu armazenamento, tais como:

- ♦ armazenar as sementes em galpão bem ventilado, sobre estrados de madeira;
- ♦ não empilhar as sacas de sementes contra as paredes do galpão;
- ♦ não armazenar sementes juntamente com adubo, calcário ou agroquímicos;
- ♦ o ambiente de armazenagem deve estar livre de fungos e roedores; e
- ♦ dentro do armazém a temperatura não deve ultrapassar 25°C e a umidade relativa não deve ultrapassar 70%.

Caso essas condições não sejam possíveis na propriedade, indica-se que o agricultor somente retire a semente do armazém do seu fornecedor o mais próximo possível da época de semeadura.

**Tabela 6.1.** Padrões nacionais para a comercialização de sementes de soja.

1.Espécie:	Soja			
Nome científico:	<i>Glycine max</i> L. Merrill			
2.Peso máximo do lote (kg):	.			
3.Peso mínimos das amostras (g)	25.000			
- Amostra submetida ou média	1.000			
- Amostra de trabalho para análise de pureza	500			
- Amostra de trabalho para determinação de outras sementes por número	1.000			
4.Padrão de semente				
Parâmetros	Padrões			
Categorias	Básica	C1 <sup>1</sup>	C2 <sup>2</sup>	S1 <sup>3</sup> ou S2 <sup>4</sup>
Pureza				
- Semente pura (% mínima)	99,0	99,0	99,0	99,0
- Material inerte <sup>5</sup> (%)	-	-	-	-
- Outras sementes (% máxima)	zero	0,05	0,08	0,1
Determinação de outras sementes por número (nº máximo):				
- Semente de outra espécie cultivada <sup>6</sup>	zero	zero	1	2
- Semente silvestre <sup>6</sup>	zero	1	1	1
- Semente nociva tolerada <sup>7</sup>	zero	1	1	2
- Semente nociva proibida <sup>7</sup>	zero	zero	zero	zero
Verificação de outras cultivares por número <sup>8</sup> (nº máximo):	2	3	5	10
Germinação (% mínima)	75 <sup>9</sup>	80	80	80
Pragas <sup>10</sup>	-	-	-	-
5.Validade do teste de germinação (máxima em meses)	6	6	6	6

Continua...

6. Validade da reanálise do teste de germinação (máxima em meses)	3	3	3	3
7. Prazo máximo para solicitação de inscrição de campos (dias após o plantio)	30	30	30	30

<sup>1</sup> Semente certificada de primeira geração.

<sup>2</sup> Semente certificada de segunda geração.

<sup>3</sup> Semente de primeira geração.

<sup>4</sup> Semente de segunda geração.

<sup>5</sup> Relatar o percentual encontrado e a sua composição no Boletim de Análise de Sementes.

<sup>6</sup> Esta determinação de Outras Sementes por Número em Teste Reduzido será realizada em conjunto com a análise de pureza.

<sup>7</sup> Esta determinação será realizada em complementação à análise de pureza, observada a relação de sementes nocivas vigente.

<sup>8</sup> Esta determinação de Verificação de Outras Cultivares em Teste Reduzido será realizada em conjunto com a análise de pureza.

<sup>9</sup> A comercialização de semente básica poderá ser realizada com germinação até 10 pontos percentuais abaixo do padrão, desde que efetuada diretamente entre o produtor e o usuário e com o consentimento formal deste.

<sup>10</sup> Observar a lista de Pragas Quarentenárias A1 e A2 vigente no País.

<sup>11</sup> Excluído o mês em que o teste de germinação foi concluído.

### 6.3 Padronização da nomenclatura do tamanho das sementes, após classificação por tamanho

Tal nomenclatura deverá ter padrão nacional, conforme proposta formulada pela CESSOJA/PR e APASEM, a qual constará na sacaria e na nota fiscal de venda:

- ♦ Pzero - semente não classificada por tamanho;
- ♦ P 4,5 - P 4,75 - P 5,0 - P 5,25 - P 5,5 - P 5,75 - P 6,0 - P 6,25 - P 6,5 - P 6,75 - P 7,0. Será observado um intervalo máximo de 1,0 mm entre tais classes; por exemplo: P 5,5 significa que as sementes possuem diâmetro entre 5,5 e 6,5 mm, ou seja, tal classificação foi realizada com peneira com orifícios redondos, com as sementes passando pela peneira 6,5 e ficando retidas sobre a peneira 5,5. Para os produtores de sementes que adotam a classificação de sementes com a amplitude de 0,5 mm entre as classes de tamanho, a semente classificada como P 5,5 será aquela que possui diâmetro entre 5,5 e 6,0 mm, ou seja, essa classificação foi realizada com peneira com orifícios redondos, com as sementes passando pela peneira 6,0 e ficando retidas sobre a peneira 5,5.

### 6.4 Tratamento de sementes com fungicidas

O tratamento das sementes com fungicidas oferece garantia de melhor estabelecimento da população de plantas por controlar patógenos importantes transmitidos pelas sementes, diminuindo a chance de sua introdução em áreas indenes. As condições desfavoráveis à germinação e emergência da soja, especialmente a deficiência hídrica, tornam mais lento esse processo, expondo as sementes por mais tempo a fungos do solo, como *Rhizoctonia solani*, *Pythium* spp., *Fusarium* spp. e *Aspergillus* spp. (*A. flavus*), entre outros, que podem causar a sua deterioração ou a morte da plântula.

Os principais patógenos transmitidos pela semente de soja são: *Cercospora kikuchii*, *Cercospora sojina*, *Fusarium semitectum*, *Phomopsis*

spp. anamorfo de *Diaporthe* spp. e *Colletotrichum truncatum*. O melhor controle dos quatro primeiros patógenos citados é propiciado pelos fungicidas do grupo dos benzimidazóis. Dentre os produtos avaliados e indicados para o tratamento de sementes de soja, carbendazin, tiofanato metílico e thiabendazole são os mais eficientes no controle de *Phomopsis* spp., podendo assim ser considerados opção para o controle do agente do cancro da haste, em sementes, pois *Phomopsis* é a forma imperfeita de *Diaporthe*. Os fungicidas de contato tradicionalmente conhecidos (captan, thiram e tolylfluanid), que têm bom desempenho no campo quanto à emergência, não controlam, totalmente, *Phomopsis* spp. e *Fusarium semitectum* nas sementes que apresentam índices elevados desses patógenos (>40%).

Os fungicidas de contato e sistêmicos, indicados para o tratamento de sementes de soja são apresentados na Tabela 6.2.

A maioria das combinações de fungicidas quando aplicadas juntamente com *Bradyrhizobium* reduzem a sobrevivência das bactérias nas sementes, a nodulação e a eficiência de fixação biológica do nitrogênio. Cuidados especiais devem ser observados ao se efetuar junto essas duas práticas. Informações adicionais podem ser obtidas no Capítulo 7, itens 7.3, 7.4 e 7.5.

#### 6.4.1 Como realizar o tratamento

A função dos fungicidas de contato é proteger a semente contra fungos do solo e o dos fungicidas sistêmicos é controlar fitopatógenos presentes nas sementes. Assim, é importante que os fungicidas estejam em contato direto com a semente. O tratamento de semente com fungicidas, a aplicação de micronutrientes e a inoculação podem ser feitos de forma seqüencial, com máquinas específicas de tratar sementes, desde que essas disponham de tanques separados para os produtos, uma vez que foi proibida a mistura de agrotóxicos em tanque (Instrução Normativa 46/2002, de 24 de julho de 2002, que revoga a Portaria SDA Nº 67 de 30 de maio de 1995). (Fig. 6.1), tambor giratório (Fig. 6.2) ou com betoneiras.

**Tabela 6.2.** Fungicidas e respectivas doses, para o tratamento de sementes de soja. XXV Reunião de Pesquisa de Soja da Região Central do Brasil. Uberaba, MG. Agosto/2003.

Nome comum • Produto comercial <sup>2</sup>	Dose/100 kg de semente <sup>1</sup>
	Ingrediente ativo (gramas) • Produto comercial (g ou ml)
<b>I. Fungicidas de contato.....</b>	
Captan	90 g
• Captan 750 TS	• 120 g
Thiram	70 g (SC) ou 144 g (TS)
• Rhodiauran 500 SC	• 140 ml
• Thiram 480 TS	• 300 ml
Tolyfluanid	50 g
• Euparen M 500 PM	• 100 g
<b>II. Fungicidas sistêmicos.....</b>	
Carbendazin	30 g
• Derosal 500 SC	• 60 ml
Carbendazin + Thiram	30 g + 70 g
• Derosal Plus <sup>4</sup>	• 200 ml
• Protreat	• 200 ml
Carboxin + Thiram	75 g + 75 g ou 50 + 50 g
• Vitavax + Thiram PM <sup>4</sup>	• 200 g
• Vitavax + Thiram 200 SC <sup>3,4</sup>	• 250 ml
Difenoconazole	5 g
• Spectro	• 33 ml
Fludioxonil + Metalaxyl - M	2,5 g + 1,0 g
• Maxim XL <sup>4</sup>	• 100 ml
Thiabendazole	17 g
• Tecto 100 (PM e SC)	• 170 g ou 31 ml
Thiabendazole + Thiram	17 g + 70 g
• Tegram <sup>4</sup>	• 200 ml
Tiofanato metílico	70 g
• Cercobin 700 PM	• 100 g
• Cercobin 500 SC	• 140 ml
• Topsin 500 SC	• 140 ml

<sup>1</sup> As doses dos produtos isolados são aquelas para a aplicação seqüencial (fungicida de contato e sistêmico). Caso contrário utilizar a dose do rótulo.

<sup>2</sup> Poderão ser utilizadas outras marcas comerciais, desde que sejam mantidos a dose do ingrediente ativo e o tipo de formulação.

<sup>3</sup> Fazer o tratamento com pré-diluição, na proporção de 250 ml do produto + 250 ml de água para 100 kg de semente

<sup>4</sup> Misturas formuladas comercialmente e registradas no MAPA/DDIV/SDA.

CUIDADOS: devem ser tomadas precauções na manipulação dos fungicidas, seguindo as orientações da bula dos produtos.




Figura 6.1. Máquina de tratar sementes (adaptado de Grazmec).




Figura 6.2. Tambor giratório com eixo excêntrico para tratar sementes.

### 6.4.2 Tratamento utilizando máquinas de tratar sementes

Dentre as diversas vantagens que essas máquinas apresentam, em relação ao tratamento convencional (tambor), destacam-se:

- a) menor risco de intoxicação do operador, uma vez que os fungicidas são utilizados via líquida;
- b) melhores cobertura e aderência dos fungicidas, dos micronutrientes e do inoculante às sementes;
- c) rendimento em torno de 60 a 70 sacos por hora;
- d) maior facilidade operacional, já que o equipamento pode ser levado ao campo, pois possui engate para a tomada de força do trator.

O produtor deve tomar cuidado ao adquirir os fungicidas e os micronutrientes, optando por formulações líquidas ou pó que possibilitem que o volume final da mistura, fungicidas + micronutrientes, não ultrapasse 300 ml de calda por 50 kg de semente.

### 6.4.3 Tratamento utilizando tambor giratório ou betoneira

Quando for utilizado o tambor giratório, com eixo excêntrico, ou a betoneira, o tratamento poderá ser efetuado tanto via seca (fungicidas e micronutrientes em pó) ou via úmida (fungicidas e micronutrientes líquidos ou a combinação de uma formulação líquida com outra formulação pó, porém aplicados de forma seqüencial, evitando a mistura em tanque).

No caso do tratamento via seca, adicionar 300 ml de água por 50 kg de semente e dar algumas voltas no tambor ou na betoneira para umedecer uniformemente as sementes. Após essa operação, aplicar os fungicidas isoladamente (Tabela 6.2) e, em seguida, os micronutrientes, nas dosagens recomendadas, novamente o equipamento é rotacionado até que haja perfeita distribuição dos produtos nas sementes.

No caso do tratamento via líquida, ou seja, utilizando fungicidas e micronutrientes, ambos ou não, na forma líquida, em primeiro lugar, tomar o cuidado em utilizar produtos que contenham pouco líquido, ou seja, com no máximo 300 ml de solução por 50 kg de sementes, pois o excesso

de líquido pode causar danos às sementes, soltando o tegumento e prejudicando a germinação. Caso esse volume de líquido seja inferior a 300 ml de calda por 50 kg semente, acrescentar água para completar esse volume. Assim, o produtor deve usar os micro-nutrientes e os fungicidas, separadamente, em formulações que permitam rigoroso controle do volume final a ser adicionado às sementes.

Não se aconselha o tratamento da semente diretamente na caixa semeadora, devido à baixa eficiência (pouca aderência e cobertura desuniforme das sementes).

## **6.5 Seleção do local para produção de sementes**

Para a produção de sementes de alta qualidade, o ideal é que a temperatura média, durante as fases de maturação e colheita, seja igual ou inferior a 22°C.

Utilizar, preferencialmente, áreas com fertilidade elevada, pois níveis adequados de Ca e Mg exercem influência sobre o tecido de reserva da semente, além de interferirem na disponibilidade de outros nutrientes, no desenvolvimento de raízes e na nodulação. A deficiência de K e P reduz o rendimento de grãos, influencia negativamente na retenção de vagens, aumenta a incidência de patógenos, que também contribui para redução da qualidade da semente.

## **6.6 Avaliação da qualidade na produção de sementes - DIACOM (Diagnóstico Completo da Qualidade da Semente de Soja)**

Utilizar os testes de tetrazólio e patologia de sementes como método de avaliação da qualidade da semente, sempre que ocorrer baixa germinação, detectada pelas análises de rotina efetuada nos laboratórios credenciados. Informações adicionais sobre tais testes podem ser obtidas nas publicações da Embrapa Soja sobre o assunto (França-Neto et

al., 1998 - Documentos 116; Henning, 1996 - Documentos 90; França-Neto & Henning, 1992 - Circular Técnica 10).

Devido à possível ocorrência de chuvas freqüentes durante as fases de maturação e colheita da semente de soja, situação que pode ocorrer em diversas regiões produtoras brasileiras, poderá ser comum o problema de baixa germinação de sementes em laboratório, pelo método do rolo-de-papel. Tais problemas são ocasionados pelos altos índices de sementes infectadas por *Phomopsis* spp. e/ou por *Fusarium semitectum*. A presença de tais fungos infectando as sementes resulta em altos índices de plântulas infectadas e de sementes mortas no teste de germinação. Tal fato pode comprometer o sistema de avaliação de germinação adotado pelos laboratórios, uma vez que, em tal situação, lotes de boa qualidade podem apresentar baixa germinação, porém a emergência a campo e a viabilidade determinada pelo teste de tetrazólio podem ser elevadas. O uso dos testes de tetrazólio, de análise sanitária e de emergência em areia, conforme preconiza o DIACOM, evita a perda de lotes de boa qualidade, que normalmente seriam descartados, caso apenas o teste de germinação em substrato rolo-de-papel fosse utilizado.

## **6.7 Metodologia alternativa para o teste de germinação de sementes de soja**

Tal metodologia deverá ser aplicada para as cultivares de soja sensíveis ao dano de embebição, quando lotes de sementes dessas cultivares apresentar um elevado índice de plântulas anormais, maior que 6,0%, devido a anormalidades na radícula, durante a avaliação da germinação padrão, com substrato de rolo-de-papel. A adoção de tal procedimento alternativo visa evitar o descarte de lotes de boa qualidade.

Duas metodologias alternativas poderão ser utilizadas: a) realização do teste de germinação em substrato de areia, sem a necessidade do pré-condicionamento das sementes; b) realização do pré-condicionamento da amostra de semente em ambiente úmido, antes da semeadura em substrato rolo-de-papel. Para efeito de comercialização, deverão ser con-

siderados os lotes cujos incrementos em germinação sejam de no mínimo 6,0%. O pré-condicionamento consiste na colocação das sementes em "gerbox" com tela (do tipo utilizado no teste de envelhecimento acelerado), contendo 40 mL de água, pelo período de 16 a 24 horas a 25°C. Após o pré-condicionamento, as sementes são semeadas normalmente em rolo-de-papel, conforme prescrevem as Regras de Análise de Sementes.

## **6.8 Remoção de torrões para prevenir a disseminação do nematóide de cisto**

A disseminação do nematóide de cisto pode ocorrer através de torrões de solo infestados que possam contaminar os lotes de sementes. Esse modo de transmissão foi considerado como um dos mais importantes no início do processo de disseminação do nematóide de cisto nos Estados Unidos. A contaminação com os torrões ocorre durante a operação de colheita. Uma vez ocorrida, torna-se trabalhosa a sua separação das sementes.

A taxa de disseminação, através dos estoques de sementes, depende da quantidade de torrões no lote de semente, do número de cistos do nematóide e do número de nematóides (ovos e/ou juvenis) viáveis nos cistos.

A remoção dos torrões que acompanham a semente é uma forma de reduzir as chances de disseminação dessas pragas. Os torrões diferem da semente de soja em tamanho, forma e peso específico. A diferença em cada uma dessas características físicas pode ser utilizada pela máquina de ventilador e peneiras, separador em espiral e mesa de gravidade, nessa seqüência, objetivando a obtenção em nível de separação satisfatório.

Ressalva-se também que a eliminação completa dos torrões poderá não ser alcançada, remanescendo a possibilidade de sua disseminação, quando sementes oriundas de lavouras com suspeita de ocorrência do nematóide de cisto são semeadas em áreas indenens.

## 6.9 Colheita

A colheita constitui uma importante etapa no processo produtivo da soja, principalmente pelos riscos a que está sujeita a lavoura destinada ao consumo ou à produção de sementes.

A colheita deve ser iniciada tão logo a soja atinja o estágio R8 (ponto de colheita), a fim de evitar perdas na qualidade do produto.

### 6.9.1 Fatores que afetam a eficiência da colheita

Para reduzir perdas, é necessário que se conheçam as suas causas, sejam elas físicas ou fisiológicas. A seguir, são abordadas algumas das causas "indiretas" de perdas na colheita.

**Mau preparo do solo** - solo mal preparado pode causar prejuízos na colheita devido a desníveis no terreno que provocam oscilações na barra de corte da colhedora, fazendo com que ocorra corte em altura desuniforme e muitas vagens sejam cortadas ao meio e outras deixem de ser colhidas.

**Inadequação da época de semeadura, do espaçamento e da densidade** - a semeadura, em época pouco indicada, pode acarretar baixa estatura das plantas e baixa inserção das primeiras vagens. O espaçamento e/ou a densidade de semeadura inadequada podem reduzir o porte ou aumentar o acamamento, o que, conseqüentemente, fará com que ocorram maior perda na colheita.

**Cultivares não adaptadas** - o uso de cultivares não adaptadas a determinadas regiões pode prejudicar a operação de colheita, decorrente de características como baixa inserção de vagens e acamamento.

**Ocorrência de plantas daninhas** - a presença de plantas daninhas faz com que a umidade permaneça alta por muito tempo, prejudicando o bom funcionamento da colhedora e exigindo maior velocidade no cilindro de trilha, resultando em maior dano mecânico às sementes. Além disso, em lavouras infestadas, a velocidade de deslocamento deve ser reduzida, causando menor eficiência operacional pela menor capacidade efetiva de trabalho.

**Retardamento da colheita** - em lavouras destinadas à produção de sementes, muitas vezes a espera de menores teores de umidade para efetuar a colheita pode provocar a deterioração das sementes pela ocorrência de chuvas inesperadas e conseqüente elevação da incidência de patógenos. Quando a lavoura for destinada à produção de grãos, o problema não é menos grave, pois quanto mais seca estiver a lavoura, maior poderá ser a deiscência, havendo ainda casos de reduções acentuadas na qualidade do produto.

**Umidade inadequada** - a soja, quando colhida com teor de umidade entre 13% e 15%, tem minimizados os problemas de danos mecânicos e perdas na colheita. Sementes colhidas com teor de umidade superior a 15% estão sujeitas a maior incidência de danos mecânicos latentes e, quando colhidas com teor abaixo de 12%, estão suscetíveis ao dano mecânico imediato, ou seja, à quebra.

## 6.9.2 Principais causas das perdas

**A subestimação da importância econômica das perdas e a conseqüente falta de monitoramento (avaliação com metodologia adequada) das perdas durante todos os dias da colheita** - sem dúvida, são as principais causas das perdas durante a colheita, uma vez que a operação de colheita propriamente dita, deveria ser realizada com base nesse monitoramento.

**Má regulagem e operação da colhedora** - na maioria das vezes, é causada pelo pouco conhecimento do operador sobre regulagens e operação adequada da colhedora. O trabalho harmônico entre o molinete, a barra de corte, a velocidade da operação, e as ajustagens do sistema de trilha e de limpeza é fundamental para a colheita eficiente, bem como o conhecimento de que a perda tolerável é de no máximo **uma saca de 60 kg/ha**.

## 6.9.3 Tipos de perdas e onde elas ocorrem

Tendo em vista as várias causas de perdas ocorridas numa lavoura de soja, os tipos ou as fontes de perdas podem ser definidos da seguinte maneira:

- a) **perdas antes da colheita** - causadas por deiscência ou pelas vagens caídas ao solo antes da colheita;
- b) **perdas causadas pela plataforma de corte** - que incluem as perdas por debulha, as por altura de inserção e as por acamamento das plantas que ocorrem na frente da plataforma de corte.
- c) **perdas por trilha, separação e limpeza** - em forma de grãos que tenham passado através da colhedora durante a operação;

Embora as origens das perdas sejam diversas e ocorram tanto antes quanto durante a colheita, cerca de 80% a 85% delas ocorrem pela ação dos mecanismos da plataforma de corte das colhedoras (molinete, barra de corte e caracol), 12% são ocasionadas pelos mecanismos internos (trilha, separação e limpeza) e 3% são causadas por deiscência natural.

#### 6.9.4 Como avaliar as perdas

Para avaliar as perdas durante a colheita, recomenda-se a utilização do copo medidor de perdas. Este copo correlaciona volume com massa, permitindo a determinação direta de perdas em sacas/ha de soja, pela simples leitura dos níveis impressos no próprio copo (Fig. 6.3). (Detalhes da metodologia de avaliação e uso do copo medidor encontram-se na publicação Mesquita et al., 1998 - MANUAL DO PRODUTOR (EMBRAPA-CNPSO, Documentos, 112).

#### 6.9.5 Como evitar as perdas

As perdas serão mínimas se forem tomados alguns cuidados relativos à velocidade adequada de operação e pequenos ajustes e regulagens desses mecanismos de corte e recolhimento, além dos mecanismos de trilha, separação e limpeza. (Detalhes da operação adequada e regulagens e ajustagens dos componentes ativos da colhedora encontram-se na publicação Mesquita et al., 1998 - MANUAL DO PRODUTOR (EMBRAPA-CNPSO, Documentos, 112).




Figura 6.3. Tabela impressa no medidor com os valores de perdas e de produtividade. Embrapa Soja. Londrina, PR.

# 7

## Inoculação das Sementes com *Bradyrhizobium*

---

### 7.1 Introdução

O nitrogênio (N) é o nutriente requerido em maior quantidade pela cultura da soja. Estima-se que para produzir 1000 kg de grãos são necessários 80 kg de N. Basicamente, as fontes de N disponíveis para a cultura da soja são os fertilizantes nitrogenados e a fixação biológica do nitrogênio (FBN) (Hungria et al., 2001).

Fixação biológica do nitrogênio (FBN) - É a principal fonte de N para a cultura da soja. Bactérias do gênero *Bradyrhizobium*, quando em contato com as raízes da soja, infectam as raízes, via pêlos radiculares, formando os nódulos. A FBN pode, dependendo de sua eficiência, fornecer todo o N que a soja necessita.

### 7.2 Qualidade e quantidade dos inoculantes

Os inoculantes turfosos, líquidos ou outras formulações devem ter comprovada a eficiência agrônômica, conforme normas oficiais da RELARE, aprovadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

A quantidade mínima de inoculante a ser utilizada deve fornecer 600.000 células/sementes. Resultados de pesquisa indicam benefícios crescentes à nodulação e à fixação biológica do nitrogênio pela utilização de populações de até 1.200.000 células/sementes.

A base de cálculo para o número de bactérias/semente é a concentração registrada no MAPA e que consta da embalagem.

### 7.2.1 Cuidados ao adquirir inoculantes

- a) adquirir inoculantes recomendados pela pesquisa e devidamente registrados no MAPA. O número de registro deverá estar impresso na embalagem;
- b) não adquirir e não usar inoculante com prazo de validade vencido e que não tenha uma população mínima de  $1 \times 10^8$  células viáveis por grama ou por ml do produto e que forneça 600.000 células/semente;
- c) certificar-se de que o mesmo estava armazenado em condições satisfatórias de temperatura e arejamento;
- d) transportar e conservar o inoculante em lugar fresco e bem arejado;
- e) certificar-se de que os inoculantes contenham pelo menos duas das quatro estirpes recomendadas para o Brasil (SEMIA 587, SEMIA 5019, SEMIA 5079 e SEMIA 5080); e
- f) em caso de dúvida sobre a qualidade do inoculante, contatar um fiscal do MAPA.

### 7.2.2 Cuidados na inoculação

- a) fazer a inoculação à sombra e efetuar a semeadura no mesmo dia, especialmente se a semente for tratada com fungicidas e micronutrientes, mantendo a semente inoculada protegida do sol e do calor excessivo;
- b) evitar o aquecimento, em demasia, do depósito da semente na semeadora, pois altas temperaturas reduzem o número de bactérias viáveis aderidas à semente.
- c) para melhor aderência dos inoculantes turfosos, recomenda-se umedecer a semente com 300 ml/50 kg semente de água açucarada a 10% (100 g de açúcar e completar para um litro de água);
- d) é imprescindível que a distribuição do inoculante turfoso ou líquido seja uniforme em todas as sementes para que tenhamos o benefício da fixação biológica do nitrogênio em todas as plantas.

### **7.2.3 Métodos de inoculação**

#### **7.2.3.1 Inoculação nas sementes**

Inoculante turfoso - umedecer as sementes com solução açucarada ou outra substância adesiva, misturando bem. Adicionar o inoculante, homogeneizar e deixar secar à sombra. A distribuição da mistura açucarada/adesiva mais inoculante nas sementes deve ser feita, preferencialmente, em máquinas próprias, tambor giratório ou betoneira.

Inoculante líquido - aplicar o inoculante nas sementes, homogeneizar e deixar secar à sombra.

#### **7.2.3.2 Inoculação no sulco de semeadura**

O método tradicional de inoculação pode ser substituído pela aplicação do inoculante por aspersão no sulco, por ocasião da semeadura, em solos com ou sem população estabelecida. Esse procedimento, pode ser adotado desde que a dose de inoculante seja, no mínimo, seis vezes superior à dose indicada para as sementes (item 7.2). O volume de líquido (inoculante mais água) usado nos experimentos não foi inferior a 50 l/ha. A utilização desse método tem a vantagem de reduzir os efeitos tóxicos do tratamento de sementes com fungicidas e da aplicação de micronutrientes nas sementes sobre a bactéria.

### **7.3 Aplicação de fungicidas às sementes junto com o inoculante**

A maioria das combinações de fungicidas indicados para o tratamento de sementes reduz a nodulação e a FBN (Campo & Hungria, 2000).

A maior frequência de efeitos negativos do tratamento de sementes com fungicidas na FBN ocorre em solos de primeiro ano de cultivo com soja, com baixa população de *Bradyrhizobium* spp. Nesse caso, para garantir melhores resultados com a inoculação e o estabelecimento da população

do *Bradyrhizobium* spp. ao solo, o agricultor deve evitar o tratamento de sementes com fungicidas, desde que:

- 1) as sementes possuam alta qualidade fisiológica e sanitária, estejam livres de fitopatógenos importantes (pragas quarentenárias A2 ou pragas não quarentenárias regulamentadas), definidos e controlados pelo Certificado Fitossanitário de Origem (CFO) ou Certificado Fitossanitário de Origem Consolidado (CFOC), conforme legislação. (Instrução Normativa nº 6 de 13 de março de 2000, publicada no D.O.U. no dia 05 de Abril de 2000); e
- 2) o solo apresente boa disponibilidade hídrica e temperatura adequada para rápida germinação e emergência.

Caso essas condições não sejam atingidas, o produtor deve tratar a semente com fungicidas, dando preferência às misturas Carboxin + Thiram, Difenoconazole + Thiram, Carbendazin + Captan, Thiabendazole + Tolyfluanid ou Carbendazin + Thiram, que demonstraram ser os menos tóxicos para o *Bradyrhizobium*.

## 7.4 Aplicação de micronutrientes nas sementes

O Co e o Mo são indispensáveis para a eficiência da FBN, para a maioria dos solos onde a soja vem sendo cultivada. As indicações técnicas atuais desses nutrientes são para aplicação de 2 a 3 g de Co e 12 a 30 g de Mo/ha via semente ou em pulverização foliar, nos estádios de desenvolvimento V3-V5.

### 7.4.1 Sementes enriquecidas em Mo

Utilização - Embora não dispense a aplicação do Co e Mo, nas sementes ou via pulverização foliar antes da floração, a utilização de sementes enriquecidas em Mo aumenta a eficiência de fixação biológica de nitrogênio, aumentando os rendimentos da soja.

Como enriquecer as sementes com Mo - Fazer duas aplicações de 400 g

de Mo, utilizando-se uma fonte solúvel em água, entre os estádios R3 e R5-4, com intervalo de no mínimo 10 dias. Essa prática deve ser executada exclusivamente pelos produtores de semente. Sementes enriquecidas com Mo não devem ser utilizadas na alimentação animal.

### **7.5 Aplicação de fungicidas e micronutrientes nas sementes, junto com o inoculante**

A aplicação dos micronutrientes juntamente com os fungicidas, antes da inoculação, reduz o número de nódulos e a eficiência da FBN. Assim, quando se utilizar fungicidas no tratamento de sementes, como alternativa, pode-se aplicar o Co e o Mo (2 a 3g/ha e 12 a 30g/ha, respectivamente) por pulverização foliar entre os estádios V3 - V5 (Campo e Hungria, 2000; Campo et al., 2000 e 2001).

### **7.6 Inoculação em áreas com cultivo anterior de soja**

Os ganhos com a inoculação, em áreas já cultivadas anteriormente com soja, são menos expressivos do que os obtidos em solos de primeiro ano. Todavia, têm sido observados ganhos médios de 4,5% no rendimento de grãos com a inoculação em áreas já cultivadas com essa leguminosa. Por isso, recomenda-se reinocular a cada ano.

### **7.7 Inoculação em áreas de primeiro cultivo com soja**

Como a soja não é uma cultura nativa do Brasil e a bactéria que fixa o nitrogênio atmosférico (bradirizóbio) não existe naturalmente nos solos brasileiros, é indispensável que se faça a inoculação da soja nessas condições, para garantia de obtenção de alta produtividade. A dose de inoculante deve ser a indicada e não deixar de observar os cuidados em relação à aplicação de fungicidas e micronutrientes nas sementes. Quan-

to maior o número de células viáveis nas sementes, melhores serão a nodulação e o rendimento de grãos.

## 7.8 Nitrogênio mineral

Resultados obtidos em todas as regiões onde a soja é cultivada mostram que a aplicação de fertilizante nitrogenado na semeadura ou em cobertura em qualquer estágio de desenvolvimento da planta, em sistemas de semeadura direta ou convencional, além de reduzir a nodulação e a eficiência da FBN, não traz nenhum incremento de produtividade para a soja. No entanto, se as fórmulas de adubo que contêm nitrogênio forem mais econômicas do que as fórmulas sem nitrogênio, elas poderão ser utilizadas, desde que não sejam aplicados mais do que 20 kg de N/ha.

# 8

## Instalação da Lavoura

### 8.1 Umidade e temperatura do solo

A semente de soja, para a germinação e a emergência da plântula, requer absorção de água de, pelo menos, 50% do seu peso seco. Para que isso ocorra, devem haver adequadas umidade e aeração do solo e a semeadura deve propiciar o melhor contato possível entre solo e semente. Semeadura em solo com insuficiência hídrica, ou “no pó”, prejudica o processo de germinação, podendo torná-lo mais lento, expondo as sementes às pragas e aos microorganismos do solo, reduzindo a chance de obtenção da população de plantas desejada. Em caso de semeadura nessas condições, o tratamento de sementes com fungicidas pode prolongar a capacidade de germinação das mesmas, até que ocorra condição favorável de umidade no solo.

A temperatura média do solo, adequada para semeadura da soja, vai de 20°C a 30°C, sendo 25°C a ideal para uma emergência rápida e uniforme. Semeadura em solo com temperatura média inferior a 18°C pode resultar em drástica redução nos índices de germinação e de emergência, além de tornar mais lento esse processo. Isso pode ocorrer em semeaduras anteriores à época indicada em cada região. Temperaturas acima de 40°C, também, podem ser prejudiciais.

### 8.2 Cuidados na semeadura

**Mecanismos da semeadora** - A qualidade da semeadura é função, entre outros fatores, do tipo de máquina semeadora, especialmente o tipo de dosador de semente, do controlador de profundidade e do compactador de sulco.

**Tipo de dosador de semente** - Entre os tipos existentes, destacam-se os de disco horizontal e os pneumáticos. Os pneumáticos apresentam maior precisão, ausência de danos à semente e são mais caros. No caso do disco horizontal, de uso mais comum, indica-se os com linhas duplas de furos (alvéolos), por garantir melhor distribuição das sementes ao longo do sulco. Para maior precisão, primar pela utilização de discos com furos adequados ao tamanho das sementes.

**Limitador de profundidade** - O sistema com roda flutuante acompanha melhor o relevo do solo, mantendo sempre a mesma profundidade de semeadura.

**Compactador de sulco** - O tipo em "V" aperta o solo contra a semente, eliminando as bolsas de ar sem compactar a superfície do solo sobre a linha de corte do sulco, como ocorre com o tipo de roda única traseira.

**Velocidade de operação da semeadora** - A velocidade de deslocamento da semeadora influi na uniformidade de distribuição e nos danos provocados às sementes, especialmente nos dosadores mecânicos (não pneumáticos). A velocidade ideal de deslocamento está entre 4 km/h e 6 km/h. Nesse intervalo, a variação de velocidade depende, principalmente, da uniformidade da superfície do terreno.

**Profundidade** - Efetuar a semeadura a uma profundidade de 3 a 5 cm. Semeaduras em profundidades maiores dificultam a emergência, principalmente em solos arenosos, sujeitos a assoreamento, ou onde ocorre compactação superficial do solo.

**Posição semente/adubo** - O adubo deve ser distribuído ao lado e abaixo da semente, pois o contato direto prejudica a absorção da água pela semente, podendo até matar a plântula em crescimento, principalmente em caso de dose alta de cloreto de potássio no sulco (acima de 80 kg de KCl/ha).

**Compatibilidade dos produtos químicos** - Produtos químicos como fungicidas e herbicidas, nas doses recomendadas, normalmente, não afetam a germinação da semente de soja. Porém, em doses excessivas, prejudicam tanto a germinação quanto o desenvolvimento inicial da plântula.

### 8.3 Época de semeadura

A época de semeadura é um dos fatores que mais influenciam o rendimento da soja. Como essa é uma espécie termo e fotossensível, está sujeita a alterações fisiológicas e morfológicas, quando as suas exigências, nesse sentido, não são satisfeitas. A época de semeadura determina a exposição da soja à variação dos fatores climáticos limitantes. Assim, semeaduras em épocas inadequadas podem afetar o porte, o ciclo e o rendimento das plantas e aumentar as perdas na colheita. A altura das plantas está, também, relacionada com a população de plantas, com a cultivar utilizada e com a fertilidade do solo.

**Região Centro-Oeste** - De modo geral, o período preferencial para a semeadura de soja vai de 20 de outubro a 10 de dezembro. Entretanto, é no mês de novembro que se obtém as maiores produtividades e altura de planta adequada. Em áreas bem fertilizadas e com alta tecnologia, pode-se conseguir boa produção em semeaduras realizadas até 20 de dezembro. Nas áreas mais ao norte, as melhores produções são obtidas em semeaduras de novembro e dezembro. Para semeaduras de dezembro, recomenda-se evitar o uso de cultivares de muito tardias ou precoces, dando preferência a cultivares de ciclo médio ou semitardio de porte alto. Na maioria dos casos, semeaduras de final de dezembro e de janeiro podem ocasionar reduções de rendimento de até 50%, em relação a novembro. De janeiro em diante as perdas podem ser ainda maiores. Para viabilizar a sucessão de culturas, recomenda-se a utilização de cultivares precoces. Estas informações são válidas, também, para Rondônia e sul de Tocantins.

**Regiões Norte e Nordeste** - As áreas de cultivo de soja estão distribuídas em uma vasta região, em áreas que se diferenciam muito quanto ao período de ocorrência de chuvas. Assim, a época mais indicada para semeadura da soja, varia de estado para estado e dentro de um mesmo estado, conforme descrito a seguir.

- Maranhão - no sul, novembro a 15 de dezembro; no norte, janeiro.
- Pará - no sul (Redenção), novembro a 15 de dezembro; no nordeste (Paragominas), de 15 de dezembro a final de janeiro; no noroeste (Santarém), 10 de março a abril.

- Piauí - no sudoeste (Uruçuí - Bom Jesus), novembro a 15 de dezembro.
- Tocantins - no norte (Pedro Afonso), novembro a 15 de dezembro.
- Roraima - na região central (Boa Vista), maio.

#### **8.4 Diversificação de cultivares**

As flutuações anuais do rendimento, para uma mesma época, são, principalmente, determinadas por variações climáticas anuais. Uma prática eficiente para evitar tais flutuações é o emprego de duas ou mais cultivares, de diferentes ciclos, numa mesma propriedade, procedimento especialmente indicado para médias e grandes áreas. Desse modo, obtém-se uma ampliação dos períodos críticos da cultura (floração, formação de grãos e maturação), havendo menor prejuízo se ocorrerem, entre outros fatores, deficiência ou excesso hídrico, os quais atingirão apenas uma parte da lavoura.

#### **8.5 População e densidade de semeadura**

Em função de avanços nos sistemas de semeadura (maior precisão das semeadoras), de cultivares mais adaptadas, de melhoria da capacidade produtiva dos solos, de adoção de práticas conservacionistas, de cobertura vegetal do solo e da semeadura direta, entre outros fatores, a população padrão de plantas de soja foi reduzida gradativamente, nos últimos anos, de 400 mil para, aproximadamente, 320 mil plantas por hectare, porque as condições acima permitem melhor crescimento e maior rendimento por planta. Esse número de plantas pode variar, ainda, em função da cultivar e/ou do regime de chuvas da região (volume e distribuição) no período de implantação e de crescimento das plantas e da data de semeadura.

Em áreas mais úmidas e/ou em solos mais férteis (fertilidade natural ou construída), onde, com freqüência, ocorre acamamento das plantas, a população pode ser reduzida de 20%-25% (ficando em torno de 240-260

mil plantas), quando em semeadura de novembro, para evitar acamamento e possibilitar maior rendimento.

Em semeaduras de outubro e de dezembro, é recomendável, na maioria das situações, especialmente em regiões/áreas onde a soja não apresenta porte alto, ou para cultivares que se comportam assim, mesmo na melhor época de semeadura, não reduzir a população para menos de 300 mil plantas, para evitar o desenvolvimento de lavouras com plantas de porte muito baixo. Em condições extremas, é aconselhável até aumentar para 350-400 mil plantas/ha.

De modo geral, cultivares de porte alto e de ciclo longo requerem populações menores. O inverso também é verdadeiro.

Indica-se espaçamento entre fileiras de 40 a 50 cm. Espaçamentos mais estreitos que 40 cm resultam em fechamento mais rápido da cultura, contribuindo para o controle das plantas daninhas, mas não permitem a realização de operações de cultivo entre fileiras.

Na Tabela 8.1 é apresentada a correspondência entre população de plantas por ha, espaçamento entre fileiras e número de plantas por metro.

**Tabela 8.1.** População de plantas/ha, de acordo com o espaçamento entre as fileiras e o número de plantas por metro.

Espaçamento (cm)	Plantas/metro				
	10	12	14	16	18
40	250.000	300.000	350.000	400.000	450.000
45	222.222	266.666	311.111	355.555	400.000
50	200.000	240.000	280.000	320.000	360.000

## 8.6 Cálculo da quantidade de sementes e regulagem da semeadora

Para calcular o número de sementes a serem distribuídas, é necessário que se conheça o poder germinativo do lote de sementes. Essa informa-

ção é fornecida pela empresa onde as sementes são adquiridas, porém esse valor (% germinação) pode ser superior ao valor de emergência das sementes no campo. Por isso, recomenda-se fazer um teste de emergência em campo. A partir de uma amostra representativa, separam-se quatro subamostras de 100 sementes cada - que deverão ser semeadas a uma profundidade de 3 a 5 cm, em solo preparado, em quatro fileiras de 4 m cada. A umidade do solo deve ser mantida em nível adequado para a emergência, durante a execução da avaliação. Faz-se contagem em cada uma das quatro fileiras, quando as plantas estiverem com o primeiro par de folhas completamente aberto (10 dias após a semeadura), considerando apenas as vigorosas. O percentual de emergência em campo será a média aritmética do número de plantas emergidas nas quatro repetições de 100 sementes.

O número de plantas/metro a ser obtido na lavoura é estimado levando em conta a população de plantas desejada/ha e o espaçamento adotado, usando a seguinte fórmula:

$$\text{n}^\circ \text{ de pl/m} = \frac{[\text{pop/ha} \times \text{espaçamento (m)}]}{10.000}$$

De posse desses valores, calcular o número de sementes por metro de sulco:

$$\text{n}^\circ \text{ de sementes/m} = \frac{(\text{n}^\circ \text{ de plantas desejado/m} \times 100)}{\% \text{ de emergência em campo}}$$

Para estimar a quantidade de semente que será gasta por ha, pode-se usar a seguinte fórmula:

$$Q = \frac{(1000 \times P \times D) \times 1,1}{G \times E}$$

onde: Q= Quantidade de sementes, em kg/ha;  
 P= Peso de 100 sementes, em gramas;  
 D= N° de plantas que se deseja/m;  
 E= Espaçamento utilizado em cm; e  
 G= % de emergência em campo.

A constante 1,1, na fórmula acima, refere-se a um acréscimo de 10% no número de sementes, como fator de segurança. Aplicando essa fórmula numa situação de lote de semente com 80% de germinação e que a população esperada de 14 plantas/metro, a semeadora deverá ser regulada para distribuir em torno de 19 sementes/metro.

A semeadora a ser utilizada deverá ser previamente regulada para distribuir o número desejado de sementes. Para maior precisão na regulação da semeadora, utilizar, caso disponível, sementes previamente classificadas por tamanho, bem como discos específicos, conforme recomendados pela empresa produtora da semente ou pelo fabricante da semeadora.

O sucesso da lavoura inicia-se pela semeadura bem feita. O bom resultado da semeadura, por sua vez, não depende apenas da semente mas, também, da maneira como foi executada e dos fatores climáticos ocorridos após a operação.



# 9

## Controle de Plantas Daninhas

O controle de plantas daninhas é uma prática de elevada importância para a obtenção de altos rendimentos em qualquer exploração agrícola e tão antiga quanto a própria agricultura.

As plantas daninhas constituem grande problema para a cultura da soja e a necessidade de controlá-las, um imperativo. Conforme a espécie, a densidade e a distribuição da invasora na lavoura, as perdas são significativas. A invasora prejudica a cultura, porque com ela compete pela luz solar, pela água e pelos nutrientes, podendo, a depender do nível de infestação e da espécie, dificultar a operação de colheita e comprometer a qualidade do grão.

Os métodos normalmente utilizados para controlar as invasoras são o mecânico, o químico e o cultural. Quando possível, é aconselhável utilizar a combinação de dois ou mais métodos.

O controle cultural consiste na utilização de técnicas de manejo da cultura (época de semeadura, espaçamento, densidade, adubação, cultivar, etc.) que propiciem o desenvolvimento da soja, em detrimento ao da planta daninha.

O método mais utilizado para controlar as invasoras é o químico, isto é, o uso de herbicidas. Suas vantagens são a economia de mão de obra e a rapidez na aplicação. Para que a aplicação dos herbicidas seja segura, eficiente e econômica, exigem-se técnicas refinadas. O reconhecimento prévio das invasoras predominantes é condição básica para a escolha adequada do produto (Tabelas 9.1 e 9.2), que resultará no controle mais eficiente das invasoras.

A eficiência dos herbicidas aumenta quando aplicados em condições favoráveis. É fundamental que se conheçam as especificações do produto antes de sua utilização e que se regule corretamente o equipamento de pulverização, quando for o caso, para evitar riscos de toxicidade ao homem e à cultura.

Os herbicidas são classificados quanto a época de aplicação, em pré-plantio, pré-emergentes e pós-emergentes, e na Tabela 9.3 encontram-se os produtos indicados pela pesquisa.

**Tabela 9.1.** Eficiência de alguns herbicidas\* aplicados em PPI, pré e pós-emergência, para o controle de plantas daninhas da cultura da soja em solos de Cerrados. Comissão de Plantas Daninhas da Região Central do Brasil, 2003.

	<i>Acanthospermum australe</i>	<i>Acanthospermum hispidum</i>	<i>Ageratum conyzoides</i>	<i>Alternanthera tenella</i>	<i>Amaranthus deflexus</i>	<i>Amaranthus hybridus</i>	<i>Amaranthus viridis</i>	<i>Bidens pilosa</i>	<i>Blainvillea latifolia</i>	<i>Bracharia decumbens</i> <sup>1</sup>	<i>Bracharia plantaginea</i>	<i>Calopogonium mucronoides</i>
Acifluorfen	M	S	S	M	-	-	S	S	-	T	T	-
Alachlor <sup>2</sup>	M	-	S	S	-	-	S	M	-	M	M	-
Bentazon	M	S	S	T	S	-	T	S	-	T	T	-
Bentazon + Acifluorfen (Volt)	M	-	S	-	-	-	S	S	-	-	-	-
Chlorimuron-ethyl	S	S	S	S	-	-	S	S	S	T	T	M <sup>8</sup>
Clethodim	T	T	T	T	-	-	T	T	-	-	S	-
Clomazone <sup>3</sup>	M	T	-	-	-	-	-	S	-	-	S	-
Cloransulam-methyl	S	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-
Cyanazine	M	S	S	-	-	-	S	S	-	-	T	-
Diclosulam	S	S	S	-	-	-	S	S	-	-	-	-
Dimethenamide	M	-	S	S	-	-	S	M	-	-	S	-
Fenoxaprop-p-ethyl	T	T	T	T	-	-	T	T	-	-	S	-
Fenoxaprop-p-ethyl + Clethodim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-
Fluazifop-p-butyl	T	T	T	T	-	-	T	T	-	S	S	-
Flumetsulan	S	S	S	S	-	-	S	S	-	-	-	-
Flumiclorac	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Flumioxazin PRE	-	-	S	S	-	-	-	S	-	-	-	-
Flumioxazin POS	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-
Fomesafen	M	S	S	S	-	-	S	S	S	T	T	-
Fomesafen + Fluazifop <sup>12</sup>	M	-	S	-	-	S	-	S	-	S	S	-
Fomesafen + Fluazifop <sup>13</sup>	-	-	-	-	-	-	-	S	-	S	S	-
Haloxifop-R, éster metílico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	-
Imazaquin <sup>5</sup>	S	-	S	S	-	S	S	S	-	T	T	-
Imazethapyr	S	S	M	S	-	S	-	S	-	-	M <sup>5</sup>	-
Lactofen	M	S	S	S	-	-	S	S	-	T	T	-
Metolachlor <sup>2</sup>	T	M	-	-	-	-	-	S	-	-	S	-
Metribuzin	M	-	S	S	-	S	S	S	-	-	T	-
Oxasulfuron	-	S	S	-	-	S	S	S	S	-	-	-
Pendimethalin <sup>2</sup>	T	T	T	S	-	-	S	T	-	-	S	-
Pendimethalin + Imazaquin	M	-	-	-	-	-	-	S	-	-	S	-
Propaquizafop	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S <sup>11</sup>	-
Quizalofop-p-ethyl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	-
Quizalofop-p-teturiil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-
Sethoxydim	T	T	T	T	-	-	T	T	-	S	S	-
Sulfentrazone	M	-	S	-	-	-	-	S	-	S	S	-
Tepraloxynid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-
Trifluralin	T	T	T	-	-	-	S	T	-	S	S	-

Continua...

...Continuação Tabela 9.1

	<i>Cenchrus echinatus</i>	<i>Chamaesyce hirta</i>	<i>Commelina benghalensis</i>	<i>Croton glandulosus</i>	<i>Desmodium tortuosum</i>	<i>Digitaria horizontalis</i>	<i>Digitaria insularis</i>	<i>Echinochloa crusgalli</i>	<i>Eleusine indica</i>	<i>Emilia sonchifolia</i>	<i>Eupatorium pauciflorum</i>	<i>Euphorbia heterophylla</i>
Acifluorfen	T	-	M	-	-	T	-	-	T	M	-	S
Alachlor <sup>2</sup>	S	-	S	-	-	S	-	-	S	-	-	T
Bentazon	T	-	S	-	T	T	-	-	T	M	S	T
Bentazon + Acifluorfen (Volt)	-	-	S	-	-	-	-	-	-	-	-	S
Chlorimuron-ethyl	T	-	S	-	S	T	-	-	T	S	-	-
Clethodim	S	-	T	-	T	S	S <sup>a</sup>	-	S	T	T	T
Clomazone <sup>3</sup>	S	-	S	-	-	S	-	-	S	-	-	M
Cloransulam-methyl	-	-	M	-	M	-	-	-	-	-	S	M
Cyanazine	T	-	T	-	-	T	-	-	-	M	-	-
Diclosulam	-	S	-	S	S	-	-	-	-	S	-	S
Dimethenamide	S	-	S	-	T	S	-	-	S	-	-	T
Fenoxaprop-p-ethyl	S	-	-	-	T	S	-	-	S	T	-	T
Fenoxaprop-p-ethyl + Clethodim	S	-	-	-	-	S	-	-	S	-	-	-
Fluazifop-p-butyl	S	-	T	-	T	S	-	-	S	T	T	T
Flumetsulan	-	-	-	S	-	-	-	-	-	-	-	M
Flumiclorac	-	-	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Flumioxazin PRE	-	-	-	-	S	S	-	-	-	-	-	-
Flumioxazin POS	-	-	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fomesafen	T	-	M	-	T	T	-	-	T	S	S	S
Fomesafen + Fluazifop <sup>12</sup>	S	-	M	-	-	S	-	-	S	-	-	S
Fomesafen + Fluazifop <sup>13</sup>	S	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	S
Haloxifop-R, éster metílico	S	-	-	-	-	S	-	-	S	-	-	-
Imazaquin <sup>5</sup>	T	-	M	S	T	M	-	-	T	M	-	S <sup>4</sup>
Imazethapyr	S	-	S	-	T	S	-	-	T	M	-	S
Lactofen	T	-	S	-	T	T	-	-	T	S	S	-
Metolachlor <sup>2</sup>	S	-	S	-	S	S	-	-	-	-	-	-
Metribuzin	T	-	M	-	S	T	-	-	T	M	-	T
Oxasulfuron	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	-	-
Pendimethalin <sup>2</sup>	S	-	T	-	-	S	-	-	S	-	-	T
Pendimethalin + Imazaquin	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	-
Proaquizafop	S	-	-	-	-	S	-	-	S	-	-	-
Quizalofop-p-ethyl	S	-	-	-	-	S	-	S	-	-	-	-
Quizalofop-p-tefuriil	S	-	-	-	-	S	S	-	S	-	-	-
Sethoxydim	S	-	T	-	T	S	-	-	S	T	T	T
Sulfentrazone	S	-	S	-	S	S	-	-	S	S	-	S
Tepaloxiydin	S	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	-
Trifluralin	S	-	T	-	T	S	-	-	S	T	-	T

Continua...

...Continuação Tabela 9.1

	<i>Galinosa parviflora</i>	<i>Hyptis lophantha</i>	<i>Hyptis suaveolens</i>	<i>I. grandifolia</i>	<i>Lepidium virginicum</i>	<i>Melampodium perforiatum</i>	<i>Mimosa invisa</i>	<i>Mitracarpus hirtus</i>	<i>Nicandra physaloides</i>	<i>Panicum maximum</i>	<i>Pennisetum ambricatum</i>	<i>Pennisetum setosum</i>
Acifluorfen	S	S	S	-	-	-	-	-	S	-	-	T
Alachlor <sup>2</sup>	S	-	-	T	-	-	-	S	S	-	-	S
Bentazon	M	-	T	S	-	-	-	-	S	-	-	T
Bentazon + Acifluorfen (Volt)	-	-	S	S	-	-	-	-	S	-	-	-
Chlorimuron-ethyl	S	S	S <sup>7,B</sup>	S	-	S	-	-	M <sup>7</sup>	-	-	T
Clethodim	T	T	T	T	-	-	-	T	T	-	-	S
Clomazone <sup>3</sup>	S	-	-	T	-	-	-	-	-	-	-	S
Cloransulam-methyl	-	-	-	S	-	-	-	-	-	-	-	-
Cyanazine	S	-	-	T	-	-	-	-	-	-	-	T
Diclosulam	-	-	S	S	-	-	S	-	-	-	-	-
Dimethenamide	-	S	S	T	-	-	-	-	S	-	-	-
Fenoxaprop-p-ethyl	T	T	T	T	-	-	-	-	T	-	-	S
Fenoxaprop-p-ethyl + Clethodim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluazifop-p-butyl	T	T	T	T	-	-	-	T	T	-	-	S
Flumetsulan	-	S	S	M	-	-	-	-	T	-	-	M
Flumiclorac	-	-	S	-	-	S	-	-	-	-	-	-
Flumioxazin PRE	-	-	S	-	-	-	-	-	S	-	-	-
Flumioxazin POS	-	-	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fomesafen	S	-	S	S	S	S	-	-	S	-	-	T
Fomesafen + Fluazifop <sup>12</sup>	-	-	S	S	-	-	-	-	S	-	-	-
Fomesafen + Fluazifop <sup>13</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Haloxifop-R, éster metílico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imazaquin <sup>6</sup>	S	-	M	M	-	-	-	-	M	-	-	M
Imazethapyr	S	-	S	S	-	-	-	-	S	-	-	S
Lactofen	S	-	S	M	-	-	-	-	-	-	-	T
Metolachlor <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S
Metribuzin	S	M	M	M	-	-	-	-	S	-	-	T
Oxasulfuron	-	-	S	-	-	S	-	-	-	-	-	-
Pendimethalin <sup>2</sup>	T	-	-	T	-	-	-	-	M	-	-	S
Pendimethalin + Imazaquin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Propaquizafop	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quizalofop-p-ethyl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S
Quizalofop-p-tefuriil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S
Sethoxydim	T	T	T	T	-	-	-	T	T	-	-	S
Sulfentrazone	-	-	S	S	-	-	-	-	S	-	-	-
Tepaloxymid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trifluralin	T	T	T	T	-	-	-	-	T	-	-	S

Continua...

...Continuação Tabela 9.1

	<i>Pennisetum typhoides</i>	<i>Portulaca oleracea</i>	<i>Raphanus raphanistrum</i>	<i>Richardia brasiliensis</i>	<i>Senna obtusifolia</i>	<i>Setaria geniculata</i>	<i>Sida rhombifolia</i>	<i>Solanum americanum</i>	<i>Sorghum halepense</i>	<i>Spermacoce latifolia</i>	<i>Tridax procumbens</i>	<i>Vigna unguiculata</i>	<i>Zea mays</i>
Acifluorfen	-	-	-	S	-	-	S	M	-	-	-	-	-
Alachlor <sup>2</sup>	-	S	-	T	T	-	M	-	S	M	-	-	-
Bentazon	-	S	-	-	T	-	S	-	-	-	S	-	-
Bentazon + Acifluorfen (Volt)	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	S	-	-
Chlorimuron-ethyl	-	S	-	M	S <sup>7</sup>	T	-	T	T	-	S	S	-
Clethodim	S <sup>10</sup>	T	T	T	T	S	T	T	S	-	T	T	-
Clomazone <sup>3</sup>	-	-	-	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cloransulam-methyl	-	-	-	-	T	-	S	-	-	-	S	-	-
Cyanazine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T	-	-	-
Diclosulam	-	-	S	-	-	-	S	-	-	-	S	-	-
Dimethenamide	-	S	-	-	M	-	T	-	-	-	-	-	-
Fenoxaprop-p-ethyl	-	T	T	T	T	-	T	T	-	-	-	-	-
Fenoxaprop-p-ethyl + Clethodim	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluazifop-p-butyl	S	T	T	T	T	-	T	T	-	-	T	-	-
Flumetsulan	-	-	-	S	S	-	S	-	-	-	S	-	-
Flumiclorac	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-
Flumioxazin PRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	-	-
Flumioxazin POS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fomesafen	-	S	-	M	T	-	-	-	-	-	S	-	-
Fomesafen + Fluazifop <sup>12</sup>	S	-	-	S	-	-	-	-	-	-	S	-	-
Fomesafen + Fluazifop <sup>13</sup>	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S
Haloxifop-R, éster metílico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imazaquin <sup>6</sup>	-	S	-	S	-	-	S	S	-	-	M	-	-
Imazethapyr	-	S	-	M	T	-	S	S	-	-	-	T	-
Lactofen	-	S	-	-	-	-	-	S	-	S	S	-	-
Metolachlor <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	S	S	-	-	-	-	-
Metribuzin	-	S	-	S	-	-	S	T	-	-	-	-	-
Oxasulfuron	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendimethalin <sup>2</sup>	-	S	M	-	T	-	T	T	-	-	-	-	-
Pendimethalin + Imazaquin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Propaquizafop	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quizalofop-p-ethyl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quizalofop-p-tefuriil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sethoxydim	-	T	T	T	T	-	T	T	-	-	T	T	-
Sulfentrazone	-	S	T	-	T	-	-	-	-	S	S	-	-
Tepraloxymid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S
Trifluralin	-	M	-	-	T	-	T	T	-	-	T	-	-

Continua...

...Continuação Tabela 9.1

T = Tolerante; S = Suscetível; M = Medianamente suscetível; – = Sem informação.

<sup>1</sup> Informações obtidas em plantas provenientes de sementes.

<sup>2</sup> A eficiência diminui em áreas de alta infestação de capim-marmelada. Aplicar em solo úmido e bem preparado; Alachlor, Pendimethalin e Metolachlor devem ser aplicados no máximo em três dias após a última gradagem.

<sup>3</sup> Até que se disponha de mais informações, não se recomenda sua utilização em áreas que serão semeadas com trigo no inverno.

<sup>4</sup> Em alta infestação, aplicar em PPI.

<sup>5</sup> Aplicar antes do primeiro perfilho e em baixa infestação.

<sup>6</sup> Observar carência de 300 dias em áreas com rotação de milho.

<sup>7</sup> Aplicar com plantas com até duas folhas e a soja com bom desenvolvimento.

<sup>8</sup> Aplicar 80 g pc/ha, no estágio de até 4 folhas/2 a 3 folhas trifolioladas da planta daninha.

<sup>9</sup> Em plantas daninhas perenizadas, aplicar no estágio de 15 a 30 cm.

<sup>10</sup> Até 20 cm de altura.

<sup>11</sup> Em alta infestação de *B. plantaginea* este produto deverá ser utilizado em aplicação seqüencial nas doses de 0,7 L/ha, com as gramíneas com até 2 perfilhos e a segunda aplicação de 0,55 L/ha, cerca de 10 a 15 dias após a primeira aplicação.

<sup>12</sup> Marca comercial Fusiflex (125 + 125 g i.a./L, respectivamente de Fomesafen + Fluazifop).

<sup>13</sup> Marca comercial Robust (200 + 250 g i.a./L, respectivamente de Fomesafen + Fluazifop).

Antes de emitir recomendação e/ou receituário agrônômico, consultar relação de defensivos registrados no Ministério da Agricultura e cadastrados na Secretaria de Agricultura do Estado (onde houver legislação pertinente).

**Atenção:** Conheça as especificações do produto que será aplicado.

**Obs.:** Os herbicidas citados nesta tabela são referentes aos produtos comerciais listados na Tabela 9.3.

**Tabela 9.2.** Comportamento<sup>1</sup> de plantas daninhas em soja, em função da aplicação de herbicidas de PPI, pré e pós-emergência, no Estado do Paraná. Comissão de Plantas Daninhas da Região Central do Brasil. Embrapa Soja. Londrina, PR. 2003.

	Acifluorfen sódio	Alachlor	Bentazon	Bentazon+Acifluorfen (Volt)	Chlorimuron-ethyl	Clethodim	Clomazone	Cloransulam-methyl	Cyanazine	Diclosulam
<i>Acanthospermum australe</i> (Carrapicho-rasteiro)	T	T	M <sup>2</sup>	-	-	T	-	-	-	-
<i>Acanthospermum hispidum</i> (Carrapicho-de-carneiro)	S	T	S	-	S	T	-	S	S	-
<i>Amaranthus hybridus</i> (Caruru)	S	S	S	-	S	T	T	-	S	-
<i>Amaranthus viridis</i> (Caruru-de-mancha)	S	S	M	-	-	T	T	-	S	-
<i>Bidens pilosa</i> (Picão-preto)	M	M	S	M	S	T	S	S	S	S
<i>Brachiaria plantaginea</i> (Capim-marmelada)	T	M	T	-	-	S	S	-	T	-
<i>Cenchrus echinatus</i> (Capim-carrapicho)	T	T	T	-	-	S	S	-	T	-
<i>Commelina benghalensis</i> (Trapoeiraba)	M	S	S	-	S	T	S	M	T	-
<i>Cyperus rotundus</i> (Tiririca)	T	T	T	-	-	T	-	-	T	-
<i>Desmodium tortuosum</i> (Carrapicho beijo-de-boi)	-	-	-	-	S	-	-	M	-	S
<i>Digitaria horizontalis</i> (Capim-colchão)	T	S	T	-	-	S	S	-	T	-
<i>Echinochloa crusgalli</i> (Capim-arroz)	T	S	T	-	-	-	-	-	T	-
<i>Eleusine indica</i> (Capim pé-de-galinha)	T	-	T	-	-	S	-	-	T	-
<i>Emilia sonchifolia</i> (Falsa-serralha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S
<i>Euphorbia heterophylla</i> (Amendoim-bravo)	M	T	T	S	-	T	T	M	T	S
<i>Galinsoga parviflora</i> (Picão-branco)	S	S	T	-	-	T	-	-	S	-
<i>Ipomoea grandifolia</i> (Corda-de-viola)	M	T	M	-	S	T	T	S	M	S
<i>Parthenium hysterophorus</i> (Losna branca)	-	-	-	S	-	-	-	S	-	-
<i>Portulaca oleracea</i> (Beldroega)	S	S	S	-	-	T	-	-	S	-
<i>Raphanus raphanistrum</i> (Nabiça)	S	T	S	S	S	T	-	S	M	S
<i>Richardia brasiliensis</i> (Poaia-branca)	M	T	T	M	-	T	T	T	-	-
<i>Senna obtusifolia</i> (Fedegoso)	T	T	T	-	-	T	-	T	T	-
<i>Sida rhombifolia</i> (Guanxuma)	T	M	S	S	-	T	S	-	M	S
<i>Solanum americanum</i> (Maria-pretinha)	S	T	T	-	-	T	-	-	-	-
<i>Sorghum halepense</i> (Capim-massambará)	T	T	T	-	-	S	-	-	T	-
<i>Spermacoce latifolia</i> (Erva-quente)	-	-	-	M	-	-	-	-	-	-
<i>Tagetes minuta</i> (Cravo de defunto)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Vigna unguiculata</i> (Feijão-miúdo)	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
<i>Zea mays</i> (Milho voluntário)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Continua...

... Continuação Tabela 9.2

	Fenoxaprop-p-ethyl	Fluazifop-p-butyl <sup>7</sup>	Fluazifop-p-butyl+Fomesafen <sup>8</sup>	Fluazifop+Fomesafen <sup>9</sup>	Flumetsulan	Flumiclorac pentil	Flumioxazin	Fomesafen	Imazaquin	Imazethapyr	Lactofen	Metolachlor
<i>Acanthospermum australe</i> (Carrapicho-rasteiro)	-	T	-	-	-	-	-	S	M	-	-	-
<i>Acanthospermum hispidum</i> (Carrapicho-de-carneiro)	-	T	-	-	S	-	-	S	S	S	S	-
<i>Amaranthus hybridus</i> (Caruru)	-	T	-	-	-	-	-	S	S	S	S	-
<i>Amaranthus viridis</i> (Caruru-de-mancha)	-	T	-	-	-	-	-	S	S	-	S	-
<i>Bidens pilosa</i> (Picão-preto)	-	T	S	-	S	S	-	S	S	S	S	-
<i>Brachiaria plantaginea</i> (Capim-marmelada)	S	S	S	-	-	-	-	T	-	M <sup>10</sup>	T	-
<i>Cenchrus echinatus</i> (Capim-carrapicho)	S	S	-	-	-	-	-	T	-	-	T	-
<i>Commelina benghalensis</i> (Trapoeiraba)	-	T	-	-	-	S	-	-	S	S	S	-
<i>Cyperus rotundus</i> (Tiririca)	-	T	-	-	-	-	-	T	-	-	T	-
<i>Desmodium tortuosum</i> (Carrapicho beirão-de-boi)	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
<i>Digitaria horizontalis</i> (Capim-colchão)	S	S	-	S	-	-	-	T	-	M	T	S
<i>Echinochloa crusgalli</i> (Capim-arroz)	-	S	-	-	-	-	-	T	-	-	T	-
<i>Eleusine indica</i> (Capim pé-de-galinha)	-	S	-	-	-	-	-	T	-	T	T	-
<i>Emilia sonchifolia</i> (Falsa-serralha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Euphorbia heterophylla</i> (Amendoim-bravo)	-	T	M	S	S <sup>5</sup>	S	-	M	S <sup>3</sup>	S	M	-
<i>Galinsoga parviflora</i> (Picão-branco)	-	T	-	-	-	-	-	S	-	M	S	-
<i>Ipomoea grandifolia</i> (Corda-de-viola)	-	T	-	-	-	-	-	M	S	S	-	-
<i>Parthenium hysterophorus</i> (Losna branca)	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-
<i>Portulaca oleracea</i> (Beldroega)	-	T	-	-	-	-	-	S	S <sup>3</sup>	-	S	-
<i>Raphanus raphanistrum</i> (Nabiça)	-	T	-	-	S	-	-	S	S	S	S	-
<i>Richardia brasiliensis</i> (Poaia-branca)	-	T	-	-	-	-	S	-	S	M	-	-
<i>Senna obtusifolia</i> (Fedegoso)	-	T	-	-	-	-	-	M	-	T	M	-
<i>Sida rhombifolia</i> (Guanxuma)	-	T	-	-	-	S	S	T	S	S	M	-
<i>Solanum americanum</i> (Maria-pretinha)	-	T	-	-	-	-	-	S	-	-	S	-
<i>Sorghum halepense</i> (Capim-massarabá)	-	S <sup>4</sup>	-	-	-	-	-	T	-	-	T	-
<i>Spermacoce latifolia</i> (Erva-quente)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tagetes minuta</i> (Cravo de defunto)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Vigna unguiculata</i> (Feijão-miúdo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Zea mays</i> (Milho voluntário)	-	-	-	S	-	-	-	-	-	-	-	-

Continua...

... Continuação Tabela 9.2

	Metribuzin	Oxasulfuron	Pendimethalin	Pendimethalin+Imazaquin	Propaquizafop	Quizalofop-p-ethyl	Sethoxydim	Sulfentrazone	Tepraloxymidim	Trifluralin
<i>Acanthospermum australe</i> (Carrapicho-rasteiro)	M	-	T	-	-	-	T	-	-	T
<i>Acanthospermum hispidum</i> (Carrapicho-de-carneiro)	T	S	T	-	-	-	T	S	-	T
<i>Amaranthus hybridus</i> (Caruru)	S	S	S	-	-	-	T	S	-	S
<i>Amaranthus viridis</i> (Caruru-de-mancha)	S	-	S	-	-	-	T	-	-	S
<i>Bidens pilosa</i> (Picão-preto)	S	S	T	S	-	-	T	M	-	T
<i>Brachiaria plantaginea</i> (Capim-marmelada)	T	-	S	S	S <sup>6</sup>	S	S	S	S	S
<i>Cenchrus echinatus</i> (Capim-carrapicho)	T	-	M	-	S	S	S	-	S	S
<i>Commelina benghalensis</i> (Trapoeiraba)	T	-	T	-	-	-	T	S	-	T
<i>Cyperus rotundus</i> (Tiririca)	T	-	T	-	-	-	T	-	-	T
<i>Desmodium tortuosum</i> (Carrapicho beijo-de-boi)	-	S	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Digitaria horizontalis</i> (Capim-colchão)	T	-	S	-	S	S	S	-	S	S
<i>Echinochloa crusgalli</i> (Capim-arroz)	T	-	S	-	-	-	S	-	-	S
<i>Eleusine indica</i> (Capim pé-de-galinha)	T	-	S	-	S	-	S	-	-	M
<i>Emilia sonchifolia</i> (Falsa-serralha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Euphorbia heterophylla</i> (Amendoim-bravo)	T	-	T	-	-	-	T	S	-	T
<i>Galinsoga parviflora</i> (Picão-branco)	S	-	T	-	-	-	T	-	-	T
<i>Ipomoea grandifolia</i> (Corda-de-viola)	M	-	T	-	-	-	T	S	-	T
<i>Parthenium hysterophorus</i> (Losna branca)	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-
<i>Portulaca oleracea</i> (Beldroega)	S	-	S	-	-	-	T	-	-	M
<i>Raphanus raphanistrum</i> (Nabiça)	S	S	M	-	-	-	T	-	-	T
<i>Richardia brasiliensis</i> (Poaia-branca)	T	-	T	-	-	-	T	-	-	T
<i>Senna obtusifolia</i> (Fedegoso)	T	-	T	-	-	-	T	-	-	T
<i>Sida rhombifolia</i> (Guanxuma)	S	-	T	-	-	-	T	S	-	T
<i>Solanum americanum</i> (Maria-pretinha)	T	-	T	-	-	-	T	-	-	T
<i>Sorghum halepense</i> (Capim-massambará)	T	-	S <sup>4</sup>	-	-	-	-	-	-	S <sup>4</sup>
<i>Spermacoce latifolia</i> (Erva-quente)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tagetes minuta</i> (Cravo de defunto)	-	S	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Vigna unguiculata</i> (Feijão-miúdo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Zea mays</i> (Milho voluntário)	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-

Continua...

## ...Continuação Tabela 9.2

- 
- <sup>1</sup> S = Suscetível (controle de 81 a 100%); M = Medianamente suscetível (controle de 60 a 80%); T = Tolerante (controle inferior a 60%); - = Sem informação.
- <sup>2</sup> Juntar adjuvante indicado de acordo com seu registro.
- <sup>3</sup> Em alta infestação, aplicar em PPI.
- <sup>4</sup> Controla apenas plantas provenientes de sementes.
- <sup>5</sup> Não utilizar em áreas de alta infestação.
- <sup>6</sup> Em alta infestação de capim marmelada este produto deverá ser utilizado em aplicação sequencial nas doses de 0,7 L/ha, com as gramíneas com até dois perfilhos e a segunda aplicação de 0,55 L/ha, cerca de 10 a 15 dias após a primeira aplicação.
- <sup>7</sup> Marca comercial Fusilade 125 CE.
- <sup>8</sup> Marca comercial Flusiflex (125 + 125 g i.a./L, de Fluazifop + Fomesafen, respectivamente).
- <sup>9</sup> Marca comercial Robust (250 + 200 g.i.a./L, de Fluazifop + Fomesafen, respectivamente).
- <sup>10</sup> Aplicar com 1 a 4 folhas, antes do perfilhamento (Pós/inicial).

**Obs.:** Esta tabela é baseada em publicações anteriores da Série Documentos da Embrapa Soja e atualizada pelos experimentos das instituições que compõem o Sistema de Pesquisa Agropecuária Brasileira e pelas informações pessoais de pesquisadores.

**Tabela 9.3.** Alternativas para o controle químico\* de plantas daninhas na cultura da soja. Comissão de Plantas Daninhas da Região Central do Brasil, 2003.

Nome comum	Nome comercial <sup>1</sup>	Concentração (g/L ou g/kg)	Dose <sup>2</sup>		Aplicação <sup>3</sup>	Classe toxicológica <sup>4</sup>	Observações
			i.a. <sup>3</sup> kg/ha	Comercial kg ou L/ha			
Acifluorfen-sódio <sup>5</sup>	Blazer Sol Tackle 170	170	0,17 a 0,255	1,0 a 1,5	PÓS	I	Para pressão superior a 60 lb/pol <sup>2</sup> utilizar bico cônico. Não aplicar com baixa umidade relativa do ar.
		170	0,17 a 0,255	1,0 a 1,5	PÓS		
Alachlor	Laço	480	2,4 a 3,36	5,0 a 7,0	PRÉ	I	Pouco eficaz em condições de alta infestação de capim marmelada. Aplicar em solo úmido bem preparado. No sistema convencional, se não chover, incorporar superficialmente
Bentazon	Basagran 600	600	0,72	1,2	PÓS	II	Aplicar com plantas daninhas no estágio 2-6 folhas conforme a espécie. Para carrapicho rasteiro, utilizar 2,0 L/ha com óleo mineral emulsionável. Intervalo de segurança - 90 dias.
Bentazon + Acifluorfen-sódio	Volt	400 + 170	480 + 204	1,2	PÓS	I	
Chlorimuron-ethyl <sup>6</sup>	Classic	250	0,015 a 0,02	0,06 a 0,08	PÓS	III	Aplicar com a soja no estágio de 3 <sup>a</sup> folha trifoliolada e as plantas daninhas com 2 a 4 folhas, conforme a espécie. Pode-se utilizar aplicações terrestres, com volume de aplicação de até 100 L/ha de calda, utilizando-se bicos e tecnologia específicos.
Clethodim <sup>5</sup>	Select 240	240	0,084 a 0,108	0,35 a 0,45	PÓS	III	Aplicar com as gramíneas no estágio de 2 a 4 perfilhos ou 21 a 40 dias após a semeadura, utilizar adjuvante Lanza 0,5% v/v (aplicações terrestres) e 1% v/v (aplicações aéreas).
Clomazone	Gamit	500	0,8 a 1,0	1,6 a 2,0	PRÉ	II	Observar intervalo mínimo de 150 dias entre a aplicação do produto e a semeadura da cultura de inverno. Cruzamento de barra pode provocar fitotoxicidade. Para as espécies <i>Bracharia</i> spp. e <i>Sida</i> spp., utilizar a dose mais elevada.
Cloransulam-methyl	Pacto	840	0,04	0,047	PÓS	III	Utilizar Agral 0,2% v/v.
Cyanazine	Bladex 500	500	1,25 a 1,5	2,5 a 3,0	PRÉ	II	Para controle de plantas daninhas de folha larga. Não utilizar em solos com menos de 40% de argila e/ou com matéria orgânica inferior a 2%. Pode ser utilizado em pré-emergência ou incorporado.

Continua...

Nome comum	Nome comercial <sup>1</sup>	Concentração (g/L ou g/kg)	Dose <sup>2</sup>		Aplicação <sup>3</sup>	Classe toxicológica <sup>4</sup>	Observações
			i.a. <sup>3</sup> kg/ha	Comercial kg ou L/ha			
...Continuação Tabela 9.3							
Diclosulam	Spider 840 GRDA	840	0,02 a 0,035	0,024 a 0,0420	PPI	II	Não plantar no outono (safrinha) milho e sorgo não recomendados pelo fabricante; brassicas e girassol somente após 18 meses.
Dimethenamide	Zeta 900	900	1,125	1,25	PRÉ	I	Por recomendação do fabricante, utilizar somente em solos com CTC até 8 cmol <sub>c</sub> /dm <sup>3</sup> . Eficiente no controle de milheto.
Fenoxaprop-p-ethyl +Clethodim <sup>5</sup>	Podium S	50 +50	0,04 a 0,05 +0,04 a 0,05	0,8 a 1,0	PÓS	II	Para <i>Brachiaria plantaginea</i> utilizar a dose menor. Para <i>Eleusine indica</i> , utilizar a dose maior. Utilizar óleo mineral na dosagem de 1,0 L/ha.
Fenoxaprop-p-ethyl	Podium	110	0,069 a 0,096	0,625 a 0,875	PÓS	III	Aplicar com gramíneas no estágio de 2 a 4 perfilhos, conforme a espécie.
Fluazifop-p-butyl <sup>5</sup>	Fusilade 125	125	0,188	1,5	PÓS	II	Aplicar com as gramíneas no estágio de 2 a 4 perfilhos, conforme as espécies <i>Digitaria</i> spp. e <i>Echinochloa</i> spp. com até 2 perfilhos. Controla culturas voluntárias de aveia e milho.
Fluazifop-p-butyl + Fomesafen	Fusiflex	125 + 125	0,20 + 0,25	1,6 a 2,0	PÓS	I	Aplicar no estágio recomendado para o controle de folhas largas (2 a 4 folhas). Controla culturas voluntárias de aveia e milho. Intervalo de segurança - 95 dias. Para amendoim-bravo (2 a 4 folhas) pode ser utilizado sequencial de 0,8 + 0,8 L/ha com intervalo de 7 dias.
Fluazifop-p-butyl + Fomesafen	Robust	250 + 200	0,25 + 0,20	1,0	PÓS	III	Aplicar no estágio recomendado para o controle de folhas largas (2-4 folhas). Controla milho voluntário. Intervalo segurança 60 dias.
Flumetsulan	Scorpion	120	0,105 a 0,140	0,875 a 1,167	PRÉ	IV	Pode ser utilizado também em sistema de plantio direto.
Flumiclorac-pentyl <sup>6</sup>	Radiant 100	100	0,06	0,6	PÓS	I	Aplicar em plantas daninhas no estágio de 2 a 4 folhas com a cultura da soja a partir da segunda folha trifoliolada. Adicionar 0,2% v/v de Assist.
Flumioxazin	Flumizin 500 Surmisoya	500	0,045 a 0,06	0,09-0,12	PRÉ	III	Aplicar logo após a semeadura, podendo-se estender a aplicação até dois dias da semeadura.
		500	0,045 a 0,06	0,09-0,12	PRÉ	III	

Continua...

Nome comum	Nome comercial <sup>1</sup>	Concentração (g/L ou g/kg)	Dose <sup>2</sup>		Aplicação <sup>3</sup>	Classe toxicológica <sup>4</sup>	Observações
			i.a. <sup>3</sup> kg/ha	Comercial kg ou L/ha			
...Continuação Tabela 9.3							
Flumioxazin	Flumizin 500 Sumisoya	500	0,025	0,05	PÓS	III	Aplicar no estádio de 2 a 4 folhas das plantas daninhas e com a soja com 2 a 3 folhas trifolioladas. Não usar adjuvante e não misturar com graminicidas.
		500	0,025	0,05	PÓS		
Fomesafen <sup>5</sup>	Flex	250	0,250	1,0	PÓS	I	Aplicar com as plantas daninhas no estádio de 2 a 6 folhas conforme as espécies. Para corda-de-violão até 4 folhas. Para amendoim bravo (2 a 4 folhas) pode ser utilizado seqüencial de 0,4 + 0,4 (baixa infestação) ou 0,5 + 0,5 com intervalo de 7 dias.
Haloxifop-R, éster metílico <sup>5</sup>	Verdict-R	120	0,048 a 0,06	0,4 a 0,5	PÓS	II	Aplicar dos 15 aos 40 dias após a semeadura de soja. Intervalo de segurança - 98 dias.
Imazaquin	Scepter ou Topgan Scepter 70 DG	150	0,15	1,0	PPI/PRE	IV	Até que se disponha de mais informações, o terreno tratado com imazaquin não deve ser cultivado com outras culturas que não o trigo, aveia ou cevada no inverno e a soja no verão seguinte. Plantar milho somente 300 dias após aplicação do produto.
		700	0,14	0,200	PPI/PRE	III	
Imazethapyr	Pivot ou Vezir	100	0,10	1,0	PÓSI	III	Aplicar em PÓS precoce até 4 folhas ou 5 a 15 dias após a semeadura da soja. Não utilizar milho de safrinha em sucessão. Intervalo de segurança - 100 dias.
Lactofen	Cobra	240	0,15 a 0,18	0,625 a 0,75	PÓS	I	Não juntar adjuvante. Aplicar com as plantas daninhas no estádio de 2 a 6 folhas conforme as espécies. Intervalo de segurança - 84 dias.
Metolachlor	Dual Gold	960	1,44 a 1,92	1,5 a 2,0	PRÉ	I	Pouco eficaz em condições de alta infestação de capim marmelada.
Metribuzin	Sencor 480	480	0,35 a 0,49	0,75 a 1,0	PPI/PRE	III	Não utilizar em solos arenosos com teor de matéria orgânica inferior a 2%.
Oxasulfuron	Chart	750	0,06	0,08	PÓS	II	Aplicar no estádio de 2 a 4 folhas. Adicionar Extravon ou outro adjuvante não iônico 0,2% v/v. Continua...

Nome comum	Nome comercial <sup>1</sup>	Concentração (g/L ou g/kg)	Dose <sup>2</sup>		Aplicação <sup>3</sup>	Classe toxicológica <sup>4</sup>	Observações
			i.a. <sup>5</sup> kg/ha	Comercial kg ou L/ha			
...Continuação Tabela 9.3							
Pendimethalin	Herbadox	500	0,75 a 1,5	1,5 a 3,0	PPI	II	Pouco eficaz em condições de alta infestação de capim-marmelada. No sistema convencional, deve ser incorporado ou utilizado de forma aplique-plante. Na semeadura direta, só na forma aplique-plante.
Pendimethalin + Imazaquin	Squadron	240 +30	1,2 +0,150	5,0	PPI	III	
Propaquizafop <sup>5</sup>	Shogum CE	100	0,125	1,25	PÓS	III	Em dose única, aplicar até 4 perfilhos. Controla resteva de milho, trigo, aveia, cevada e avevém. Para milho pode ser utilizado dose de 0,7 a 1,0 l/ha comercial com 4 a 8 folhas. Não aplicar em mistura com latifolícolas.
Quizalofop-p-ethyl	Targa 50 CE	50	0,075 a 0,1	1,5 a 2,0	PÓS	I	Aplicar com as plantas daninhas no estágio de até 4 perfilhos. Não há necessidade de adição de surfactante.
Quizalofop-p-tefuri	Panther	120	0,072	0,6	PÓS	I	
Sethoxydim <sup>5</sup>	Poast BASF	184	0,23	1,25	PÓS	II	Aplicar com as gramíneas no estágio de 2 a 4 perfilhos, conforme as espécies.
Sulfentrazone	Boral 500 SC	500	0,60	1,2	PRÉ	IV	Aplicar antes da emergência da cultura e das plantas daninhas, se possível, imediatamente após a semeadura.
Tepraloxymim	Aramo	200	0,075 a 0,100	0,375 a 0,5	PÓS	I	Utilizar o adjuvante Dash na dose de 0,5% v/v.
Trifluralin	Vários	445 480	0,53 a 1,07 0,72 a 0,96	1,2 a 2,4 1,5 a 2,0	PPI PPI	II	Para o controle de gramínea, incorporar 5 a 7 cm de profundidade até 8 horas após aplicação. Não aplicar com solo úmido.
Trifluralin	Premierlin 600 CE	600	1,8 a 2,4	3,0 a 4,0	PRÉ	II	No sistema convencional, se não chover 5 a 7 dias depois da aplicação, proceder a incorporação superficial.

Continua...

- <sup>1</sup> A escolha do produto deve ser feita de acordo com cada situação. É importante conhecer as especificações dos produtos escolhidos.
- <sup>2</sup> A escolha da dose depende da espécie e do tamanho das invasoras para os herbicidas de pós-emergência e da textura do solo para os de pré-emergência. Para solos arenosos e de baixo teor de matéria orgânica, utilizar doses menores. As doses maiores são utilizadas em solos pesados e com alto teor de matéria orgânica.
- <sup>3</sup> PPI = pré-plantio incorporado; PRÉ = pré-emergência; PÓS = pós-emergência; PÓSi = pós emergência inicial; i.a. = ingrediente ativo.
- <sup>4</sup> Classe toxicológica: I = extremamente tóxico (DL<sub>50</sub> oral = até 50); II = altamente tóxico (DL<sub>50</sub> oral = 50-500); III = medianamente tóxico (DL<sub>50</sub> oral = 500-5000); IV = pouco tóxico (DL<sub>50</sub> oral = > 5000 mg/kg).
- <sup>5</sup> Juntar adjuvante recomendado pelo fabricante. No caso de Blazer e Tackle a 170 g/L, dispensa o uso de adjuvante, mantendo-se a dose por hectare.
- \* Antes de emitir recomendação e/ou receituário agrônômico, consultar relação de defensivos registrados no Ministério da Agricultura e cadastrados na Secretaria de Agricultura do estado (onde houver legislação pertinente).
- Obs.:** Aplicar herbicidas PRÉ logo após a última gradagem, com o solo em boas condições de umidade. Não aplicar herbicidas PÓS durante períodos de seca, em que as plantas estejam em déficit hídrico.

## Informações importantes:

- a) não aplicar herbicidas pós-emergentes na presença de muito orvalho e/ou imediatamente após chuva;
- b) não aplicar na presença de ventos fortes (>8 km/h), mesmo utilizando bicos específicos para redução de deriva;
- c) pode-se utilizar baixo volume de calda (mínimo de 100 L ha<sup>-1</sup>) quando as condições climáticas forem favoráveis e desde que sejam observadas as indicações do fabricante (tipo de bico, produtos);
- d) a aplicação de herbicidas deve ser realizada em ambiente com umidade relativa superior a 60%. Além disso, deve-se utilizar água limpa;
- e) não aplicar quando as plantas, da cultura e invasoras, estiverem sob estresse hídrico;
- f) para facilitar a mistura do herbicida trifluralin com o solo e evitar perdas por volatilização e fotodecomposição, o solo deve estar livre de torrões e preferencialmente, com baixa umidade;
- g) para cada tipo de aplicação, existem várias alternativas de bicos, os quais devem ser utilizados conforme indicação do fabricante. Verificar a uniformidade de volume de pulverização, tolerando variações máximas de 10% entre bicos;
- h) aplicações seqüenciais podem trazer benefícios em casos específicos, melhorando o desempenho dos produtos pós-emergentes e podendo, em certas situações, reduzir custos. Consiste em duas aplicações com intervalos de cinco a 15 dias, com o parcelamento da dose total;
- i) em solos de arenito, (baixos teores de argila), indica-se precaução na utilização de herbicidas pré-emergentes, pois podem provocar fitotoxicidade na soja. Para tais situações, recomenda-se reduzir as doses ou não utilizá-los;
- j) o uso de equipamento de proteção individual é indispensável em qualquer pulverização.

## Semeadura direta

O manejo de entressafra das invasoras requer a utilização de produtos a base de paraquat, paraquat + diuron, glyphosate, 2-4-D, chlorimuron, carfentrazone ou a mistura formulada de glyphosate + imazethapyr. O número de aplicações e as doses a serem utilizadas irão variar, em função da comunidade presente na área e seu estágio de desenvolvimento. Paraquat requer a mistura com surfactante não iônico na base de 0,1% a 0,2% v/v.

Aplicações seqüenciais na entressafra têm proporcionado excelentes resultados, principalmente quando se trata de espécies de difícil controle. A primeira aplicação geralmente ocorre cerca de 15 a 20 dias após a colheita da cultura comercial ou espécie cultivada para cobertura do solo.

No caso de espécies perenizadas, como o capim-amargoso e o capim-brachiaria, a dose de glyphosate poderá chegar a 5 L ha<sup>-1</sup>. Nessa situação, recomenda-se inicialmente o manejo mecânico (roçadeira, triturador) visando remover a folhagem velha e forçando a rebrota intensa, que deverá ter pelo menos 30 cm de altura no momento da dessecação.

O 2,4-D, indicado para o controle de folhas largas, deve ser utilizado na formulação amina, com intervalo de 10 dias de carência entre a aplicação e a semeadura da soja. Aplicações que não obedeçam as recomendações técnicas podem provocar danos às culturas suscetíveis, como videira, algodão, feijão, café e a própria soja.

A utilização de espécies de inverno para cobertura morta é uma alternativa que tem possibilitado a substituição ou a redução no uso de herbicidas em semeadura direta.

O controle de plantas daninhas em culturas de safrinha e em períodos de pousio (entressafra) é uma forma importante de reduzir a densidade de espécies como amendoim-bravo, picão-preto e outras, as quais podem infestar a soja cultivada posteriormente. Também neste período, é importante promover o controle da soja voluntária, a qual poderá se tornar hospedeira de ferrugem e outras doenças e pragas que irão se potencializar na safra seguinte.

Em semeadura direta sobre pastagem, na integração lavoura-pecuária, o período entre a dessecação e a semeadura da soja irá variar de 30 a 60 dias. Para espécies como *Brachiaria decumbens* e *Brachiaria brizantha*, 30 dias de antecedência poderão ser suficientes. Para *Paspalum notatum*, conhecida como grama mato grosso ou batatais, o período irá variar de 40 a 60 dias. As doses, para essas situações, irão variar com a espécie a ser eliminada, com a condição de cada pastagem e com a época de aplicação do produto. A dose variará entre 5 e 6 litros de glyphosate ou de sulfosate. No caso de *Paspalum*, devido à pilosidade excessiva nas folhas, a adição de 0,5% de óleo poderá ajustar a eficiência do produto.

As áreas que utilizaram o herbicida Tordon para o controle das plantas daninhas da pastagem podem apresentar resíduos que prejudicam a soja, podendo, até, causar morte das plantas. Poderá ser necessário um período de dois anos para que os resíduos sejam degradados e viabilizada a implantação da cultura. Recomenda-se monitorar a área.

## **Manejo de plantas daninhas na soja RR (Roundup Ready)**

O desenvolvimento da tecnologia da soja geneticamente modificada (transgênica) para resistência ao herbicida glyphosate (soja RR) trouxe profundas mudanças no manejo de espécies daninhas, pois onde antes se utilizavam outros herbicidas e misturas formuladas, agora poderá ser aplicado esse ingrediente ativo.

Trata-se de um herbicida de amplo espectro de ação, que pode ser utilizado em diferentes estádios de desenvolvimento das plantas daninhas.

Entretanto, seu uso em pós-emergência na cultura da soja transgênica deve estar associado às informações já conhecidas sobre mato-interferência, estádios de desenvolvimento da cultura e de registro e cadastro estadual.

A operação de controle das plantas que germinam antes da semeadura (dessecação de manejo), normalmente recomendada para soja conven-

cional, deve ser mantida, observando os critérios já estabelecidos e, apenas em casos raros, esta prática poderá ser alterada.

A utilização do glyphosate em pós-emergência da cultura e das espécies infestantes poderá ser feita em aplicação única ou seqüencial.

Atenção especial (estádio de desenvolvimento da planta daninha, densidade de infestação, dose, época de aplicação, etc.) deve ser dada às espécies tolerantes a esse herbicida como trapoeraba, erva-quente e erva-de-touro. Outras espécies de difícil controle, tais como erva-de-santa-luzia, poaia-branca, agriãozinho, capim-barbicha-de-alemão e corda-de-violão, podem ser selecionadas em função do uso continuado desse produto.

Desse modo, com o intuito de evitar a seleção de espécies tolerantes e resistentes ao glyphosate é importante rotacionar soja convencional e transgênica (soja RR) e/ou herbicidas de diferentes mecanismos de ação.

Assim, é necessário ter em mente que a utilização do glyphosate em soja RR constitui-se em mais uma ferramenta no controle das plantas daninhas e que as práticas de manejo integrado dessas espécies devem continuar sempre sendo priorizadas.

## Disseminação

Qualquer que seja o sistema de semeadura e a região em que se está cultivando a soja, cuidados especiais devem ser tomados quanto à disseminação das plantas daninhas. Tem-se observado aumento de infestação de algumas espécies de difícil controle químico, (*Cardiospermum halicacabum*) o balãozinho, por exemplo.

As práticas sugeridas (Gazziero et al., 1989) para evitar a disseminação de plantas daninhas incluem o uso de sementes de boa procedência, limpeza rigorosa de máquinas e implementos e a eliminação dos primeiros focos de infestação, visando impedir a formação de disseminulos.

## Resistência

Tem sido constatada a resistência de certas plantas daninhas como *Brachiaria plantaginea* e *Digitaria ciliaris*, resistentes aos herbicidas inibidores da ACCase, *Bidens pilosa*, *Bidens subalternans* e *Euphorbia heterophylla* resistentes aos herbicidas inibidores da enzima ALS.

No entanto, é comum confundir-se falta de controle com resistência. A maioria dos casos de seleção e de resistência podem ser esperados quando se utiliza o mesmo herbicida, ou herbicidas com o mesmo mecanismo de ação, consecutivamente. Erros na dose e na aplicação são as causas da maioria dos casos de falta de controle.

Prevenir a disseminação e a seleção de espécies resistentes são estratégias fundamentais para evitar-se esse tipo de problema. A utilização e a rotação de produtos com diferentes mecanismos de ação e a adoção do manejo integrado (rotação de culturas, uso de vários métodos de controle, etc) fazem parte do conjunto de indicações para um eficiente controle das invasoras.

## Dessecação em pré-colheita da soja

A dessecação da soja é uma prática que pode ser utilizada somente em área de produção de grãos, com o objetivo de controlar as plantas daninhas ou uniformizar as plantas com problemas de haste verde/retenção foliar.

Sendo necessária a dessecação em pré-colheita, é importante observar a época apropriada para executá-la. Aplicações realizadas antes da cultura atingir o estágio reprodutivo "R7", provocam perdas no rendimento. Esse estágio é caracterizado pelo início da maturação (apresenta uma vagem amarronzada ou bronzeada na haste principal - Fehr & Caviness, 1981). Os produtos utilizados são o paraquat (Gramoxone, na dose de 1,5-2,0 L ha<sup>-1</sup> do produto comercial, classe toxicológica II) ou diquat (Reglone, na dose de 1,5-2,0 L ha<sup>-1</sup> do produto comercial, classe toxicológica II). Doses mais elevadas devem ser utilizadas em áreas com maior massa foliar. No caso de predominância de gramíneas, utilizar o Gramoxone. Quando houver

predominância de folhas largas, principalmente corda-de-violão (*Ipomoea grandifolia*), utilizar o Reglone.

Para evitar que ocorram resíduos no grão colhido, deve observar-se o intervalo mínimo de sete dias entre a aplicação do produto e a colheita.

## Manuseio de herbicidas e descarte de embalagens

- ♦ Utilizar herbicidas devidamente registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e cadastrados na Secretaria de Agricultura dos estados que adotam este procedimento para uso na cultura da soja e para a espécie de planta daninha que deseja controlar. O número do registro consta no rótulo do produto.
- ♦ Usar equipamento de proteção individual (EPI) apropriado, em todas as etapas de manuseio de agrotóxicos (abastecimento do pulverizador, aplicação e lavagem de equipamentos e embalagens), a fim de evitar possíveis intoxicações.
- ♦ Não fazer mistura em tanque, de dois herbicidas, ou de herbicida (s) com outro (s) agrotóxico (s), procedimento proibido por lei (Instrução Normativa do MAPA nº 46, de 07/ 2002). Somente são permitidas a utilização de misturas formuladas.
- ♦ Em aplicação de herbicidas em condições de pós-emergência, respeitar o período de carência do produto (entre a data de aplicação e a colheita da soja). Na dessecação em pré-colheita, observar, obrigatoriamente, o intervalo mínimo de sete dias entre a pulverização do herbicida e a colheita, para evitar resíduos do herbicida nos grãos colhidos.
- ♦ Ler com atenção o rótulo e a bula do produto e seguir todas as orientações e os cuidados com o descarte das embalagens.
- ♦ Devolver as embalagens vazias (após a tríplex lavagem das embalagens de produtos líquidos), no prazo de um ano após a compra do produto, ao posto de recebimento indicado na nota fiscal de compra, conforme legislação do MAPA (Lei 9.974, de 06/06/2000 e Decreto 4.074, de 04/01/2002).

# 10

## Manejo de Insetos-Pragas

A cultura da soja está sujeita, durante todo o seu ciclo, ao ataque de diferentes espécies de insetos (Tabela 10.1). Embora esses insetos tenham suas populações reduzidas por predadores, parasitóides e doenças, em níveis dependentes das condições ambientais e do manejo de pragas que se pratica, quando atingem populações elevadas, capazes de causar perdas significativas no rendimento da cultura, necessitam ser controlados.

Apesar de os danos causados na cultura da soja serem, em alguns casos, alarmantes, não se indica a aplicação preventiva de produtos químicos, pois, além do grave problema de poluição ambiental, a aplicação desnecessária eleva os custos da lavoura e contribui para o desequilíbrio populacional dos insetos.

O controle das principais pragas da soja deve ser feito com base nos princípios do "Manejo de Pragas". Consiste de tomadas de decisão de controle com base no nível de ataque, no número e tamanho dos insetos-pragas e no estágio de desenvolvimento da soja, informações estas obtidas em inspeções regulares na lavoura com este fim. Em situações adversas, como estresse hídrico e excesso de chuvas, o técnico também deverá considerar, na tomada de decisão para realizar o controle dos insetos-pragas, o porte das plantas, o tamanho da área a ser tratada e a disponibilidade de equipamentos. Nos casos das lagartas desfolhadoras e dos percevejos, as amostragens devem ser realizadas com um pano-debatida, de cor branca, preso em duas varas, com 1m de comprimento, o qual deve ser usado em duas (lagarta) ou uma (percevejo) fileira de soja. As plantas devem ser sacudidas vigorosamente sobre o mesmo, promovendo a queda dos insetos, que deverão ser contados. Esse procedimento deve ser repetido em vários pontos da lavoura, considerando-se, como resultado, a média de todos os pontos amostrados. Especificamente para os percevejos, as amostragens devem seguir as seguintes indicações:

Tabela 10.1. Insetos-pragas da soja e parte da planta que atacam.

Nome científico	Nome comum	Parte da planta atacada	Observações
.....Principais.....			
<i>Anticarsia gemmatalis</i>	Lagarta-da-soja	Fo	
<i>Euschistus heros</i>	Percevejo marrom	Va, Se	
<i>Piezodorus guildinii</i>	Percevejo verde pequeno	Va, Se	
<i>Nezara viridula</i>	Percevejo verde	Va, Se	
.....Regionalmente importantes.....			
<i>Stemechus subsignatus</i>	Tamanduá-da-soja	Ha	Tem alto potencial de dano
<i>Scaptocoris</i> spp.	Percevejos-castanhos-da-raiz	Ra	Importante na região do cerrado. Têm alto potencial de dano
<i>Phyllophaga cuyabana</i> , <i>Liogenys</i> spp. e <i>Plectris pexa</i>	Corós	Ra	
.....Secundárias.....			
<i>Elasmopalpus lignosellus</i>	Broca-do-colo	Ha	Importante se ocorrer período seco na fase inicial da cultura
<i>Chalcodermus</i> sp.	Bicudinho	Fo	
<i>Pseudoplusia includens</i>	Falsa-medideira	Fo	
<i>Maecolaspis calcarifera</i>	Vaquinha	Fo	
<i>Megascelis</i> sp.	Vaquinha	Fo	
<i>Dichelops melacanthus</i>	Barriga verde	Va, Se	
<i>Edessa meditabunda</i>		Va, Se	

Continua...

Nome científico	Nome comum	Parte da planta atacada	Observações
...Continuação Tabela 10.1			
..... Secundárias.....			
<i>Epinotia aporema</i>	Broca-das-axilas	Fo, Br, Va	Importância em áreas restritas
<i>Diabrotica speciosa</i>	Patriota	Fo(A), Ra(L)	Mais comum após milho "safrinha"
<i>Cerotoma</i> sp.	Vaquinha	Fo, Va(A), No(L)	
<i>Aracanthus mourei</i>	Torrãozinho	Co, Fo, Pe	Ocorre no início do desenvolvimento da soja
<i>Bemisia tabaci</i> Biotipo B	Mosca branca	Fo	Tem alto potencial de dano
	Tripes	Fj	Vetores de vírus da "queima do broto"; ocorrem em áreas restritas
	Piolho-de-cobra	PI, Se, Co	Importante em semeadura direta
<i>Dysmicoccus</i> sp. e <i>Pseudococcus</i> sp.	Caracóis e lesmas	PI, Co, Fj	Importantes em semeadura direta
	Cochonilhas-da-raiz	Ra	Importantes em semeadura direta
<i>Omiodes indicata</i>	Lagarta-enroladeira	Fo	Pode ocorrer no período reprodutivo e causar pequena desfolha
	Ácaros	Fo	Causa secamento e queda das folhas

Br = brotos; Co = cotilédones; Fj = folhas jovens; Fo = folhas; Ha = hastes; No =nódulos; Pe = pecíolos; PI = plântulas; Pp = plantas pequenas; Ra = raízes; Se = sementes; Va = vagens.

(A) = adulto, (L) = larva.

- ser realizadas nos períodos mais frescos do dia, quando os percevejos se movimentam menos;
- ser feitas com maior intensidade nas bordas da lavoura, onde, em geral, os percevejos iniciam seu ataque;
- ser repetidas, de preferência, **todas as semanas**, do início da formação de vagens (R3) até a maturação fisiológica (R7); e
- usar o pano-de-batida em apenas 1m de fileiras de soja.

**A simples observação visual sobre as plantas não expressa a população real presente na lavoura, especialmente dos percevejos.** O controle deve ser realizado somente quando forem atingidos os níveis de danos mencionados na Tabela 10.2 e no item 10.2.

**Tabela 10.2.** Níveis de ação de controle para as principais pragas da soja.

Emergência	Período vegetativo	Floração	Formação de vagens	Enchimento de vagens	Maturação
	30% de desfolha ou 40 lagartas/2m*		15% de desfolha ou 40 lagartas/2m*		
	Lavouras para consumo		2 percevejos/m**		
	Lavouras para semente		1 percevejo/m**		
	Broca-das-axilas: a partir de 25% - 30% de plantas com ponteiros atacados				
	Tamanduá-da-soja: até V3: 1 adulto/m linear de V4 a V6: 2 adultos/m linear				
			Lagartas-das-vagens: a partir de 10% de vagens atacadas		

\* Maiores de 1,5cm e considerando a batida de 2 fileiras de soja sobre o pano.

\*\* Maiores de 0,5cm e considerando a batida de apenas 1 fileira de soja sobre o pano.

## 10.1 Espécies de insetos que atacam a soja

Os insetos-pragas da soja, categorizados em “principais”, “regionalmente

importantes” e “secundários”, em função da frequência, abrangência e danos provocados na cultura, são apresentados na Tabela 10.1.

## 10.2 Níveis de dano para tomada de decisão de controle

Os níveis de dano estabelecidos para os principais insetos-pragas da soja são apresentados na Tabela 10.2.

**Lagartas desfolhadoras (*A. gemmatalis* e *P. includens*)** - Devem ser controladas quando forem encontradas, em média, 40 lagartas grandes (>1,5 cm) por 2m (duas fileiras de plantas), ou com menor número se a desfolha atingir 30%, antes da floração, e 15% tão logo apareçam as primeiras flores. Para controle com Baculovírus, considerar como limites máximos 40 lagartas pequenas (no fio) ou 30 lagartas pequenas e 10 lagartas grandes por 2m. Em condição de seca prolongada e com plantas menores de 50 cm de altura, reduzir esses níveis para a metade, para a aplicação de Baculovírus (ver Folder nº 02/2001 “Controle a lagarta da soja com Baculovírus, um inseticida biológico”).

**Percevejos** - O controle deve ser iniciado quando forem encontrados dois percevejos adultos ou ninfas com mais de 0,5cm por metro. Em campos de produção de sementes, o nível deve ser reduzido para um percevejo por metro.

**Broca das axilas** - Controlar quando a lavoura apresentar em torno de 25% a 30% de plantas com ponteiros atacados.

## 10.3 Medidas de controle

Os produtos indicados para o controle das pragas da soja, encontram-se nas Tabelas 10.3 a 10.6. Na escolha do produto, levar em consideração a toxicidade, o efeito sobre inimigos naturais e o custo por hectare. Atentar para as doses indicadas, utilizar EPI (equipamento de proteção individual) durante o preparo e a aplicação dos defensivos e dar o destino correto às embalagens, conforme legislação vigente.

**Tabela 10.3.** Inseticidas indicados\* para o controle de *Anticarsia gemmatilis* (lagarta-da-soja), para a safra 2005/06. Comissão de Entomologia da XXVII Reunião de Pesquisa de Soja da Região Central do Brasil, realizada em Cornélio Procopio, PR. Embrapa Soja. Londrina, PR. 2005.

Nome técnico	Dose (g i.a./ha)	Nome comercial	Formulação	Concentração (g i.a./kg ou l)	Dose produto comercial (kg ou l/ha)	Classe toxicológica <sup>3</sup>	Nº registro MAPA
<i>Baculovirus anticarsia</i> <sup>1</sup>	50		LE <sup>2</sup>				
<i>Bacillus thuringiensis</i>	–	Dipel PM	PM	16 x 10 <sup>9</sup> U.I.	0,500	IV	008589
	–	Thuricide	PM	16 x 10 <sup>9</sup> U.I.	0,500	IV	016084-90
Betaciflutrina	2,5	Bulldock 125 SC	SC	125	0,020	II	001192-00
Betacipermetrina	6	Akito	CE	100	0,060	II	01703
Carbaril	192	Sevin 480 SC	SC	480	0,400	III	009186-00
	192	Carbaryl Fersol 480 SC	SC	480	0,400	III	026183-88
Clorfluazurom	5	Atabron 50 CE	CE	50	0,100	I	006894
Clorpirifós	120	Lorsban 480 BR	CE	480	0,250	II	022985
Diflubenzurom	7,5	Dimilin	PM	250	0,030	IV	018485-91
Etofenprox	12	Trebon 300 CE	CE	300	0,040	III	000695
Endossulfam <sup>4</sup>	87,5	Dissulfan CE	CE	350	0,250	I	022087-89
	87,5	Endosulfan 350 CE	CE	350	0,250	I	030983-88
	87,5	Defensa					
	87,5	Thiodan CE	CE	350	0,250	II	010487
	87,5	Thiodan UBV	UBV	250	0,350	I	025487
Lufenurom	7,5	Match CE	CE	50	0,150	IV	009195

Continua...

Nome técnico	Dose (g i.a./ha)	Nome comercial	Formulação	Concentração (gb i.a./kg ou l)	Dose produto comercial (kg ou l/ha)	Classe toxicológica <sup>3</sup>	Nº registro MAPA
...Continuação Tabela 10.3							
Metoxifenozeide	21,6	Intrepid 240 SC	SC	240	0,090	IV	00699
		Valient	SC	240	0,090	IV	01999
Novalurom	7,5	Rimon 100 EC	CE	100	0,075	IV	03900
Permetrina SC	12,5	Tifon 250 SC	SC	250	0,050	III	009189
Profenofós <sup>5</sup>	80	Curacron 500	CE	500	0,160	II	008686-88
Tebufenozide	30	Mimic 240 SC	SC	240	0,125	IV	007796
Teflubenzurom	7,5	Nomolt 150 SC	SC	150	0,050	IV	001393
Tiodicarbe	56	Larvin 800 WG	GrDA	800	0,070	II	04099
Triclorfom	400	Dipterex 500	CS	500	0,800	II	005286-88
		Triclorfon 500 Defesa	CS	500	0,800	II	004985-89
Triflumumom	15	Alsystin 250 PM	PM	250	0,060	IV	000792-99
	14,4	Alsystin 480 SC	SC	480	0,030	IV	03899
	14,4	Certero	SC	480	0,030	IV	04899
	14,4	Libre	SC	480	0,030	IV	05399

<sup>1</sup> Produto preferencial. Para maiores esclarecimentos sobre seu uso, consultar o Folder nº 02/2001, da Embrapa Soja.

<sup>2</sup> Lagartas-equivalentes (igual a 50 lagartas mortas por *Baculovirus*).

<sup>3</sup> I = extremamente tóxico (DL<sub>50</sub> oral = até 50); II = altamente tóxico (DL<sub>50</sub> Oral = 50-500); III = medianamente tóxico (DL<sub>50</sub> Oral = 500-5000); IV = pouco tóxico (DL<sub>50</sub> Oral = > 5000 mg/kg).

<sup>4</sup> Este produto pode ser utilizado em dose reduzida 35g i.a./ha) misturado com *Baculovirus*, quando a população de lagartas grandes for superior a 10 e inferior a 40 lagartas/pano de batida.

<sup>5</sup> Este produto pode ser utilizado em dose reduzida (30g i.a./ha) misturado com *Baculovirus*, quando a população de lagartas grandes for superior a 10 e inferior a 40 lagartas/pano de batida.

\* Antes de emitir indicação e/ou receituário agrônômico, consultar relação de defensivos registrados no MAPA e cadastrados na Secretaria da Agricultura do estado.

**Tabela 10.4.** Inseticidas indicados\* para o controle de percevejos (*Nezara viridula*, *Piezodorus guildinii* e *Euschistus heros*)\*\*, para a safra 2005/06. Comissão de Entomologia da XXVII Reunião de Pesquisa de Soja da Região Central do Brasil, realizada em Cornélio Procópio, PR. Embrapa Soja. Londrina, PR. 2005.

Nome técnico	Dose (g i.a./ha)	Nome comercial	Formulação	Concentração (g i.a./kg ou l)	Dose produto comercial (kg ou l/ha)	* Classe toxicológica <sup>6</sup>	Nº registro MAPA
Acefato	225	Orthene 750 BR	PS	750	0,300	IV	02788394
Carbaryl <sup>1</sup>	800	Carbaryl Fersol 480 SC	SC	480	1,666	III	26183
	800	Sevin 480 SC	SC	480	1,666	II	9186
Endossulfam <sup>2</sup>	437,5	Dissulfan CE	CE	350	1,250	I	022087-89
	437,5	Endossulfan 350 CE Defesa	CE	350	1,250	I	030983-88
	437,5	Thiodan CE	CE	350	1,250	II	010487
	437,5	Thiodan UBV	UBV	250	1,750	I	025487
Endossulfam SC	500	Endozol	SC	500	1,000	II	013488
Endossulfam <sup>3</sup>	350	Dissulfan CE	CE	350	1,000	I	022087-89
	350	Endossulfan 350 CE Defesa	CE	350	1,000	I	030983-88
	350	Thiodan CE	CE	350	1,000	II	010487
	350	Thiodan UBV	UBV	250	1,400	I	025487
Fenitrotiom <sup>4</sup>	500	Sumithion 500 CE	CE	500	1,000	III	5183
Imidaclopride + betaciflutrina <sup>5</sup>	75 +	Connect	SC	100 +	0,750	II	04804
	9,375			12,5			
Metamidofós	300	Tamaron BR	CS	600	0,500	II	4983

Continua...

Nome técnico	Dose (g i.a./ha)	Nome comercial	Formulação	Concentração (g i.a./kg ou l)	Dose produto comercial (kg ou l/ha)	Classe toxicológica <sup>5</sup>	Nº registro MAPA
...Continuação Tabela 10.4							
	300	Hamidop 600	CS	600	0,500	I	035082
	300	Metafós	CS	600	0,500	II	000989
	300	Faro	CS	600	0,500	II	01296
Monocrotofós	150	Azodrin 400	CS	400	0,375	I	10187
Paratiom metílico <sup>5</sup>	480	Folidol 600	CE	600	0,800	I	3984
Tiametoxam + lambdacialotrina <sup>3</sup>	28,2 + 21,2	Engeo Pleno	SC	141 + 106	0,200	III	06105
Tiametoxam + lambdacialotrina <sup>4</sup>	21,2 + 15,9	Engeo Pleno	SC	141 + 106	0,150	III	06105
Triclorfom	800	Dipterex 500	CS	500	1,600	II	005286-88
	800	Triclorfon 500 Defesa	CS	500	1,600	II	004985-89

<sup>1</sup> Produto indicado somente para o controle de *Piezodorus guildinii*.

<sup>2</sup> Produto e dose indicados para o controle de *Nezara viridula* e *Piezodorus guildinii*.

<sup>3</sup> Produto e dose indicados somente para o controle de *Euschistus heros*.

<sup>4</sup> Produto e dose indicados somente para o controle de *Nezara viridula*.

<sup>5</sup> Produto e dose indicados para o controle de *Nezara viridula* e *Euschistus heros*.

<sup>6</sup> I = extremamente tóxico (DL<sub>50</sub> oral = até 50); II = altamente tóxico (DL<sub>50</sub> Oral = 50-500); III = medianamente tóxico (DL<sub>50</sub> Oral = 500-5000); IV = pouco tóxico (DL<sub>50</sub> Oral = > 5000 mg/kg).

\* Antes de emitir indicação e/ou receituário agrônomo, consultar relação de defensivos registrados no MAPA e cadastrados na Secretaria da Agricultura do estado.

\*\* Para o controle dos percevejos que atacam a soja poderão ser utilizados os inseticidas indicados em doses reduzidas pela metade e misturadas com 0,5% de sal de cozinha refinado (500 g sal/100 l de água) em aplicação terrestre. Recomenda-se lavar bem o equipamento com detergente comum ou óleo mineral, após o uso, para diminuir o problema da corrosão pelo sal.

**Tabela 10.5.** Inseticidas indicados\* para o controle de outras pragas da soja, para a safra 2005/06.

Inseto-praga	Nome técnico	Dose (g i.a./ha)
<i>Epinotia aporema</i> (broca-das-axilas)	Metamidofós	300
	Paratiom metílico	480
<i>Pseudoplusia includens</i> (lagarta falsa-medideira)	Ciflutrina <sup>1</sup>	7,5
	Carbaril	320
	Endossulfam	437,5
	Metamidofós	300
	Metomil <sup>2</sup>	172
<i>Spodoptera latifascia</i> e <i>Spodoptera eridania</i> (lagarta-das-vagens)	Clorpirifós	480
<i>Stemechus subsignatus</i> (tamanduá-da-soja)	Metamidofós	480
	Fipronil <sup>3</sup>	50 <sup>4</sup>

<sup>1</sup> Nome comercial: Baytroid CE; formulação e concentração: CE - 50 g i.a./l; n° registro no MAPA: 011588; classe toxicológica: I (LD<sub>50</sub> oral = 1.410 e LD<sub>50</sub> dermal = 5.000 mg/kg); carência: 20 dias.

<sup>2</sup> Nome comercial: Lannate BR; formulação e concentração: CS - 215 g i.a./l; n° registro no MAPA: 1238603; classe toxicológica: I (DL<sub>50</sub> oral = 130 e DL<sub>50</sub> dermal = >1500 mg/kg); carência: 14 dias.

<sup>3</sup> Nome comercial: Standak 250 FS; formulação e concentração: SC-250 g i.a./l; n° registro no MAPA: 01099; classe toxicológica: IV (LD<sub>50</sub> oral = 660 e LD<sub>50</sub> dermal = 911 mg/kg); carência: sem restrições. Em áreas de rotação de culturas com planta não-hospedeira, pode-se utilizar as sementes tratadas com este inseticida somente na bordadura da lavoura, numa faixa de 40 a 50 m.

<sup>4</sup> Dose em g i.a./100 kg de sementes, correspondente a 200 ml do produto comercial/100 kg de semente.

\* Antes de emitir indicação e/ou receituário agrônômico, consultar relação de defensivos registrados no MAPA e cadastrados na Secretaria da Agricultura do estado.

**Tabela 10.6.** Efeito sobre predadores, toxicidade para animais de sangue quente, índice de segurança e período de carência dos inseticidas indicados para o Programa de Manejo Integrado de Pragas, safra 2005/06.

Inseticida	Dose (g l.a./ha)	Efeito <sup>1</sup> sobre predadores	Toxicidade DL <sub>50</sub>		Índice de segurança <sup>2</sup>		Carência (dias)
			Oral	Dermal	Oral	Dermal	
1) <i>Anticarsia gemmatilis</i>							
<i>Baculovirus anticarsia</i>	50 <sup>3</sup>	1	–	–	–	–	Sem restrições
<i>Bacillus thuringiensis</i>	500 <sup>4</sup>	1	–	–	–	–	Sem restrições
Betaciflutrina	2,5	2	655	>5000	>10000	>10000	20
Betacipermetrina	6	2	625	>5000	>10000	>10000	14
Carbaril	200	1	590	2166	295	1083	3
Clorfluazurom	5	1	>6000	>12000	>10000	>10000	14
Clorpirifós	120	2	437	1400	364	1167	21
Diflubenzurom	7,5	1	4640	2000	>10000	>10000	21
Endossulfam <sup>5</sup>	87,5	1	173	368	198	421	30
Etofenprox	12	1	1520	>5000	>10000	>10000	15
Lufenuron	7,5	1	>4000	>4000	>10000	>10000	15
Metoxifenoziide	21,6	1	>5000	>2000	>10000	>9259	7
Novalurom	7,5	1	>5000	>2000	>10000	>10000	53
Permetrina SC <sup>6</sup>	12,5	1	>4000	>4000	>10000	>10000	60
Profenofós <sup>7</sup>	80	1	358	3300	447,5	4125	21
Tebufenozide	30	1	>5000	>5000	>10000	>10000	14
Teflubenzurom	7,5	1	>6000	>8000	>10000	>10000	30
Tiodicarbe	56	1	129	>2000	230	>3571	14
Triclorfom	400	1	580	2266	145	567	7
Triflumurom	15	1	>5000	>5000	>10000	>10000	28

Continua...

Inseticida	Dose (g i.a./ha)	Efeito <sup>1</sup> sobre predadores	Toxicidade DL <sub>50</sub>		Índice de segurança <sup>2</sup>		Carência (dias)
			Oral	Dermal	Oral	Dermal	
...Continuação Tabela 10.6							
2) <i>Nezara viridula</i> .....							
Acefato	225	2	1494	10450	664	4644	14
Endossulfam	437,5	2	173	368	40	84	30
Endossulfam SC	500	3	392	589	78	118	30
Fenitrotiom	500	3	384	2233	77	*447	7
Imidaclopride + betaciflutrina	750 <sup>4</sup>	3	2500	>4000	333	>533	21
Metamidofós	300	3	25	115	8	38	23
Monocrotofós	150	3	14	336	9	224	21
Paratiom metílico	480	3	15	67	3	14	15
Tiametoxam + lambdacialotrina	150 <sup>4</sup>	3	310	>2000	207	>1333	30
Triclorfom	800	1	580	2266	73	283	7
3) <i>Piezodorus guildinii</i> .....							
Acefato	225	2	1494	10450	664	4644	14
Carbaril	800	1	590	2166	74	271	3
Endossulfam	437,5	2	173	368	40	84	30
Endossulfam SC	500	3	392	589	78	118	30
Metamidofós	300	3	25	115	8	38	23
Monocrotofós	150	3	14	336	9	224	21
Triclorfom	800	1	580	2266	73	283	7

Continua...

Inseticida	Dose (g i.a./ha)	Efeito <sup>1</sup> sobre predadores	Toxicidade DL <sub>50</sub>		Índice de segurança <sup>2</sup>		Carência (dias)
			Oral	Dermal	Oral	Dermal	
...Continuação Tabela 10.6							
4) <i>Euschistus heros</i> .....							
Acefato	225	2	1494	10450	664	4644	14
Endossulfam	350	1	173	368	49	105	30
Endossulfam SC	500	3	392	589	78	118	30
Imidaclopride + betaciflutrina	750 <sup>4</sup>	3	2500	>4000	333	>533	21
Metamidofós	300	3	25	115	8	38	23
Monocrotofós	150	3	14	336	9	224	21
Paratiom metílico	480	3	15	67	3	14	15
Tiametoxam + lambdacialotrina	200 <sup>4</sup>	3	310	>2000	155	>1000	30
Triclorfom	800	1	580	2266	73	283	7

<sup>1</sup> 1 = 0 - 20%; 2 = 21 - 40%; 3 = 41 - 60%; 4 = 61 - 100% de redução populacional de predadores.

<sup>2</sup> Índice de segurança (I.S.) = 100 x DL<sub>50</sub>/dose de i.a.); considera o risco de intoxicação em função da formulação e da quantidade de produto a ser manipulado quanto menor o índice, menor a segurança.

<sup>3</sup> Lagartas equivalentes (igual a 50 lagartas, mortas por *Baculovirus*). Para aplicação aérea, seguir as orientações contidas no texto deste documento.

<sup>4</sup> Dose do produto comercial.

<sup>5</sup> Este produto pode ser utilizado em dose reduzida (35g i.a./ha), misturado com *Baculovirus*, quando a população de lagartas grandes for superior a 10 e inferior a 40 lagartas/pano de batida.

<sup>6</sup> Inseticida indicado apenas na formulação Suspensão Concentrada.

<sup>7</sup> Este produto pode ser utilizado em dose reduzida (30g i.a./ha), misturado com *Baculovirus*, quando a população de lagartas grandes for superior a 10 e inferior a 40 lagartas/pano de batida.

Antes de emitir indicação e/ou receituário agrônomo, consultar a relação de defensivos registrados no MAPA e cadastrados na Secretaria da Agricultura do estado.

**Lagarta da soja (*A. gemmatilis*)** - Dar preferência, sempre que possível, à utilização do *Baculovirus*, na dose de 20 g/ha de lagartas mortas pelo próprio vírus (aproximadamente 50 lagartas/ha), maceradas em um pouco de água, ou 20g/ha da formulação em pó molhável. Em situações nas quais a população de lagartas grandes já tenha ultrapassado o limite para a aplicação de Baculovirus puro (mais que 10 lagartas grandes/2m) e for inferior ao nível preconizado para o controle químico (40 lagartas grandes/2m), o Baculovirus pode ser utilizado em mistura com o inseticida profenofós ou com endossulfam, na dose de 30 g i.a./ha e 35 g i.a./ha, respectivamente.

O preparo do material deve ser feito batendo-se a quantidade de lagartas mortas ou o pó, juntamente com a água, em liquidificador, e coando a calda em tecido tipo gaze, no momento de transferir para o tanque do avião ou do pulverizador. Caso a aplicação tenha início pela manhã, o preparo do material pode ser realizado durante a noite anterior. No caso de aplicação por avião, usar a mesma dose, empregando água como veículo, na quantidade de 15 l/ha, ajustar o ângulo da pá do "micronair" para 45 a 50 graus, estabelecer a largura da faixa de deposição em 18 m e voar a uma altura de 3 a 5 m, a 105 milhas/hora, com velocidade do vento não superior a 10 km/h.

Em caso de ataques da lagarta-da-soja no início do desenvolvimento da cultura (plantas até o estágio V4 - três folhas trifolioladas), associados com períodos de seca, o controle da praga deverá ser realizado com outros produtos seletivos e indicados (Tabelas 10.3 e 10.7), visto que, nessas condições, haverá necessidade de controle rápido das lagartas, caso contrário poderá ocorrer desfolha que prejudicará o desenvolvimento das plantas.

**Percevejos** - Em certas situações, o controle químico pode ser efetuado apenas nas bordas da lavoura, sem necessidade de aplicação de inseticida na totalidade da área, porque o ataque destes insetos se inicia pelas áreas marginais, aí ocorrendo as maiores populações. Uma alternativa econômica é a mistura de sal de cozinha (cloreto de sódio) com a metade da dose de qualquer um dos inseticidas indicados na Tabela 10.4 (ver observações no rodapé). O sistema consiste no uso de

apenas 50% da dose indicada do inseticida, misturada a uma solução de sal a 0,5%, ou seja, com 500 gramas de sal de cozinha para cada 100 litros de água colocados no tanque do pulverizador, em aplicação terrestre. O primeiro passo é fazer uma salmoura separada e, depois, misturá-la à água do pulverizador que, por último, vai receber o inseticida.

#### 10.4 Pragas de difícil controle

Neste grupo, destacam-se a “lagarta falsa-medideira”, o “tamanduá-da-soja” ou “bicudo-da-soja”, o “percevejo castanho” e os “corós”.

**“Tamanduá-da-soja”** - É um gorgulho de aproximadamente 8 mm de comprimento, de cor preta com listras amarelas no dorso da cabeça e nas asas. Os danos são causados tanto pelos adultos, que raspam o caule e desfiam os tecidos, como pelas larvas, brocando e provocando o surgimento de galha. O controle químico desse inseto não tem sido eficiente. As larvas ficam protegidas no interior das galhas e os adultos, além de emergirem do solo por um longo período, ficam a maior parte do tempo sob a folhagem da soja, nas partes baixas da planta. Algumas práticas culturais podem ser utilizadas para, gradualmente, diminuir a sua ocorrência.

Nível de dano - Nos locais em que, na safra anterior, foram observados ataques severos do inseto, antes de planejar o cultivo da safra seguinte, deve-se avaliar o grau de infestação na entressafra. Para cada 10 ha, retirar quatro amostras de solo, centradas nas antigas fileiras de soja, com 1m de comprimento e largura e profundidade de uma pá de corte. Contar o número de larvas hibernantes. Para cada três a seis larvas/amostra, há possibilidade de uma ou duas atingirem o estágio adulto, podendo causar uma quebra de sete a 14 sacas de soja por hectare, na safra seguinte. Em lavoura de soja já estabelecida, o controle do inseto se justifica quando a população atinge um adulto por metro de fileira, em plantas com duas folhas trifolioladas, e dois adultos por metro linear, em plantas com três a cinco folhas trifolioladas (Tabela 10.2).

Controle - A rotação de culturas é a técnica mais eficiente para o seu manejo, mas sempre associada a outras estratégias, como plantas-iscas e controle químico na bordadura da lavoura. Resultados recentes de pesquisas têm mostrado reduzido percentual de plantas mortas e danificadas e maior produtividade, no final do período de rotação soja-milho-soja, quando comparado ao monocultivo de soja. Assim, onde forem detectadas larvas no solo, na entressafra, pelo processo acima descrito, é indicado substituir a soja por uma espécie não-hospedeira (milho, milheto, sorgo ou girassol), para interromper o ciclo biológico do inseto. Aumenta a eficiência de controle circundar a espécie não hospedeira com uma hospedeira preferencial (soja, feijão ou lab-lab), que funcionará como planta-isca, atraindo e mantendo os insetos na bordadura da lavoura. Nesse caso, pulverizar com inseticida químico (Tabela 10.5) apenas uma faixa de 25 m na face interna dessa bordadura, nos meses de novembro e dezembro, quando a maior parte dos adultos sai do solo, e repetir o controle sempre que o inseto atingir os níveis de dano, conforme a fase da cultura. As pulverizações noturnas, entre às 22 h e às 2 h, são mais eficientes, pois a maioria dos adultos, nesse período, encontra-se na parte superior das plantas, em acasalamento. Em área não infestada, em região onde ocorre essa praga, para evitar que o inseto infeste toda a lavoura, semear uma bordadura de 40 a 50 m de largura, com sementes de soja tratadas com o inseticida fipronil (Tabela 10.5). Outra forma de controle do inseto na bordadura de plantas-iscas é o controle mecânico, roçando a soja e, conseqüentemente, matando as larvas presentes nas plantas. Essa operação deve ser feita aos 40-50 dias após a detecção das primeiras hastes de soja raspadas pelos adultos, matando as larvas antes de sua entrada no solo para hibernação.

**“Corós”** - O complexo de corós (*Phyllophaga cuyabana*, *Liogenys* spp.) é um grupo de insetos que vem causando danos à soja, especialmente no Paraná, em Goiás e no Mato Grosso do Sul. Ocorre, também, no Mato Grosso, no sudoeste do Estado de São Paulo e na região do Triângulo Mineiro, em Minas Gerais. A espécie predominante varia de região para região, mas todas têm hábitos semelhantes e causam o mesmo tipo de dano à soja. Os sintomas de ataque vão desde amarelecimento das folhas e redução do crescimento até morte das plantas e são visualizados

em reboleiras. O número de plantas mortas pode variar com a época de semeadura e com a população e o tamanho das larvas na área.

Danos à soja - os danos são causados pelas larvas, principalmente a partir do 2º instar, as quais consomem raízes. No início do desenvolvimento das plantas, uma larva com 1,5 a 2 cm de comprimento, para cada quatro plantas, reduz o volume de raízes em cerca de 35%, e uma larva de 3 cm, no mesmo nível populacional, causa redução de 60% ou mais nas raízes, podendo causar a morte da plântula. Para a maioria das espécies, na fase adulta apenas a fêmea se alimenta, ingerindo folhas, sem contudo, causar prejuízos à soja.

Controle - o manejo de corós, em soja, deve ser baseado em um conjunto de medidas que, integradas, possam permitir a convivência da cultura com o inseto. O cultivo de milho ou outra cultura em safrinha nos talhões infestados por corós deve ser evitado, pois essa prática aumentará a população na safra seguinte. O controle químico só é viável quando a semeadura é feita na presença de larvas com 1 cm ou mais. Entretanto, a proteção das plantas, em geral, é apenas inicial. Os adultos são mais sensíveis aos inseticidas do que as larvas, mas seu controle por produtos químicos também é difícil, em função do seu comportamento. A aração do solo, nas horas mais quentes do dia, com implementos que atingem maior profundidade, pode, em alguns casos, diminuir a população, através de dano mecânico às larvas, da sua exposição a aves e a outros predadores e do deslocamento de larvas em diáspora e pupas para camadas do solo mais superficiais. Porém, **o revolvimento do solo em áreas de semeadura direta, única e exclusivamente com objetivo de controlar esse inseto, não é indicado.** Qualquer medida que favoreça o desenvolvimento radicular da planta, como evitar a formação de camadas adensadas e correção da fertilidade e acidez do solo, aumentará também a tolerância da soja aos insetos rizófagos.

**“Percevejo-castanho-da-raiz”** - Há registro da ocorrência de três espécies da família Cydnidae que sugam a raiz de soja, em várias regiões do Brasil: *Scaptocoris castanea*, *Scaptocoris carvalhoi* e *Scaptocoris buckupi*. A ocorrência dessa praga era esporádica em várias regiões e culturas, mas, a partir da década de 90, o problema em soja e outras culturas co-

meçou a ser mais freqüente. Pode ocorrer tanto em semeadura direta, como em convencional. É uma praga de hábito subterrâneo e tanto as ninfas como os adultos atacam as raízes das plantas. Sua ocorrência como praga é mais freqüente na região Centro-Oeste, mas sua incidência vem crescendo também em São Paulo e Minas Gerais. Foram, ainda, registrados focos isolados em lavouras de soja no Paraná e em Rondônia.

Danos à soja - Atualmente, os prejuízos causados à soja por essa praga são bastante significativos, especialmente na Região Centro-Oeste, onde as perdas de produção, nas reboleiras de plantas atacadas, variam de 15% a 70%, dependendo da época do ataque.

Controle - O manejo dessa praga é difícil e ainda não há nenhum método eficiente para o seu controle. O controle químico, até o momento, tem se mostrado pouco viável, em função do hábito subterrâneo do inseto, não havendo, ainda, nenhum produto registrado para essa finalidade, para a cultura da soja.

**“Mosca branca”** - os adultos têm o dorso amarelo-pálido e asas brancas, medem aproximadamente 1,0 mm, sendo a fêmea maior que o macho. A longevidade é variável e depende da alimentação e da temperatura. Os machos e as fêmeas vivem em média 13 e 62 dias, respectivamente. De ovo a adulto o inseto pode levar cerca de 18 dias, em temperaturas médias alta (32°C), podendo, contudo, se estender até 73 dias (15° C). Em condições de alta temperatura, é possível ocorrer de 11 a 15 gerações por ano. O acasalamento inicia-se de 12 horas a dois dias após a emergência, e cada fêmea coloca, em média, 100 a 300 ovos durante a sua vida.

A mosca branca apresenta metamorfose incompleta, passando pelas fases de ovo, ninfa (quatro estádios, sendo o último denominado de pré-pupa ou pupa) e adulto. O ovo, de coloração amarela, tem formato de pêra e mede cerca de 0,2 a 0,3 mm. As ninfas são translúcidas e apresentam coloração amarela a amarelo-pálida e locomovem-se apenas no primeiro estágio ninfal. Nos demais estádios, o inseto permanece imóvel até a emergência dos adultos.

Danos: na cultura da soja, a mosca branca causa danos diretos pela sucção da seiva provocando alterações no desenvolvimento vegetativo e

reprodutivo. Durante a alimentação, a mosca branca excreta substâncias açucaradas que cobrem as folhas, resultando na formação da fumagina. O escurecimento da superfície foliar reduz o processo de fotossíntese, causa a murcha e queda das folhas, antecipando o ciclo da cultura. Todo este processo tem resultado em perdas de rendimento. Os danos indiretos são observados pela transmissão de um vírus, cujo sintoma é a necrose da haste. Dependendo do nível populacional da mosca branca, as perdas de produção podem atingir 100%. Em avaliações realizadas em diversas lavouras de soja, foi possível detectar 45% de perdas de rendimento.

Controle: diversas práticas podem ser usadas para auxiliar no controle da mosca branca. As medidas de maior efetividade são a limitação das datas de plantio e a eliminação de plantas voluntárias ou daninhas, visando impedir a manutenção da população da praga.

Com a irrigação por pivô central, houve uma ampliação nas épocas de plantio da cultura. Recentemente, além de outubro/novembro (época normal), têm sido constatados plantios de soja em abril/maio, para a produção de sementes, e em setembro, sob irrigação. Quando a soja entra na fase de maturação, a população da mosca branca desenvolvida em diferentes épocas de plantio começa o processo de migração, buscando novas plantas hospedeiras, colonizando, assim, as culturas em desenvolvimento. A limitação das datas de plantio reduz a possibilidade de migração do inseto em áreas de final de ciclo para áreas de início de desenvolvimento da cultura.

Recomenda-se a eliminação de plantas voluntárias de soja, provenientes de grãos perdidos durante a colheita, reduzindo a oferta de alimentos e a multiplicação e manutenção da praga. A eliminação de plantas voluntárias de soja pode ser realizada por processo químico (dessecação) ou através da incorporação com a grade.

No sistema de plantio direto da soja, em áreas com plantas daninhas, altamente infestadas por mosca branca, recomenda-se realizar a dessecação e o pousio por duas semanas antes da semeadura. Em outras culturas, o controle químico é realizado preventivamente, via tratamento de sementes. A cultura fica protegida durante o período residual

de cada produto, controlando a população de adultos migrantes. Com o controle efetivo de adultos, o crescimento populacional da praga é menor, em função de redução na postura de ovos e, conseqüentemente, na eclosão de ninfas.

“**Lagarta falsa-medideira**” (*Pseudoplusia includens*) - nos últimos anos, esta lagarta tem aumentado sua freqüência nas lavouras de soja de todo o País, causando danos significativos às plantas e exigindo ações de controle, por parte dos agricultores atingidos. Os adultos são mariposas, de hábito noturno, que possuem a coloração geral acinzentada com duas manchas prateadas no primeiro par de asas. A lagarta possui cor verde-clara, com listras longitudinais brancas no dorso, podendo ter pontuações escuras espalhadas por todo o corpo, e movimenta-se arqueando o corpo como se estivesse “medindo palmos”. O ciclo da falsa-medideira dura em média 15 dias e, completamente desenvolvida, a lagarta pode atingir cerca de 4 cm de comprimento. Alimenta-se dos folíolos, não consumindo as nervuras, dando um aspecto rendilhado característico à folhagem danificada.

O seu controle é mais difícil do que o da lagarta-da-soja porque ela é menos suscetível aos produtos químicos em geral, demandando doses maiores para intoxicá-la. Além disso, ela ocorre em soja mais desenvolvida, geralmente durante e após a época de floração, quando a soja já está fechada. Esta praga tem o hábito de permanecer mais concentrada nos terço inferior e médio das plantas, fazendo com que haja menor probabilidade de ser atingida pelas gotas das pulverizações, as quais ficam retidas nas folhas do terço superior. Por isso, é necessário que o agricultor aplique adequadamente os inseticidas para efetivar o seu controle, adotando tecnologia de aplicação, com volume de calda e bicos (pontas) adequados.

## 10.5 Manuseio de inseticidas e descarte de embalagens

- ♦ Utilizar inseticidas devidamente registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), para uso na cultura da soja e para a praga-alvo que deseja controlar. O número do registro consta no rótulo do produto.

- ♦ Usar equipamento de proteção individual (EPI) apropriado, em todas as etapas de manuseio de agrotóxicos (abastecimento do pulverizador, aplicação e lavagem de equipamentos e embalagens), a fim de evitar possíveis intoxicações.
- ♦ Não fazer mistura em tanque, de dois inseticidas, ou de inseticida (s) com outro (s) agrotóxico (s), procedimento proibido por lei (Instrução Normativa do MAPA nº 46, de julho de 2002).
- ♦ Evitar aplicações em dias ou em horários com ventos fortes, visando reduzir a deriva dos jatos, tornando mais eficiente a aplicação e reduzindo possíveis contaminações de áreas vizinhas.
- ♦ Observar o período de carência do produto (período compreendido entre a data da aplicação e a colheita da soja), principalmente no controle de pragas de final de ciclo da cultura (percevejos, por exemplo).
- ♦ Ler com atenção o rótulo e a bula do produto e seguir todas as orientações e os cuidados com o descarte das embalagens.
- ♦ Devolver as embalagens vazias (após a tríplice lavagem das embalagens de produtos líquidos), no prazo de um ano após a compra do produto, ao posto de recebimento indicado na nota fiscal de compra, conforme legislação do MAPA (Lei 9.974, de 06/06/2000 e Decreto 4.074, de 04/01/2002).



# 11

## Doenças e Medidas de Controle

---

### 11.1 Considerações gerais

Entre os principais fatores que limitam a obtenção de altos rendimentos em soja estão as doenças. Aproximadamente 40 doenças causadas por fungos, bactérias, nematóides e vírus já foram identificadas no Brasil. Esse número continua aumentando com a expansão da soja para novas áreas e como conseqüência da monocultura. A importância econômica de cada doença varia de ano para ano e de região para região, dependendo das condições climáticas de cada safra. As perdas anuais de produção por doenças são estimadas em cerca de 15% a 20%, entretanto, algumas doenças podem ocasionar perdas de quase 100%.

Na safra 2001/2002 uma nova doença, a ferrugem asiática da soja causada pelo fungo *Phakopsora pachyrhizi*, foi detectada desde o Rio Grande do sul até o Mato Grosso e na safra seguinte espalhou-se em praticamente todas regiões produtoras representando uma ameaça para a cultura em função dos prejuízos causados e do aumento de custo de produção para seu controle.

A expansão de áreas irrigadas nos Cerrados tem possibilitado o cultivo da soja no outono/inverno para a produção de sementes. Esse cultivo favorece a sobrevivência dos fungos causadores da antracnose, da ferrugem, do cancro da haste, da podridão branca da haste, da podridão vermelha da raiz e dos nematóides de galhas e do de cisto. Os cultivos do feijão, da ervilha, da melancia e do tomate, que são também realizados sob irrigação na mesma época, são afetados pela podridão branca da haste, pela podridão radicular e mela de rizoctonia (*R. solani*) e pelos nematóides de galhas e nematóide de cisto (feijão e ervilha), aumentando o potencial de inóculo desses patógenos para a safra seguinte de soja.

A maioria dos patógenos é transmitida através das sementes e, portanto, o uso de sementes sadias ou o tratamento das sementes é essencial para a prevenção ou a redução das perdas. Os exemplos mais evidentes de doenças que são disseminadas através das sementes são a antracnose (*Colletotrichum truncatum*), a seca da haste e vagem (*Phomopsis* spp.), a mancha púrpura da semente e o crestamento foliar de cercóspora (*Cercospora kikuchii*); a mancha "olho-de-rã" (*Cercospora sojina*), a mancha parda (*Septoria glycines*) e o cancro da haste (*Diaporthe phaseolorum* f.sp. *meridionalis*).

O nematóide de cisto da soja (*Heterodera glycines*), identificado pela primeira vez na Região dos Cerrados em 1991/92, na safra 1996/97 já havia sido constatado em mais de 60 municípios brasileiros nos estados do Rio Grande do Sul, do Paraná, de São Paulo, de Goiás, de Minas Gerais, do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. A cada safra, diversos municípios são acrescentados à lista de municípios atingidos, representando um grande desafio para a pesquisa, a assistência técnica e o produtor.

## 11.2 Doenças identificadas no Brasil

As seguintes doenças da soja foram identificadas no Brasil. Suas ocorrências podem variar de esporádicas ou restritas a incidência generalizada nacionalmente. São relacionados os nomes comuns e seus respectivos agentes para as doenças causadas por fungos, bactérias, vírus e nematóides. A identificação das doenças e a avaliação das perdas geralmente exigem treinamentos especializados.

### 11.2.1 Doenças fúngicas

#### 11.2.1.1 Doenças foliares

Crestamento foliar de cercóspora .....	<i>Cercospora kikuchii</i>
Ferrugem americana .....	<i>Phakopsora meibomiaae</i>
Ferrugem asiática .....	<i>Phakopsora pachyrhizi</i>

Mancha foliar de altenária .....	<i>Alternaria</i> sp.
Mancha foliar de ascoquita .....	<i>Ascochyta sojae</i>
Mancha foliar de mirotécio .....	<i>Myrothecium roridum</i>
Mancha parda .....	<i>Septoria glycines</i>
Mancha "olho-de-rã" .....	<i>Cercospora sojina</i>
Mildio .....	<i>Peronospora manshurica</i>
Mancha foliar de filosticta .....	<i>Phyllosticta sojicola</i>
Mancha alvo .....	<i>Corynespora cassiicola</i>
Mela ou requeima da soja .....	<i>Rhizoctonia solani</i> (anamórfica); <i>Thanatephorus cucumeris</i> (teleomórfica)
Oídio .....	<i>Erysiphe diffusa</i>

### 11.2.1.2 Doenças da haste, vagem e semente

Antracnose .....	<i>Colletotrichum truncatum</i>
Cancro da haste .....	<i>Diaporthe phaseolorum</i> f.sp. <i>meridionalis</i> (teleomórfica); <i>Phomopsis phaseoli</i> f.sp. <i>meridionalis</i> (anamórfica)
Mancha púrpura da semente .....	<i>Cercospora kikuchii</i>
Seca da haste e da vagem .....	<i>Phomopsis</i> spp.
Seca da vagem .....	<i>Fusarium</i> spp.
Mancha de levedura .....	<i>Nematospora corily</i>
Podridão branca da haste .....	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>

### 11.2.1.3 Doenças radiculares

Podridão de carvão .....	<i>Macrophomina phaseolina</i>
Podridão parda da haste .....	<i>Phialophora gregata</i>
Podridão de fitóftora .....	<i>Phytophthora sojae</i>
Podridão radicular de cilindrocládio ....	<i>Cylindrocladium clavatum</i>
Tombamento de esclerócio .....	<i>Sclerotium rolfsii</i>
Murcha de esclerócio .....	<i>Sclerotium rolfsii</i>
Tombamento de rizoctonia .....	<i>Rhizoctonia solani</i>
Morte em reboleira .....	<i>Rhizoctonia solani</i>
Podridão da raiz e da base da haste ..	<i>Rhizoctonia solani</i>

Podridão vermelha da raiz (síndrome da morte súbita - PVR/SDS) .....	<i>Fusarium tucumaniae</i>
Podridão radicular de rosélinia .....	<i>Rosellinia</i> sp.
Podridão radicular de corinéspora .....	<i>Corynespora cassiicola</i>

### 11.2.2 Doenças bacterianas

Crestamento bacteriano .....	<i>Pseudomonas savastanoi</i> pv. <i>glycinea</i>
Pústula bacteriana .....	<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>glycines</i>
Fogo selvagem .....	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tabaci</i>

### 11.2.3 Doenças causadas por vírus

Mosaico comum da soja .....	VMCS (vírus do mosaico comum da soja)
Queima do broto .....	VNBF (vírus da necrose branca do fumo)
Mosaico amarelo do feijoeiro .....	VMAF (vírus do mosaico amarelo do feijoeiro)
Mosaico cálico .....	MVA (vírus do mosaico da alfafa)
Necrose da haste .....	Vírus da necrose da haste da soja (carlavírus)

### 11.2.4 Doenças causadas por nematóides

Nematóides de galhas .....	<i>Meloidogyne incognita</i>
Nematóide de galha .....	<i>Meloidogyne javanica</i>
Nematóide de galha .....	<i>Meloidogyne arenaria</i>
Nematóide de cisto da soja .....	<i>Heterodera glycines</i>
Nematóide reniforme .....	<i>Rotylenchulus reniformis</i>

### 11.2.5 Doenças de causa não definida

Necrose da base do pecíolo (pulvino) .....	etiologia não definida
--	------------------------

### 11.3 Principais doenças e medidas de controle

O controle das doenças através de resistência genética é a forma mais eficaz e econômica. Entretanto, para um grande número delas não existem cultivares resistentes (ex. podridão branca da haste, tombamento e podridão radicular de rizoctonia) ou o número de cultivares resistentes é limitado (ex. nematóides de galhas e nematóide de cisto). Portanto, a convivência econômica com as doenças depende da ação de vários fatores de um sistema integrado de manejo da cultura.

#### Ferrugem (*Phakopsora pachyrhizi* e *P. meibomiae*)

A ferrugem da soja é causada por duas espécies de fungo do gênero *Phakopsora*: *P. meibomiae*, causadora da ferrugem “americana”, que ocorre naturalmente em diversas leguminosas desde Porto Rico, no Caribe, ao sul do Estado do Paraná (Ponta Grossa) e *P. pachyrhizi*, causadora da ferrugem “asiática”, presente na maioria dos países que cultivam a soja e, a partir da safra 2000/01, também no Brasil e no Paraguai. A distinção das duas espécies é feita através da morfologia de teliósporos e da análise do DNA.

Ferrugem “americana” - Identificada no Brasil, em Lavras (MG), em 1979. Sua ocorrência é mais comum no final da safra, em soja “safrinha” (outono/inverno) e em soja guaxa, estando restrita às áreas de clima mais ameno. O fungo *P. meibomiae* raramente causa danos econômicos. Além da soja, o fungo infecta diversas leguminosas, sendo mais frequentemente observado em soja perene (*Neonotonia wightii*).

Ferrugem “asiática” - Constatada pela primeira vez, no Continente Americano, no Paraguai, em 5 de março e no Estado do Paraná, em 26 de maio de 2001. Atualmente, foi identificada em praticamente todas as regiões produtoras de soja, exceto no Estado de Roraima. A doença é favorecida por chuvas bem distribuídas e longos períodos de molhamento. A temperatura ótima para o seu desenvolvimento varia entre 18° e 26,5°C. Em condições ótimas, as perdas na produtividade podem variar de 10% a 80%.

**Sintomas** - Podem aparecer em qualquer estágio de desenvolvimento da planta. Os primeiros sintomas são caracterizados por minúsculos pontos (no máximo 1 mm de diâmetro) mais escuros do que o tecido sadio da folha, com coloração esverdeada a cinza-esverdeada, com correspondente protuberância (urédia), na página inferior da folha. As urédias adquirem cor castanho-clara a castanho-escura, abrem-se em um minúsculo poro, expelindo os esporos hialinos que se acumulam ao redor dos poros e são carregados pelo vento. O tecido da folha ao redor das urédias adquire coloração castanho-clara a castanho-avermelhada.

A ferrugem pode também ser facilmente confundida com as lesões iniciais de mancha parda (*Septoria glycines*) que forma um halo amarelo ao redor da lesão necrótica, que é angular e castanho-avermelhada. Em ambos os casos, as folhas infectadas amarelam, secam e caem prematuramente. Outras doenças com que a ferrugem pode ser confundida são o crestamento bacteriano (*Pseudomonas savastanoi* pv. *glycinea*) e a pústula bacteriana (*Xanthomonas axonopodis* pv. *glycines*). A diferenciação das doenças é feita através da observação das estruturas de reprodução do fungo (urédias), no verso da folha. No caso da pústula bacteriana, há presença de saliência, porém a mesma não apresenta abertura.

Para melhor visualização das lesões, deve-se tomar uma folha suspeita e olhá-la através do limbo foliar pela face superior (adaxial), contra um fundo claro (o céu, por exemplo). Uma vez localizado o ponto suspeito (1-2 mm de diâmetro), observar o ponto escuro pela face inferior (abaxial) da folha verificando, com uma lupa de 10x a 30x de aumento, ou sob microscópio estereoscópico, a presença de urédias.

Uma forma de facilitar a visualização da presença do fungo nas lesões, vistas pela face inferior da folha (abaxial), consiste em coletar folhas suspeitas de terem a ferrugem, colocá-las em saco plástico antes que murchem e mantê-las em incubação por um período de 12 a 24 horas sobre a mesa de trabalho. Caso a umidade do ambiente no momento da coleta seja muito baixa, borrifar um pouco de água sobre as folhas ou colocar papel umedecido para mantê-las túrgidas. Não colocar folha com excesso de umidade no saco plástico. Após o período de incubação, observar a presença de urédias com o auxílio de uma lupa.

**Modo de disseminação** - A disseminação da ferrugem é feita principalmente através da dispersão dos uredósporos pelo vento.

**Efeitos da ferrugem** - A infecção por *P. pachyrhizi* causa rápido amarelecimento ou bronzeamento e queda prematura das folhas. Quanto mais cedo ocorrer a desfolha, menor será o tamanho dos grãos e, conseqüentemente, maior a perda do rendimento e da qualidade (grãos verdes). Em casos séveros, quando a doença atinge a soja na fase de formação das vagens ou no início da granação, pode causar o aborto e a queda das vagens, resultando em até perda total do rendimento. Elevadas perdas de rendimento têm sido registradas na Austrália (80%), na Índia (90%) e em Taiwan (70%-80%). No Brasil, reduções de produtividade de até 70% têm sido observadas, quando se comparam áreas tratadas e não tratadas com fungicidas. As regiões onde a doença tem sido mais agressiva têm variado de safra para safra, em função das condições climáticas.

**Manejo** - A doença foi constatada em praticamente todas regiões produtoras, com exceção do Estado de Roraima e sua agressividade depende das condições climáticas. Para reduzir o risco de danos, sugere-se o uso de cultivares de ciclo precoce e semeaduras no início da época recomendada, para evitar a maior carga de esporos do fungo que irá iniciar a multiplicação nas primeiras semeaduras. Fungos causadores de ferrugens são classificadas como biotróficos, ou seja, necessitam do hospedeiro vivo para sobreviver e se multiplicar. Portanto a sobrevivência de *P. pachyrhizi*, na entre-safra, tem ocorrido em cultivos de soja sob irrigação no inverno, na região dos Cerrados (Mato Grosso e Tocantins) e na Região Nordeste (Maranhão), mas pode também ocorrer em hospedeiros alternativos, pois *P. pachyrhizi* infecta 95 espécies de plantas, em mais de 42 gêneros. O monitoramento da doença e sua identificação nos estádios iniciais são essenciais para a utilização eficiente do controle químico, devendo ser realizada a vistoria freqüente da lavoura. A Tabela 11.3 apresenta os fungicidas registrados para controle, aprovados na Reunião de Pesquisa de Soja da Região Central do Brasil realizada em Cornélio Procópio, PR, 2005. A coluna de agrupamento acrescentada na tabela foi realizada com base nos ensaios em rede durante as safras 2003/04 e

2004/05 por instituições de pesquisa públicas e privadas, universidades, fundações e cooperativas.

Embora os produtos tenham sido agrupados por eficiência, através da análise conjunta dos resultados em diferentes locais, é importante salientar que os mesmos podem ter eficiência semelhante no campo quando houver baixa pressão da doença. A diferença de eficiência dos produtos é mais fácil de ser observada em situações onde a doença é mais agressiva.

A aplicação deve ser feita após os sintomas iniciais da doença, no terço inferior das plantas (traços da doença) na lavoura ou preventivamente. A decisão sobre o momento de aplicação (sintomas iniciais ou preventiva) deve ser técnica e baseada na presença da ferrugem na região, no estágio fenológico da cultura, nas condições climáticas e na logística de aplicação (disponibilidade de equipamentos e no tamanho da propriedade). Após a constatação do fungo na região, a orientação é que o produtor utilize produtos registrados que apresentaram controle superior a 80%, nos ensaios em rede realizados no Brasil (produtos discriminados como \*\* e \*\*\* no agrupamento). A formação de três grupos, no caso da ferrugem, não implica em flexibilidade na sua aplicação para o controle. O atraso na aplicação, após constatados os sintomas iniciais, pode acarretar em redução de produtividade, caso a condição climática favoreça o progresso da doença.

Para realizar o monitoramento, deve-se considerar que a doença se inicia pelas folhas inferiores da planta, devendo o monitoramento sempre ser realizado a partir do terço inferior das plantas. O número e a necessidade das re-aplicações vão ser determinados pelo estágio inicial em que for identificada a doença na lavoura, pelo residual dos produtos e pelas condições climáticas. O monitoramento das lavouras é recomendado a partir da emissão das primeiras folhas no estágio vegetativo, uma vez que a doença pode ocorrer em qualquer estágio fenológico da cultura, (o monitoramento deve ser intensificado e quase diário, nas semeaduras mais tardias e uma vez detectada a ferrugem na região).

Até o momento, não há cultivares resistentes à esta doença.

## **Doenças de final de ciclo (*Septoria glycines* e *Cercospora kikuchii*)**

Sob condições favoráveis, as doenças foliares de final de ciclo, causadas por *Septoria glycines* (mancha parda) e *Cercospora kikuchii* (crestamento foliar de cercóspora), podem causar reduções de rendimento em mais de 20%. Ambas ocorrem na mesma época e, devido às dificuldades para avaliá-las individualmente, são consideradas como o “complexo de doenças de final de ciclo”. O fungo *C. kikuchii* também causa a mancha púrpura na semente, reduzindo a qualidade e a germinação. As perdas serão maiores se forem associados aos danos causados por outras doenças (ex. cancro da haste, antracnose, nematóides de galhas, nematóide de cisto, podridão branca da haste).

A incidência dessas doenças pode ser reduzida através da integração do tratamento químico das sementes e a rotação da soja com espécies não suscetíveis, como o milho e a sucessão com o milheto. Desequilíbrios nutricionais e baixa fertilidade do solo tornam as plantas mais suscetíveis, podendo ocorrer severa desfolha antes mesmo de a soja atingir a meia grana (estádio de desenvolvimento R5.4) (Tabela 11.2). A Tabela 11.4 apresenta os fungicidas recomendados para controle. A aplicação deve ser feita entre os estádios R5.1 e R5.3 se as condições climáticas estiverem favoráveis à ocorrência das doenças, isto é, chuvas frequentes e temperaturas variando de 22° a 30°C. A ocorrência de veranico durante o ciclo da cultura reduz a incidência, tornando desnecessária a aplicação de fungicidas.

## **Mancha “olho-de-rã” (*Cercospora sojina*)**

Identificada pela primeira vez em 1971, a mancha “olho-de-rã” chegou a causar grandes prejuízos na Região Sul e nos Cerrados. No momento, está sob controle devido ao uso de cultivares resistentes (Tabela 11.1), sendo raramente observada. Devido à capacidade do fungo em desenvolver raças (25 raças já foram identificadas no Brasil), é importante que, além do uso de cultivares resistentes, haja também a diversificação regional de cultivares, com fontes de resistência distintas.

O uso de cultivares resistentes e o tratamento de sementes com fungicidas, de forma sistemática, são fundamentais para o controle da doença e para evitar a introdução do fungo ou de uma nova raça de *C. sojina* em áreas onde ela não esteja presente.

### **Oídio (*Erysiphe diffusa*)**

O oídio é uma doença que, a partir da safra 1996/97, tem apresentado severa incidência em diversas cultivares em todas as regiões produtoras, desde os Cerrados ao Rio Grande do Sul. As lavouras mais atingidas podem ter perdas de rendimento de até 40%.

Esse fungo infecta diversas espécies de leguminosas. É um parasita obrigatório que se desenvolve em toda a parte aérea da soja, como folhas, hastes, pecíolos e vagens (raramente observada). O sintoma é expresso pela presença do fungo nas partes atacadas e por uma cobertura representada por uma fina camada de micélio e esporos (conídios) pulverulentos que podem ser pequenos pontos brancos ou cobrir toda a parte aérea da planta, com menor severidade nas vagens. Nas folhas, com o passar dos dias, a coloração branca do fungo muda para castanho-acinzentada, dando a aparência de sujeira em ambas as faces. Sob condição de infecção severa, a cobertura de micélio e a frutificação do fungo, além do dano direto ao tecido das plantas, diminui a fotossíntese. As folhas secam e caem prematuramente, dando à lavoura aparência de soja dessecada por herbicida, ficando com uma coloração castanho-acinzentada a bronzeada. Na haste e nos pecíolos, as estruturas do fungo adquirem coloração que varia de branca a bege, contrastando com a epiderme da planta, que adquire coloração arroxeada a negra. Em situação severa e em cultivares altamente suscetíveis, a colonização das células da epiderme das hastes impede a expansão do tecido cortical e, simultaneamente, causa o engrossamento do lenho, rachadura das hastes e cicatrizes superficiais.

A infecção pode ocorrer em qualquer estágio de desenvolvimento da planta, porém, é mais visível por ocasião do início da floração, sendo comum em região com temperaturas amenas. Em condições controladas, temperaturas entre 18° e 24°C favorecem a doença.

As reações das cultivares indicadas no Brasil estão apresentadas na Tabela 11.1. Houve grande variação na reação de algumas cultivares entre as localidades onde foram feitas as avaliações. Essas variações podem indicar a existência de variabilidade (raças fisiológicas) entre as populações do fungo de diferentes localidades.

O método mais eficiente de controle do oídio é através do uso de cultivares resistentes. Devem ser utilizadas as cultivares que sejam resistentes (R) a moderadamente resistentes (MR) ao fungo. Outra forma de evitar perdas por oídio é não semear cultivares suscetíveis nas épocas mais favoráveis à ocorrência da doença, tais como semeaduras tardias ou safrinha e cultivo sob irrigação no inverno. O controle químico, através da aplicação de fungicidas foliares (Tabela 11.5) poderá ser utilizado. Na tabela de fungicidas para controle do oídio foi acrescentada a coluna de agrupamento, baseada em ensaios realizados durante as safras 2003/04 e 2004/05, por instituições de pesquisa públicas e privadas, universidades, fundações e cooperativas. Para o controle de oídio nos estádios iniciais indica-se usar preferencialmente o enxofre (2 kg i.a./ha). O momento da aplicação depende do nível de infecção e do estágio de desenvolvimento da soja. A aplicação deve ser feita quando o nível de infecção atingir de 40% a 50% da área foliar da planta como um todo.

### **Mela da soja (*Rhizoctonia solani* AG1)**

A "mela da soja" ocorre principalmente nos estados do Mato Grosso, do Maranhão, de Tocantins e de Roraima, causando reduções médias de produtividade de 30%, podendo chegar a 60%, em situações de extrema favorabilidade climática.

A doença se desenvolve bem em condições de temperatura entre 25°C e 30°C e umidade relativa do ar acima de 80%. Condição de clima chuvoso e a frequência e a distribuição das chuvas durante o ciclo da cultura são fatores determinantes para o desenvolvimento da doença. O fungo sobrevive no solo através de esclerócios, saprofiticamente em restos de cultura, e em hospedeiros alternativos ou eventuais. A disseminação, a partir do inóculo primário, ocorre principalmente através de respingos de chu-

va, carreando fragmentos de micélio ou esclerócios para folhas e pecíolos de plantas jovens, antes do fechamento das entrelinhas na lavoura. Inóculo secundário é formado pelo crescimento micelial e pela formação de microesclerócios, com disseminação por contato de folha com folha e de planta com planta.

Toda a parte aérea da planta é afetada, principalmente as folhas do terço médio, surgindo inicialmente lesões encharcadas, de coloração pardo-avermelhada a roxa, evoluindo rapidamente para marrom-escura a preta. As lesões podem ser pequenas manchas ou tomar todo o limbo foliar, em forma de murcha ou podridão mole. Folhas infectadas normalmente ficam aderidas a outras folhas ou hastes através do micélio do fungo que, rapidamente, se dissemina para tecidos saudáveis. Em condições favoráveis, ocorre desenvolvimento micelial do patógeno sobre a planta. Sob baixa umidade, as lesões ficam restritas a manchas necróticas marrons. Nas hastes, nos pecíolos e nas vagens, normalmente aparecem manchas castanho-avermelhadas. Em vagens novas, flores e ráceros florais pode ocorrer completa podridão e, em condições favoráveis é comum haver abundante produção de microesclerócios nos tecidos infectados. As infecções podem ocorrer em qualquer estágio da cultura.

No Brasil, a doença é causada, predominantemente, pelo subgrupo IA do grupo 1 de anastomose (AG1) de *R. solani* (AG1-IA), podendo ocorrer o AG1-IB, em Roraima.

O controle da "mela da soja" é mais eficiente quando se adotam medidas integradas, envolvendo práticas como semeadura direta, nutrição equilibrada das plantas (principalmente K, S, Zn, Cu e Mn), rotação de culturas não hospedeiras, redução da população de plantas, eliminação de plantas daninhas e restevias de soja e controle químico. Não há fungicidas registrados no MAPA para controle da doença. Experimentalmente, foi observada a eficiência de controle com alguns fungicidas do grupo das estrubilurinas isoladamente ou em mistura com triazóis. A utilização de cobertura morta do solo, através do sistema de semeadura direta, é uma das medidas que tem se mostrado mais eficiente, por evitar os respingos de chuva que levam os propágulos do fungo para as folhas e hastes. Não há cultivares resistentes.

### **Cancro da haste (*Diaporthe phaseolorum* f.sp. *meridionalis*; *Phomopsis phaseoli* f.sp. *meridionalis*)**

Identificado pela primeira vez na safra 1988/89, no sul do Estado do Paraná e em área restrita no Mato Grosso, na safra seguinte foi encontrado em todas as regiões produtoras de soja do País. Uma vez introduzido na lavoura através de sementes e de resíduos contaminados em máquinas e implementos agrícolas, o fungo multiplica-se nas primeiras plantas infectadas e, posteriormente, durante a entressafra, nos restos de cultura. Iniciando com poucas plantas infectadas no primeiro ano, o cancro da haste pode causar perda total, na safra seguinte.

O fungo é altamente dependente de chuvas para disseminar os esporos dos restos de cultura para as plântulas em desenvolvimento. Quanto mais freqüentes forem as chuvas nos primeiros 40 a 50 dias após a semeadura, maior a quantidade de esporos do fungo que serão liberados dos restos de cultura e atingirão as hastes das plantas. Após esse período, a soja estará suficientemente desenvolvida e a folhagem estará protegendo o solo e os restos de cultura do impacto das chuvas, portanto, liberando menos inóculo.

Além das condições climáticas, os níveis de danos causados à soja dependem da suscetibilidade, do ciclo da cultivar e do momento em que ocorrer a infecção. Como o cancro da haste é uma doença de desenvolvimento lento (demora de 50 a 80 dias para matar a planta), quanto mais cedo ocorrer a infecção e quanto mais longo for o ciclo da cultivar, maiores serão os danos. Nas cultivares mais suscetíveis, o desenvolvimento da doença é mais rápido, podendo causar perda total. Nas infecções tardias (após 50 dias da semeadura) e em cultivares mais resistentes, haverá menos plantas mortas, com a maioria afetada parcialmente.

A forma mais econômica e eficiente de controle da doença é pelo uso de cultivares resistentes (Tabela 11.1). As seguintes medidas de controle também podem ser utilizadas: tratamento de semente, rotação/sucessão de culturas, semeadura com maior espaçamento entre as linhas e entre as plantas e adubação equilibrada. Só utilizar guandu ou tremoço como adubo verde antes da cultura da soja na certeza de utilizar cultivar de soja

resistente. Em áreas de semeadura direta, mesmo com histórico de cancro da haste na safra anterior, o uso de cultivares resistentes oferecerá bons rendimentos.

### **Antracnose (*Colletotrichum truncatum*)**

A antracnose é uma das principais doenças da soja nas regiões dos Cerrados. Sob condições de alta umidade, causa apodrecimento e queda das vagens, abertura das vagens imaturas e germinação dos grãos em formação. Pode causar perda total da produção mas, com maior frequência, causa alta redução do número de vagens. Geralmente, está associada com a ocorrência de diferentes espécies de *Phomopsis*, que causam a seca da vagem e da haste. Além das vagens, o *Colletotrichum truncatum* infecta a haste e outras partes da planta, causando manchas castanho escuras. É também possível que seja uma das principais causadoras da necrose da base do pecíolo que, nos últimos anos, tem sido responsável por severas perdas de soja nos Cerrados e cuja etiologia ainda não está esclarecida. Em anos com período prolongado de chuvas, após a semeadura direta da soja, sobre a palha do trigo, em solo compactado, é comum a morte de plântulas nos primeiros trinta dias. Em alguns casos, é necessária a ressemeadura.

A alta intensidade da antracnose nas lavouras dos Cerrados é atribuída à maior precipitação e às altas temperaturas, porém, outros fatores como o excesso de população de plantas, cultivo contínuo da soja, estreitamento nas entrelinhas (35-43 cm), uso de sementes infectadas, infestação e dano por percevejo e deficiências nutricionais, principalmente de potássio, são também responsáveis pela maior incidência da doença.

A redução da incidência de antracnose, nas condições dos Cerrados, só será possível através de rotação de culturas, maior espaçamento entre as linhas (50 a 55 cm), população adequada (250.000 a 300.000 plantas/ha), tratamento químico de semente e manejo adequado do solo, principalmente, com relação à adubação potássica. Observações a campo têm mostrado que, sob semeadura direta e em áreas com cobertura morta, a incidência de antracnose é menos severa. O manejo da popu-

lação de percevejo é também importante na redução de danos por antracnose. Não há fungicidas registrados no MAPA para controle da doença. Experimentalmente, foi observada a eficiência de controle com alguns fungicidas do grupo dos benzimidazóis isoladamente ou em mistura com triazóis.

### **Seca da haste e da vagem (*Phomopsis* spp.)**

É uma das doenças mais tradicionais da soja e, anualmente, junto com a antracnose, é responsável pelo descarte de grande número de lotes de sementes. Seu maior dano é observado em anos quentes e chuvosos, nos estádios iniciais de formação das vagens e na maturação, quando ocorre o retardamento de colheita por excesso de umidade. Em solos com deficiência de potássio, o fungo causa sério abortamento de vagens, geralmente associado com a antracnose, resultando em haste verde e retenção foliar. Cultivares precoces com maturação no período chuvoso são severamente danificadas.

Sementes armazenadas sob condições de temperaturas amenas, durante a entressafra, mantêm por mais tempo a viabilidade de *Phomopsis sojae* e de *Phomopsis* spp. Sementes superficialmente infectadas por *Phomopsis* spp., quando semeadas em solo úmido, geralmente emergem, porém, o fungo desenvolvido no tegumento impede que os cotilédones se abram e não permite que as folhas primárias se desenvolvam. O tratamento da semente com fungicida resolve o problema.

Para o controle da seca da haste e da vagem, devem ser seguidas as mesmas indicações para a antracnose.

### **Mancha alvo e podridão da raiz (*Corynespora cassiicola*)**

Surtos severos têm sido observados, desde as zonas mais frias do Sul às chapadas dos Cerrados. Cultivares suscetíveis podem sofrer completa desfolha prematura, apodrecimento das vagens e intensas manchas nas hastes. Através da infecção na vagem, o fungo atinge a semente e, desse modo, pode ser disseminado para outras áreas. A infec-

ção, na região da sutura das vagens em desenvolvimento, pode resultar em necrose, abertura das vagens e germinação ou apodrecimento dos grãos ainda verdes. A podridão de raiz causada pelo fungo *C. cassiicola* é também comum, principalmente em áreas de semeadura direta. Todavia, severas infecções em folhas, vagens e hastes, geralmente não estão associadas com a correspondente podridão de raiz. A podridão de raiz é mais freqüente e está aumentando com a expansão das áreas em semeadura direta.

Na Tabela 11.1, são apresentadas as reações das cultivares à mancha alvo baseadas em avaliações a campo e em casa-de-vegetação, com inoculações artificiais.

### **Podridão parda da haste (*Phialophora gregata*)**

Na safra 1988/89, a doença foi constatada pela primeira vez em Passo Fundo (RS) e municípios vizinhos com morte de até 100% das plantas em algumas lavouras. Na safra 1991/92, além da reincidência severa no Rio Grande do Sul, a doença foi constatada também na região de Chapecó, em Santa Catarina.

A doença é de desenvolvimento lento, matando as plantas na fase de enchimento de grãos. O sintoma característico é o escurecimento castanho escuro a arroxeado da medula, em toda a extensão da haste e seguida de murcha, amarelecimento das folhas e freqüente necrose entre as nervuras das folhas, caracterizando a folha "carijó". Essa doença não produz sintoma externo na haste.

Observações preliminares têm indicado a existência de cultivares comerciais com alto grau de resistência na Região Sul. A doença ainda não foi constatada na Região Central do Brasil, estando restrita aos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná; os planaltos dos Cerrados, acima de 800 metros de altitude, podem oferecer condições para o desenvolvimento da podridão parda. Para evitar a introdução da doença nos Cerrados será necessária a adoção de medidas preventivas, como o tratamento com fungicidas das sementes introduzidas daqueles três estados e a limpeza completa dos caminhões, máquinas e implementos agrí-

colas que se movimentam daquela região para a Região dos Cerrados, nas épocas de semeadura e colheita.

Em áreas afetadas indica-se a rotação com milho ou a semeadura de cultivares de soja que não tenham sido afetadas na região.

### **Podridão vermelha da raiz (PVR) (*Fusarium tucumaniae*)**

Essa doença foi observada pela primeira vez na safra 1981/82, em São Gotardo (MG), e encontra-se disseminado em praticamente todas as regiões produtoras. A podridão vermelha da raiz (PVR) ocorre em reboleiras ou de forma generalizada na lavoura.

O sintoma de infecção na raiz inicia com uma mancha avermelhada, mais visível na raiz principal, geralmente localizada um a dois centímetros abaixo do nível do solo. Essa mancha se expande, circunda a raiz e passa da coloração vermelho arroxeada para castanho-avermelhada a quase negra. Essa necrose acentuada localiza-se mais no tecido cortical, enquanto que o lenho da raiz adquire coloração, no máximo, castanho-clara, estendendo-se pelo tecido lenhoso da haste a vários centímetros acima do nível do solo. Nessa fase, observa-se, na parte aérea, o amarelecimento prematuro das folhas e, com maior frequência, uma acentuada necrose entre as nervuras das folhas, resultando no sintoma conhecido como folha "carijó".

Como medida de manejo da doença recomenda-se evitar semeadura em solos compactados e mal drenados. No Brasil não há cultivares resistentes. Safras chuvosas e semeadura direta favorecem a incidência da doença.

### **Podridão de carvão (*Macrophomina phaseolina*)**

*Macrophomina phaseolina* é uma espécie polífaga, capaz de infectar inúmeras espécies botânicas. Os danos são variáveis com o ano, sendo mais severos em anos secos. Nas lavouras onde o preparo do solo não é adequado, permitindo a formação do pé-de-grade, as plantas desenvolvem sistema radicular mais superficial, não suportando veranicos. A infecção

das raízes pode ocorrer desde o início da germinação visto que o patógeno pode ser transmitido por sementes e é um habitante natural dos solos. Lesões no colo da planta são de coloração marrom-avermelhada e superficiais, diferindo daquelas causadas por *Rhizoctonia solani* que são profundas. Radículas infectadas apresentam escurecimento. A evolução da infecção é facilitada por condições de *deficit* hídrico do solo, quando as plantas apresentam fraco desenvolvimento e as folhas ficam cloróticas. Após o florescimento e ocorrendo *deficit* hídrico, as folhas tornam-se inicialmente cloróticas, secam e adquirem coloração marrom, permanecendo aderidas aos pecíolos. Nessa fase, as plantas apresentam raízes de cor cinza, cuja epiderme é facilmente destacada, mostrando massa de microesclerócios negros, nos tecidos imediatamente abaixo.

A formação de picnídios não ocorre em todos os hospedeiros, mas foi descrita em soja, feijão e juta. Os picnídios são globosos e negros.

Em tecidos infectados, o fungo produz microesclerócios, os quais são a principal fonte de inóculo. Os microesclerócios são estruturas multicelulares, duras e resistentes às condições adversas. A longevidade tende a diminuir com o tempo no solo. Em solos úmidos a sobrevivência é reduzida, devido à baixa oxigenação do solo. Baixo potencial hídrico aumenta a suscetibilidade das plantas e reduz a atividade de microrganismos antagônicos.

Devido à ação polífaga do fungo a rotação de culturas é uma medida de controle duvidoso. Níveis adequados de P e K auxiliam o desenvolvimento e a resistência das plantas. Adequada cobertura do solo com restos de cultura, acompanhada de bons manejos físico e químico do solo, mostrou-se eficaz, por reduzir o estresse hídrico, diminuindo a predisposição das plantas ao ataque de *M. phaseolina*.

### **Podridão da raiz e da base da haste (*Rhizoctonia solani*)**

Essa doença foi constatada pela primeira vez na safra 1987/88, em Ponta Porã (MS), em Rondonópolis (MT) e em São Gotardo (MG). Na safra 1989/90, foi constatada em Campo Novo dos Parecis, Mato Grosso, em ocorrência esporádica. Na safra 1990/91, foi constatada em Lucas do Rio Verde,

Campo Verde e em Alto Garça, Mato Grosso e em Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul.

A doença ocorre em reboleiras. A morte das plantas começa a ocorrer a partir da fase inicial de desenvolvimento das vagens.

O sintoma inicia-se por podridão castanha e aquosa da haste, próximo ao nível do solo e estende-se para baixo e para cima. Em fase posterior, o sistema radicular adquire coloração castanho escura, o tecido cortical fica mole e solta-se com facilidade, expondo um lenho firme e de coloração branca a castanho-clara. Na parte superior, as plantas infectadas apresentam clorose, as folhas murcham e ficam pendentes ao longo da haste. Na parte inferior da haste principal, a podridão evolui, atingindo vários centímetros acima do nível do solo. Inicialmente, de coloração castanho clara e de aspecto aquoso, a lesão torna-se, posteriormente, negra. A área necrosada, geralmente, apresenta ligeiro afinamento em relação à parte superior. O tecido cortical necrosado destaca-se com facilidade, dando a impressão de podridão superficial. Outro sintoma observado é a formação de uma espécie de cancro, em um dos lados da base da haste, com a parte afetada deprimida, estendendo-se a vários centímetros acima do nível do solo.

### **Crestamento bacteriano da soja (*Pseudomonas savastanoi* pv. *glycinea*)**

A doença é comum em folhas, mas pode ser encontrada em outros órgãos da planta, como hastes, pecíolos e vagens. Os sintomas nas folhas surgem como pequenas manchas, de aparência translúcida circundadas por um halo de coloração verde-amarelada. Essas manchas, mais tarde, necrosam, com contornos aproximadamente angulares, e coalescem, formando extensas áreas de tecido morto, entre as nervuras secundárias. A maior ou menor largura do halo está diretamente ligada à temperatura ambiente (largo sob temperaturas amenas ou estreito ou quase inexistente sob temperaturas mais altas).

Na face inferior da folha, as manchas são de coloração quase negra apresentando uma película brilhante nas horas úmidas da manhã, formada

pelo exudato da bactéria. Infecções severas, nos estádios jovens da planta, conferem aparência enrugada às folhas, como se houvessem sido infectadas por vírus.

A bactéria está presente em todas as áreas cultivadas com soja no País. A infecção primária pode ter origem em duas fontes: sementes infectadas e restos infectados de cultura anterior. Transmissões secundárias, das plantas doentes para as sadias, são favorecidas por períodos úmidos e temperaturas médias amenas (20°C a 26°C). Dias secos permitem que finas escamas do exudato da bactéria se disseminem dentro da lavoura, mas, para haver infecção o patógeno necessita de um filme de água na superfície da folha. Já foram descritas oito raças fisiológicas deste patógeno no Brasil: R2, R3, R4, R6, R7 (também descritas, anteriormente, nos Estados Unidos) e R10, R11 e R12 (raças novas); a mais comum é a raça R3. Não há medidas de controle recomendadas para essa doença.

### **Mosaico comum da soja (vírus do mosaico comum da soja - VMCS)**

O VMCS causa redução do porte das plantas de soja, afetando o tamanho e o formato dos folíolos, com escurecimento da coloração e enrugamentos. Em alguns casos, há formação de bolhas no limbo foliar. O VMCS causa também redução do tamanho das vagens e sementes e prolongamento do ciclo vegetativo, com sintoma característico de haste verde.

Pode causar o sintoma “mancha café” nas sementes, um derramamento do pigmento do hilo. O vírus se transmite pela semente, no entanto, a porcentagem de transmissão depende da estirpe do vírus e da cultivar de soja. As taxas de transmissão das estirpes comuns, na maioria das cultivares de soja suscetíveis, têm sido menores do que 5%. O VMCS dissemina-se no campo através dos pulgões. Embora nenhuma espécie de pulgão seja parasita da soja no Brasil, as picadas de prova permitem que o vírus seja disseminado a partir das sementes de plantas infectadas.

O controle desta virose tem sido obtido pelo uso de cultivares resistentes (Tabela 11.1).

### **Necrose da haste da soja (vírus da necrose da haste = *Cowpea mild mottle virus*)**

O vírus da necrose da haste da soja (VNHS) foi inicialmente identificado no sudoeste de Goiás, na safra 2000/01. Atualmente, já foi diagnosticado em lavouras do MT, da BA, do MA e recentemente, do PR. As plantas de soja atacadas pelo vírus, na fase inicial da lavoura, apresentam curvatura e queima do broto, podendo morrer ou originar plantas anãs, com folhas deformadas. Quando a infecção é mais tardia, nem todas as plantas morrem, mas há redução do número de vagens formadas, as quais podem apresentar pequenas lesões superficiais circulares e escuras ou lesões que cobrem toda a vagem. Corte longitudinal da haste mostra escurecimento da medula. Esse escurecimento pode ser leve ou severo. As sementes podem ter seu tamanho reduzido. As plantas desenvolvem a necrose da haste, principalmente, após a floração. As folhas localizadas nos nós inferiores da planta apresentam aspecto de mosaico, com diferentes tonalidades de verde, variando desde o esmaecido ao verde normal das folhas, e facilitam o diagnóstico no campo. As cultivares suscetíveis podem apresentar perda total da produção. O vírus é transmitido pela mosca branca. No entanto, devido ao grande fluxo dos insetos nas lavouras, o controle químico é insatisfatório. A incidência de plantas mortas depende da população de mosca branca e da presença de plantas hospedeiras. Ainda não são conhecidas as espécies vegetais onde o vírus se mantém, na entre-safra.

O vírus não se transmite pelas sementes, em testes com cultivares suscetíveis. O controle pode ser obtido com o cultivo de cultivares resistentes (Tabela 11.1). Algumas cultivares, denominadas desuniformes, apresentam até 15% de plantas suscetíveis. Mas essa incidência não causou perdas significativas no campo.

### **Nematóides de galhas (*Meloidogyne* spp.)**

O gênero *Meloidogyne* compreende um grande número de espécies. Entretanto, *M. incognita* e *M. javanica* são aquelas que mais limitam a produção de soja no Brasil. *M. javanica* tem ocorrência generalizada, enquanto

*M. incognita* predomina em áreas cultivadas anteriormente com café ou algodão.

Nas áreas onde ocorrem, observam-se manchas em reboleiras nas lavouras, onde as plantas de soja ficam pequenas e amareladas. As folhas das plantas afetadas normalmente apresentam manchas cloróticas ou necroses entre as nervuras, caracterizando a folha "carijó". Às vezes, pode não ocorrer\* redução no tamanho das plantas, mas, por ocasião do florescimento, nota-se intenso abortamento de vagens e amadurecimento prematuro das plantas atacadas. Em anos em que acontecem "veranicos", na fase de enchimento de grãos, os danos tendem a ser maiores. Nas raízes das plantas atacadas observam-se galhas em números e tamanhos variados, dependendo da suscetibilidade da cultivar de soja e da densidade populacional do nematóide.

Para culturas de ciclo curto como a soja, todas as medidas de controle devem ser executadas antes da semeadura. Ao constatar que uma lavoura de soja está atacada, o produtor nada poderá fazer naquela safra. Todas as observações e todos os cuidados deverão estar voltados para os próximos cultivos na área. O primeiro passo é a identificação correta da espécie de *Meloidogyne* predominante na área. Amostras de solo e raízes de soja com galhas devem ser coletadas em pontos diferentes da reboleira, até formar uma amostra composta de cerca de 500 g de solo e pelo menos uns cinco sistemas radiculares de soja. A amostra, acompanhada do histórico da área, deve ser encaminhada, o mais rapidamente possível, a um laboratório de Nematologia. A partir do conhecimento da espécie de *Meloidogyne* é que se poderá montar um programa de manejo.

Para o controle dos nematóides de galhas, podem ser utilizadas, de modo integrado, várias estratégias. Entretanto, as medidas de controle mais eficientes são a rotação/sucessão com culturas não ou más hospedeiras e a utilização de cultivares de soja resistentes.

A rotação de culturas deve ser bem planejada, uma vez que a maioria das espécies cultivadas multiplicam os nematóides de galhas. O cultivo prévio de espécies hospedeiras aumenta os danos na soja semeada na sequência. Da mesma forma, a presença de plantas daninhas na área também possibilita a reprodução e a sobrevivência dos mesmos. A escolha

da rotação deve se basear também na viabilidade técnica e econômica da cultura na região, sendo bastante variável de um local para outro. Para recuperação da matéria orgânica e da atividade microbiana do solo e possibilitar o crescimento da população de inimigos naturais dos nematóides, também é importante incluir, na rotação/sucessão, adubos verdes resistentes à espécie do nematóide presente. A adubação verde com *Crotalaria spectabilis*, *C. grantiana*, *C. mucronata*, *C. paulinea*, mucuna preta, mucuna cinza ou nabo forrageiro contribui para a redução populacional de ambas, *M. javanica* e *M. incognita*. Em áreas infestadas por *M. javanica*, indica-se a rotação da soja com amendoim, algodão, sorgo resistente (AG 2005-E, AG 2501-C, DAS IG 200, etc), mamona ou milho resistente (A 2288, A 2555, AG 3010, AG 5011, AG 6018, AG 9020, AG 9090, DKB 215, DKB 747, DOW 657, DOW 2A120, DOW 2C577, DOW 8460, DOW 8480, Speed, Fort, Pointer, Tork, Master, Exeler, Tractor, Plemium, Avant, Flash, P 30F88, P 3027, P 30F33, P 30F80, P 32R21, P 3081, P 3071, SHS 4070, SHS 4080, SHS 7070, dentre outros). Quando *M. incognita* for a espécie predominante na área, poderão ser semeados o amendoim ou milho resistente (AG 9090, BRS 2114, DOW 657, DOW 2C577, DOW 2A120, P 30F80, P 30F33, P 3027, SHS 4080, SHS 7070, dentre outros).

O método de controle mais eficiente, barato e de mais fácil assimilação pelos agricultores é o uso de cultivares resistentes. Atualmente, várias cultivares de soja resistentes a *M. incognita* e/ou *M. javanica* estão disponíveis no Brasil (Tabela 11.1). Quase todas são descendentes de uma única fonte de resistência, a cultivar norte-americana 'Bragg'. Como os níveis de resistência dessas cultivares não são muito altos, em condições de elevadas populações do nematóide no solo, a utilização da cultivar resistente deverá ser precedida de rotação com uma cultura não hospedeira da espécie de *Meloidogyne* predominante na área.

### **Nematóide de cisto da soja (*Heterodera glycines*)**

O nematóide de cisto da soja (NCS) é uma das principais pragas da cultura pelos prejuízos que pode causar e pela facilidade de disseminação. Ele penetra nas raízes da planta de soja e dificulta a absorção de água e nutrientes condicionando porte e número de vagens reduzidos, clorose e

baixa produtividade. Os sintomas aparecem em reboleiras e, em muitos casos, as plantas acabam morrendo. O sistema radicular fica reduzido e infestado por minúsculas fêmeas do nematóide com formato de limão ligeiramente alongado. Inicialmente de coloração branca, a fêmea, posteriormente, adquire a coloração amarela. Após ser fertilizada pelo macho, cada fêmea produz de 100 a 250 ovos, armazenando a maior parte deles em seu corpo. Quando a fêmea morre, seu corpo se transforma em uma estrutura dura denominada cisto, de coloração marrom escura, cheia de ovos, altamente resistente à deterioração e à dessecação e muito leve, que se desprende da raiz e fica no solo.

O cisto pode sobreviver no solo, na ausência de planta hospedeira, por mais de oito anos. Assim, é praticamente impossível eliminar o nematóide nas áreas onde ele ocorre. Em solo úmido, com temperaturas de 20° a 30°C, as larvas eclodem e, se encontrarem a raiz de uma planta hospedeira, penetram e o ciclo se completa em três a quatro semanas. A gama de espécies hospedeiras do NCS é limitada, destacando-se a soja (*Glycine max*), o feijão (*Phaseolus vulgaris*), a ervilha (*Pisum sativum*) e o tremoço (*Lupinus albus*). A maioria das espécies cultivadas, tais como milho, sorgo, arroz, algodão, girassol, mamona, cana-de-açúcar, trigo, assim como as demais gramíneas, são resistentes. O NCS não se reproduz nas plantas daninhas mais comuns nas lavouras de soja, no Brasil.

As estratégias de controle incluem a rotação de culturas, o manejo do solo e a utilização de cultivares de soja resistentes, sendo ideal a combinação dos três métodos. O uso de cultivares resistentes é o método mais econômico e mais eficiente, porém, seu uso exclusivo pode provocar pressão de seleção de raças, devido à grande variabilidade genética desse parasita.

Detectado no Brasil, pela primeira vez, na safra 1991/92, atualmente, estima-se que a área com o nematóide seja superior a 2,0 milhões de ha. Entretanto, existem muitas propriedades isentas do patógeno, localizadas em municípios considerados infestados. Assim, a prevenção deve ser, ainda, a principal estratégia. A disseminação do NCS se dá, principalmente, pelo transporte de solo infestado. Isso pode ocorrer através dos equipamentos agrícolas, das sementes mal beneficiadas que contenham

partículas de solo, pelo vento, pela água e até por pássaros que, ao coletar alimentos do solo, podem ingerir junto os cistos. É importante a conscientização dos produtores sobre a necessidade de se fazer boa limpeza nos equipamentos agrícolas, após terem sido utilizados em outras áreas, para evitar a contaminação da propriedade. O trânsito de máquinas, equipamentos e veículos tem sido o principal agente de dispersão do NCS no País. O cultivo de gramíneas perenes (pastagens ou outras) numa pequena faixa de cada lado da estrada pode retardar a introdução do NCS nas lavouras próximas à estrada. A aquisição de sementes beneficiadas, isentas de partículas de solo, também é fundamental para evitar a entrada do nematóide. Atualmente, o Ministério da Agricultura, da Pecuária e Abastecimento permite a comercialização de sementes de soja produzidas em áreas infestadas, desde que sejam submetidas a determinada seqüência de beneficiamento e que sejam acompanhadas por laudo atestando a isenção da presença de cistos. A distribuição desuniforme de cistos no lote de sementes e o tamanho do lote dificultam a obtenção de amostras representativas, o que torna o resultado da análise de valor questionável. Dentro da propriedade, a disseminação do NCS pode ser reduzida pela adoção da semeadura direta.

As cultivares de soja resistentes ao NCS já estão disponíveis e são apresentados na Tabela 11.1. No Brasil, já foram encontradas 11 raças, demonstrando elevada variabilidade genética do nematóide no País (Tabela 11.6). Portanto, mesmo com a utilização de cultivares resistentes, os sojicultores terão que continuar fazendo rotação de culturas nas áreas infestadas. Isso evitará que o nematóide mude de raça e, assim, a resistência dessas novas cultivares às raças 1 e 3, predominantes nas áreas cultivadas, estará preservada. Um sistema de rotação, que envolva culturas não hospedeiras, cultivar suscetível e cultivar resistente deverá ser adotado, por exemplo, milho-soja resistente-soja susceptível. A rotação da soja com uma espécie não hospedeira, no verão, é o método que vem possibilitando a produção de soja nas áreas infestadas. O milho tem sido a espécie mais utilizada na rotação com a soja. O algodão, o arroz, a mamona, o girassol e a cana, desde que economicamente viáveis, também são boas opções. De modo geral, a substituição da soja, um ano, por uma espécie não hospedeira, proporciona uma redução da população do

NCS no solo suficiente para garantir o cultivo da soja por mais um ano, devendo-se continuar a rotação na seqüência, pois a população volta a crescer a níveis de risco. No caso de cultivo de verão por dois ou mais anos consecutivos com espécie não hospedeira, pode-se cultivar soja na área nos dois anos seguintes, sem risco de perda pelo NCS, se o pH do solo estiver nos níveis indicados para a região. Nesse caso, por medida de segurança, indica-se providenciar avaliação da população do nematóide no solo antes do segundo cultivo de soja. Com relação ao cultivo de inverno, em áreas infestadas pelo NCS, indica-se utilizar apenas as espécies não hospedeiras (gramíneas, crucíferas, girassol, mucunas, etc.). O cultivo de espécies hospedeiras no inverno, tais como soja, feijão, tremoço e ervilha permitirá que a população do nematóide se mantenha alta. O NCS reproduz-se na soja germinada a partir de grãos perdidos na colheita (soja "guaxa" ou "tiguera"), aumentando o inóculo para a próxima safra. Portanto, não deve ser permitida a presença de "tiguera" em áreas infestadas.

O manejo adequado do solo (níveis mais altos de matéria orgânica, saturação de bases dentro do indicado para a região, parcelamento do potássio em solos arenosos, adubação equilibrada, suplementação com micronutrientes e ausência de camadas compactadas) ajuda a aumentar a tolerância da soja ao nematóide.

### **Nematóide reniforme (*Rotylenchulus reniformis*)**

A partir do final da década de noventa, o nematóide reniforme vem aumentando em importância na cultura da soja, em especial no centro-sul de Mato Grosso do Sul. Já é considerado um dos principais problemas em Maracaju e Aral Moreira, e está disseminado em outros 19 municípios do Estado. Estima-se que, atualmente, o nematóide ocorra em altas densidades populacionais em municípios que respondem por 29% da área cultivada com soja no Estado.

Os sintomas nas plantas parasitadas por *R. reniformis* diferem um pouco daqueles causados por outros nematóides. Lavouras de soja cultivadas em solos infestados caracterizam-se pela expressiva desuniformidade, com extensas áreas de plantas subdesenvolvidas que, em muito, asse-

melham-se a problemas de deficiência mineral ou de compactação do solo. Tampouco há ocorrência de reboleiras típicas. Ao serem arrancadas, as raízes parecem permanecer sujas mesmo após serem lavadas em água corrente; isto devido ao fato da argila do solo ficar aderida às massas de ovos dos nematóides.

Ainda, diferentemente das demais espécies que ocorrem na soja, o nematóide reniforme não parece ter sua ocorrência limitada pela textura do solo, ocorrendo tanto em solos arenosos quanto em argilosos. Nestes, normalmente é a espécie predominante. Não raro, os danos são comuns em áreas de boa fertilidade.

As principais alternativas de controle do nematóide reniforme são a rotação/sucessão com culturas não hospedeiras e a utilização de cultivares resistentes. A patogenicidade desse nematóide ao algodoeiro, ao qual é muito danoso, limita os programas de rotação de culturas. O Milho, o arroz, o amendoim e a braquiária, esta com potencial de utilização num esquema de integração lavoura/pecuária, são resistentes e podem ser utilizados em rotação com a soja ou o algodão. Das plantas cultivadas no outono/inverno e utilizadas como coberturas em sistemas de semeadura direta, são resistentes a braquiária, o nabo forrageiro, o sorgo forrageiro, a aveia preta, o milheto e o capim pé-de-galinha. Por outro lado, deve-se evitar o cultivo de amaranto e quinoa, ambos suscetíveis. Como para ambas, espécies vegetais resistentes e suscetíveis, pode existir variação entre os cultivares/híbridos, testes prévios de hospedabilidade são sempre necessários. Pelo fato de o nematóide reniforme ser muito persistente no solo, dependendo da densidade populacional do nematóide, pode haver necessidade de, pelo menos, dois anos de cultivo com espécie não hospedeira.

Com relação ao uso da resistência genética, normalmente, as principais fontes de resistência ao nematóide de cisto da soja (NCS), exceto a PI 88788, também conferem resistência a *Rotylenchulus reniformis*. Portanto, devem ser exploradas nos programas de melhoramento visando resistência ao mesmo. As cerca de 30 cultivares de soja resistentes ao NCS já liberadas no Brasil (Tabela 11.1), especialmente, aquelas derivadas de 'Peking' ('Custer', 'Forrest', 'Sharkey', 'Lamar', 'Pickett', 'Gordon',

'Stonewall', 'Thomas', 'Foster', 'Kirby' e 'Padre', dentre outras), da PI 90763 ('Cordell') ou da PI 437654 ('Hartwig') têm grande chance de também serem resistentes ao nematóide reniforme. Isso precisa ser comprovado em avaliações, em casa-de-vegetação.

**Tabela 11.1.** Reação das cultivares comerciais de soja ao cancro da haste (C.H.) (*Phomopsis phaseoli* f.sp. *meridionalis*/*Diaporthe phaseolorum* f.sp. *meridionalis*), mancha “olho-de-rã” (*Cercospora sojina*) (quatro raças fisiológicas e mistura de raças), mancha alvo (M.a.) (*Corynespora cassiicola*), oídio (O.) (*Erysiphe diffusa*), vírus do mosaico comum da soja-VMCS (SMV), vírus da necrose da haste (VNH) e nematóide de galhas (*Meloidogyne javanica* e *M. incognita*) e de cisto (NCS) (*Heterodera glycines*). Embrapa Soja, Londrina, PR. 2005.

Cultivar	Doenças / reação												
	C.H. <sup>1</sup>	Mancha “olho-de-rã” <sup>2</sup>					M.a. <sup>3</sup>	O. <sup>4</sup>	VNH <sup>5</sup>	SMV <sup>6</sup>	Nematóide <sup>7</sup>		
		Cs-15	Cs-23	Cs-24	Cs-25	Mist.					M.j.	M.i.	NCS <sup>8</sup>
A 7001	R	-	-	-	-	R	-	-	-	-	-	-	-
A 7002	R	-	-	-	-	R	-	-	-	S	S	S	S
A 7003	R	-	-	-	-	-	-	R	-	-	-	-	S
A 7005	R	-	-	-	-	R	-	MS	-	-	-	-	-
BR 16	MS	R	R	R	R	R	MR	AS	R	R	S	S	S
BR 36	AS	R	R	R	R	R	MR	R	D	R	MR	R	S
BR 37	MS	R	R	AS	S	R	MR	MR	D	R	S	S	S
BR/Emgopa 314 (Garça Branca)	R	R	R	R	R	R	AS	R	D	S	S	S	S
BR/IAC 21	R	R	R	R	R	R	MS	MR	R	S	S	-	S
BRS 132	R	R	R	R	R	R	MR	MR	S	S	MR	S	S
BRS 133	R	R	R	S	I	R	S	S	R	R	S	S	S
BRS 134	R	R	R	-	-	R	-	S	S	R	S	S	S
BRS 136	R	R	R	R	R	R	MR	MS	R	S	S	S	S
BRS 137	R	-	-	-	-	R	-	MR	R	S	S	S	S
BRS 154	MS	-	-	-	-	R	-	MR	D	S	S	S	S
BRS 156	R	R	R	R	R	R	MR	AS	S	R	S	S	S
BRS 181	R	-	-	-	-	R	-	MR	R	R	S	S	S

Continua...

Cultivar	Doenças / reação												
	C.H. <sup>1</sup>	Mancha "olho-de-rã" <sup>2</sup>					M.a. <sup>3</sup>	O. <sup>4</sup>	VNH <sup>5</sup>	SMV <sup>6</sup>	Nematóide <sup>7</sup>		
		Cs-15	Cs-23	Cs-24	Cs-25	Mist.					M.j.	M.i.	NCS <sup>8</sup>
...Continuação Tabela 11.1													
BRS 182	R	-	-	-	-	R	-	MR	D	R	S	S	S
BRS 183	R	R	R	-	-	R	-	MR	S	S	S	S	S
BRS 184	R	R	R	-	-	R	-	S	S	R	S	S	S
BRS 185	R	R	R	-	-	R	-	S	D	-	S	S	S
BRS 205	R	-	-	-	-	R	-	-	D	S	S	S	S
BRS 206	R	-	-	-	-	R	-	S	D	R	-	-	-
BRS 211	R	-	-	-	-	R	-	-	S	S	R	R	S
BRS 212	R	-	-	-	-	R	-	R	S	S	S	S	S
BRS 213	R	-	-	-	-	R	-	MR	S	S	MR	R	S
BRS 214	R	-	-	-	-	I	-	MR	R	S	S	MR	S
BRS 215	R	-	-	-	-	R	-	MR	D	S	S	S	S
BRS 216	R	-	-	-	-	I	-	MS	S	S	MR	MR	S
BRS 217 [Flora]	-	-	-	-	-	R	-	-	R	S	S	S	S
BRS 218 [Nina]	R	-	-	-	-	R	-	R	S	S	S	S	S
BRS 219 [Boa Vista]	R	R	-	-	-	-	-	-	R	S	S	S	S
BRS 230	R	-	-	-	-	R	-	S	R	R	S	MR	S
BRS 231	R	-	-	-	-	R	-	MS	R	S	S	MR	R1,3
BRS 232	R	-	-	-	-	R	-	S	R	R	S	MR	S
BRS 233	R	-	-	-	-	-	-	MR	D	S	R	R	S
BRS 239	R	-	-	-	-	R	-	-	-	-	R	R	S
BRS 240	R	-	-	-	-	R	-	-	-	-	MR	MR	S
BRS 241	R	-	-	-	-	R	-	-	-	-	MR	S	S
BRS 242RR	R	-	-	-	-	R	-	MS	-	-	S	S	S

Continua...

Cultivar	Doenças / reação												
	C.H. <sup>1</sup>	Mancha "olho-de-rã" <sup>2</sup>					Nematóide <sup>7</sup>						
		Cs-15	Cs-23	Cs-24	Cs-25	Mist.	M.a. <sup>3</sup>	O. <sup>4</sup>	VNH <sup>5</sup>	SMV <sup>6</sup>	M.j.	M.i.	NCS <sup>8</sup>
...Continuação Tabela 11.1													
BRS 243RR	R	-	-	-	-	R	-	MS	-	-	S	S	S
BRS 244RR	R	-	-	-	-	R	-	MR	-	-	S	S	S
BRS 245RR	R	-	-	-	-	R	-	MR	-	-	S	S	S
BRS 246RR	R	-	-	-	-	R	-	MS	-	-	S	S	S
BRS 247RR	R	-	-	-	-	R	-	MR	-	-	S	S	S
BRS 252 [Serena]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S
BRS 255RR	R	-	-	-	-	R	-	-	R	-	S	S	S
BRS 256RR	R	-	-	-	-	R	-	S	S	-	R	R	S
BRS 257	R	-	-	-	-	R	-	MS	S	R	MR	R	S
BRS 258	R	-	-	-	-	R	-	MR	S	-	S	S	S
BRS 259	R	-	-	-	-	R	-	S	S	R	S	S	S
BRS 260	R	-	-	-	-	R	-	MS	S	R	MR	R	S
BRS 261	R	-	-	-	-	R	-	MS	S	-	R	R	S
BRS 262	R	-	-	-	-	R	-	MS	-	-	S	S	R3
BRS 263 [Diferente]	R	-	-	-	-	R	-	-	-	-	S	S	R1,3 MR14
BRS Aline	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S
BRS Aurora	R	R	R	-	-	R	-	S	S	-	S	S	S
BRS Babaçu	R	R	R	R	-	R	-	-	D	S	S	S	S
BRS Baliza RR	R	-	-	-	-	R	-	MS	-	-	MR	MR	S
BRS Barreiras	R	-	-	-	-	R	-	-	D	R	S	S	S
BRS Cambona	R	-	-	-	-	R	-	R	-	S	S	R	S
BRS Candeia	R	-	-	-	-	R	-	-	-	S	MR	R	S
BRS Candiero	R	-	-	-	-	R	-	R	-	S	R	S	S

Continua...

Cultivar	Doenças / reação												
	C.H. <sup>1</sup>	Mancha "olho-de-rã" <sup>2</sup>					M.a. <sup>3</sup>	O. <sup>4</sup>	VNH <sup>5</sup>	SMV <sup>6</sup>	Nematóide <sup>7</sup>		
		Cs-15	Cs-23	Cs-24	Cs-25	Mist.					M.j.	M.i.	NCS <sup>8</sup>
... Continuação Tabela 11.1													
BRS Carla	R	R	R	R	R	R	MR	-	D	R	S	S	S
BRS Carnaúba	R	-	-	-	-	R	-	-	-	-	S	S	S
BRS Celeste	R	R	R	S	S	R	MR	-	D	S	* R	S	S
BRS Corisco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R	MR	S
BRS Diana	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	S	S	S
BRS Eva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MR	S	S
BRS Favorita RR	R	-	-	-	-	R	-	R	-	R	R	MR	S
BRS Gralha	R	-	-	-	-	S	-	MS	S	R	S	S	S
BRS Guapa	R	-	-	-	-	R	-	R	-	R	S	S	S
BRS Invernada	R	-	-	-	-	R	-	S	-	S	S	S	R3
BRS Jiripoca	R	-	-	-	-	I	-	MS	R	R	S	S	R1,3
BRS Juçara	MS	-	-	-	-	R	-	-	S	S	S	S	S
BRS Macota	R	-	-	-	-	R	-	S	-	-	MR	R	S
BRS Marina	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	R	R	S
BRS Milena	R	R	R	R	R	R	-	R	R	R	S	S	S
BRS Nova Savana	MR	-	-	-	-	R	-	-	D	R	S	S	S
BRS Pétala	MS	-	-	-	-	R	-	-	S	S	R	MR	S
BRS Piraíba	R	-	-	-	-	AS	-	MS	S	R	MR	MR	R1,3
BRS Pirarara	R	R	R	-	-	I	-	-	S	S	S	MR	S
BRS Raiana	R	-	-	-	-	R	-	MR	-	R	S	S	S
BRS Raimunda	R	-	-	-	-	-	-	R	S	-	R	R	S
BRS Rosa	R	-	-	-	-	R	-	-	D	R	S	S	S
BRS Sambaíba	R	R	R	R	R	R	MR	-	D	R	S	S	S

Continua...

Cultivar	Doenças / reação												
	C.H. <sup>1</sup>	Mancha "olho-de-rã" <sup>2</sup>					M.a. <sup>3</sup>	O. <sup>4</sup>	VNH <sup>5</sup>	SMV <sup>6</sup>	Nematóide <sup>7</sup>		
		Cs-15	Cs-23	Cs-24	Cs-25	Mist.					M.j.	M.i.	NCS <sup>8</sup>
...Continuação Tabela 11.1													
BRS Seleta	R	R	R	-	-	R	-	S	S	S	S	S	S
BRS Silvânia RR	R	-	-	-	-	-	-	S	-	-	MR	MR	S
BRS Sinuelo	R	-	-	-	-	R	-	R	-	R	S	S	S
BRS Tebana	R	-	-	-	-	R	-	S	-	R	S	S	S
BRS Tianá	R	-	-	-	-	R	-	MR	-	-	S	S	S
BRS Torena	R	-	-	-	-	R	-	S	-	R	S	S	S
BRS Traçajá	R	-	-	-	-	S	-	-	D	R	S	S	S
BRS Valiosa RR	R	-	-	-	-	R	-	R	R	R	R	MR	S
BRS GO 204 [Goiânia]	MS	-	-	-	-	S	-	S	S	S	R	R	S
BRS GO Amaralina	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	S	S
BRS GO Bela Vista	R	-	-	R	R	R	MR	-	S	R	S	S	S
BRS GO Caiapônia	R	-	-	-	-	R	-	MS	R	R	S	R	S
BRS GO Chapadões	R	-	-	-	-	R	-	MS	S	S	S	MR	R1,3,4,5,14
BRS GO Goiatuba	R	-	-	-	R	R	MS	S	D	S	S	MR	S
BRS GO Iara	R	-	-	-	-	R	-	MR	-	S	S	R	R3
BRS GO Indiará	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	MR	-	S
BRS GO Ipameri	R	-	-	-	-	R	-	MS	-	MS	S	S	R3, 14
BRS GO Jataí	R	-	-	I	R	R	R	MR	D	S	MR	S	S
BRS GO Luziânia	MS	-	-	-	-	R	-	MS	S	S	R	MR	S
BRS GO Mineiros	R	-	-	-	-	R	-	MS	-	-	MR	MR	S
BRS GO Paraíso	S	-	-	-	-	I	-	MR	S	S	MR	R	S
BRS GO Raíssa	R	-	-	-	-	R	-	MR	-	R	S	S	R3
BRS GO Santa Cruz	R	-	-	-	-	R	-	MS	D	R	S	S	S

Continua...

Cultivar	Doenças / reação												
	C.H. <sup>1</sup>	Mancha "olho-de-rã" <sup>2</sup>					M.a. <sup>3</sup>	O. <sup>4</sup>	VNH <sup>5</sup>	SMV <sup>6</sup>	Nematóide <sup>7</sup>		
		Cs-15	Cs-23	Cs-24	Cs-25	Mist.					M.j.	M.i.	NCS <sup>8</sup>
...Continuação Tabela 11.1													
BRSMA Pati	R	-	-	R	R	R	S	-	D	S	S	S	S
BRSMA Seridó RCH	MR	R	-	R	R	R	MR	-	S	R	S	S	S
BRSMG 68 [Vencedora]	MS	-	-	I	I	R	S	R	S	S	*S	MR	S
BRSMG 250 [Nobreza]	R	-	-	-	-	R	-	R	-	-	S	S	R3
BRSMG 251 [Robusta]	R	-	-	-	-	R	-	MR	-	-	S	S	R3
BRSMG Garantia	MR	-	-	-	-	I	S	R	D	S	R	R	S
BRSMG Liderança	S	-	-	I	R	R	S	-	S	S	S	R	R3
BRSMS Acará	R	-	-	R	I	S	-	R	S	S	-	-	S
BRSMS Apaiari	S	-	-	S	R	R	MS	-	S	S	S	S	S
BRSMS Bacuri	R	-	-	S	R	I	MS	-	R	S	S	S	S
BRSMS Carandá	R	-	-	R	R	R	R	-	D	R	S	S	S
BRSMS Curimbatá	R	-	-	R	I	I	-	-	D	S	-	-	S
BRSMS Lambari	R	R	R	R	R	R	MS	-	D	R	S	S	S
BRSMS Mandi	MS	R	R	R	R	R	MR	-	R	R	S	S	S
BRSMS Piapara	MS	-	-	R	R	R	R	-	D	S	R	MR	S
BRSMS Piracanjuba	R	-	-	I	I	R	MR	-	R	S	-	-	S
BRSMS Piraputanga	R	-	-	AS	AS	R	AS	-	S	S	S	S	S
BRSMS Sauá	R	-	-	R	R	R	-	-	R	R	-	-	S
BRSMS Surubi	R	R	R	R	R	R	MR	-	R	S	S	S	S
BRSMS Taquari	R	-	-	AS	S	R	MR	-	D	R	S	S	S
BRSMS Tuiuiú	R	-	-	R	R	R	MR	-	D	S	-	-	S
BRSMT Crixás	R	-	-	R	R	R	MS	S	D	S	MR	S	S
BRSMT Pintado	R	-	-	I	R	I	MR	-	R	S	S	S	R1,3

Continua...

Cultivar	Doenças / reação												
	C.H. <sup>1</sup>	Mancha "olho-de-rã" <sup>2</sup>					M.a. <sup>3</sup>	O. <sup>4</sup>	VNH <sup>5</sup>	SMV <sup>6</sup>	Nematóide <sup>7</sup>		
		Cs-15	Cs-23	Cs-24	Cs-25	Mist.					M.j.	M.i.	NCS <sup>8</sup>
...Continuação Tabela 11.1													
BRSMT Uirapuru	R	R	R	R	R	R	MR	R	R	R	S	S	S
CAC 1	MR	R	-	R	R	R	MR	MR	S	S	-	-	S
CD 201	R	-	-	R	R	R	MS	AS	S	S	R	R	S
CD 202	R	-	-	R	-	R	MR	MS	S	R	S	R	S
CD 203	R	-	-	R	R	R	S	AS	S	S	R	R	S
CD 204	R	-	-	-	-	R	-	MR	R	-	S	S	S
CD 205	R	-	-	-	-	R	-	MR	R	-	S	S	S
CD 206	R	-	-	-	-	R	-	R	S	-	MR	S	S
CD 207	R	-	-	-	-	R	-	MS	R	-	S	S	S
CD 208	R	-	-	-	-	R	-	S	S	-	R	R	S
CD 209	R	-	-	-	-	R	-	MR	R	-	S	S	S
CD 210	R	-	-	-	-	R	-	MR	-	-	-	-	S
CD 211	R	-	-	-	-	R	-	MR	-	-	-	MR	S
CD 212RR	R	-	-	-	-	R	-	S	-	-	-	-	-
CD 213RR	R	-	-	-	-	R	-	S	-	-	-	-	-
CD 214RR	R	-	-	-	-	R	-	S	-	-	-	MR	-
CD 215	R	-	-	-	-	R	-	MR	-	-	-	-	-
CD 216	R	-	-	-	-	R	-	MR	-	-	MS	MR	S
CD 217	R	-	-	-	-	R	-	MS	-	-	S	R	R 3
CD 218	R	-	-	-	-	R	-	MR	R	-	S	R	S
CD 219RR	R	-	-	-	-	R	-	MR	R	-	MR	S	-
CD Fapa 220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S
CD 221	R	-	-	-	-	R	-	MR	-	-	-	-	-

Continua...

Cultivar	Doenças / reação												
	C.H. <sup>1</sup>	Mancha "olho-de-rã" <sup>2</sup>					M.a. <sup>3</sup>	O. <sup>4</sup>	VNH <sup>5</sup>	SMV <sup>6</sup>	Nematóide <sup>7</sup>		
		Cs-15	Cs-23	Cs-24	Cs-25	Mist.					M.j.	M.i.	NCS <sup>8</sup>
...Continuação Tabela 11.1													
CD 222	R	-	-	-	-	R	-	MR	-	-	-	-	-
CD 223AP	R	-	-	-	-	R	-	MR	-	-	-	-	-
CS 201 (Splendor)	R	-	-	S	S	I	S	-	-	-	-	-	S
CS 801	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R3
CS 821	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CS935142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S
DM 118	R	-	-	-	-	R	-	S	-	-	-	-	S
DM 247	R	-	-	-	-	R	-	R	-	-	-	-	S
DM 309	R	-	-	-	-	I	-	S	-	-	-	-	S
DM 339	R	-	-	-	-	S	-	R	-	-	-	-	S
DM Nobre	R	-	AS	S	I	R	R	R	-	R	-	-	S
DM Rainha	R	-	R	R	R	R	S	MR	-	S	-	-	S
DM Soberana	R	-	R	R	R	R	MS	-	-	S	S	S	S
DM Vitória	R	-	AS	S	I	R	-	MR	-	S	S	S	S
Elite	R	-	-	-	-	R	-	-	-	-	-	-	S
Embrapa 20 (Doko RC)	R	R	R	R	R	R	MS	R	D	S	S	S	S
Embrapa 48	MR	R	R	R	R	R	S	AS	D	S	S	S	S
Embrapa 59	R	R	-	R	R	R	MR	MR	R	R	S	S	S
Embrapa 60	R	R	-	R	R	R	-	MR	S	R	S	S	S
Emgopa 302	R	R	R	R	R	I	AS	MR	S	S	S	S	S
Emgopa 305 (Caraíba)	S	R	R	R	R	R	R	R	S	S	S	S	S
Emgopa 308 (Serra Dourada)	AS	R	R	R	R	R	R	AS	S	S	-	-	S
Emgopa 313 (Anhanguera)	MS	R	R	I	R	R	MR	MR	D	S	S	S	S

Continua...

Cultivar	Doenças / reação												
	C.H. <sup>1</sup>	Mancha "olho-de-rã" <sup>2</sup>					M.a. <sup>3</sup>	O. <sup>4</sup>	VNH <sup>5</sup>	SMV <sup>6</sup>	Nematóide <sup>7</sup>		
		Cs-15	Cs-23	Cs-24	Cs-25	Mist.					M.j.	M.i.	NCS <sup>8</sup>
...Continuação Tabela 11.1													
Emgopa 315 (Rio Vermelho)	R	R	-	R	R	R	-	R	D	R	S	S	S
Emgopa 316	R	-	-	R	R	R	-	S	S	S	S	S	S
FMT Anhumas	R	-	-	-	-	AS	-	-	-	-	-	-	S
FMT Arara Azul	R	-	-	-	-	I	-	-	S	-	MR	S	S
FMT Beija-Flor	R	R	-	-	-	I	-	-	D	-	S	S	S
FMT Cachara	R	R	-	-	-	R	-	-	D	-	S	S	R1,3
FMT Kaiabi	-	R	-	-	-	R	-	-	-	-	S	S	S
FMT Maritaca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S
FMT Matrinxã	MS	-	-	-	-	R	-	-	S	-	S	R	R1,3
FMT Mutum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S
FMT Nambu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S
FMT Perdiz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MR	-	S
FMT Sabiá	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S
FMT Saíra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S
FMT Tabarana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R1,3
FMT Tucunaré	R	-	-	-	-	I	-	-	R	-	-	-	R1,3
Foster (IAC)	AS	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	-	R3
FT 106	R	-	-	R	R	R*	S-	S	-	-	-	S	S
IAC 12	R	S	R	S	I	R	S	R	-	S	S	R	S
IAC 13	R	S	R	S	I	R	AS	R	-	S	S	-	S
IAC 15	AS	R	R	R	R	R	S	S	-	S	-	-	S
IAC 15-1	R	-	-	-	-	I	-	MR	-	-	-	-	S
IAC 16	R	I	AS	-	-	S	AS	MR	-	S	-	-	S

Continua...

Cultivar	Doenças / reação												
	C.H. <sup>1</sup>	Mancha "olho-de-rã" <sup>2</sup>					M.a. <sup>3</sup>	O. <sup>4</sup>	VNH <sup>5</sup>	SMV <sup>6</sup>	Nematóide <sup>7</sup>		
		Cs-15	Cs-23	Cs-24	Cs-25	Mist.					M.j.	M.i.	NCS <sup>8</sup>
...Continuação Tabela 11.1													
IAC 17	R	S	S	R	I	I	S	R	-	S	-	-	S
IAC 18	R	-	S	I	S/R	S	S	AS	-	S	-	-	S
IAC 19	MS	-	I	I	I	R	AS	R	-	R	-	-	S
IAC 20	R	-	-	R	R	R	R	-	-	-	-	-	S
IAC 22	R	-	-	R	R	R	R	-	-	-	-	-	S
IAC 23	R	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	-	S
IAC 24	-	-	-	-	-	R	-	-	-	-	-	-	S
IAC 8	S	S	I	R	I	S	R/S	R/S	-	S	R	R	S
IAC 8-2	R	S	S	-	-	S	-	-	-	S	S	-	S
IAC 100	MR	I	R	S	I	R	AS	R	-	S	S	S	S
IAC Foscarin 31	R	I	R	R	S	R	AS	AS	-	R	S	-	S
IAC PL-1	MR	-	R	R	R	S	MS	AS	-	S	-	-	S
IAC/Holambra Stewart-1	R	-	-	-	-	R	-	-	-	-	-	-	S
IAS 5	S	S	AS	-	-	S	-	-	D	S	S	S	-
ICA 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S
ICA 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S
ICA 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S
ICASC 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S
ICASC 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S
ICASC 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S
ICASC 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S
KI-S 601	S	-	I	I	R	I	S	-	-	S	-	-	S
KI-S 602 RCH	R	-	-	I	R	S	MS	S	-	S	-	-	S

Continua...

Cultivar	Doenças / reação												
	C.H. <sup>1</sup>	Mancha "olho-de-rã" <sup>2</sup>					M.a. <sup>3</sup>	O. <sup>4</sup>	VNH <sup>5</sup>	SMV <sup>6</sup>	Nematóide <sup>7</sup>		
		Cs-15	Cs-23	Cs-24	Cs-25	Mist.					M.j.	M.i.	NCS <sup>8</sup>
...Continuação Tabela 11.1													
KI-S 702	S	-	-	R	R	R	MR	R	-	R	-	-	S
KI-S 801	S	-	-	R	R	R	MR	R	-	-	-	-	S
MG/BR 46 (Conquista)	R	R	I	S	I	R	MR	R	D	S	R	R	S
Mojarca	R	-	-	R	R	R	MR	-	R	-	-	-	S
MS/BR 19 (Pequi)	AS	-	R	I	S	R	S	R	S	S	R	R	S
MS/BR 34 (Empaer 10)	AS	R	R	R	R	R	R	AS	D	S	MR	R	S
M-SOY 109*	R	-	-	-	-	R	-	MR	-	-	-	-	S
M-SOY 2002*	R	-	-	-	-	R	-	S	-	-	-	-	S
M-SOY 5826*	R	-	-	-	-	R	-	MR	-	-	-	-	S
M-SOY 5942*	R	-	-	-	-	R	-	MR	-	-	-	-	S
M-SOY 6101*	R	-	-	-	-	R	-	MR	-	-	-	-	S
M-SOY 7101*	-	-	-	-	-	R	-	R	-	-	-	-	S
M-SOY 7201*	S	-	-	-	-	R	-	MS	-	-	-	-	S
M-SOY 7202*	-	-	-	-	-	R	-	MR	-	-	-	-	S
M-SOY 7203*	-	-	-	-	-	R	-	MS	-	-	-	-	S
M-SOY 7501*	-	-	-	-	-	R	-	MR	-	-	-	-	S
M-SOY 7602*	R	-	-	-	-	R	-	MR	-	-	-	-	S
M-SOY 7603*	R	-	-	-	-	R	-	MR	-	-	-	-	S
M-SOY 7701*	MR	-	-	-	-	R	-	R	-	-	-	-	S
M-SOY 7901*	-	-	-	-	-	R	-	MR	-	-	-	-	R3
M-SOY 8001*	MR	-	-	-	-	R	-	MS	-	-	S	S	R1,3
M-SOY 8200*	MS	-	-	-	-	R	-	MS	-	-	MS	S	R3
M-SOY 8400*	MS	-	-	-	-	R	-	MS	-	-	S	S	R3

Continua...

Cultivar	Doenças / reação												
	C.H. <sup>1</sup>	Mancha "olho-de-rã" <sup>2</sup>					M.a. <sup>3</sup>	O. <sup>4</sup>	VNH <sup>5</sup>	SMV <sup>6</sup>	Nematóide <sup>7</sup>		
		Cs-15	Cs-23	Cs-24	Cs-25	Mist.					M.j.	M.i.	NCS <sup>8</sup>
...Continuação Tabela 11.1													
M-SOY 8411*	R	-	-	-	-	R	-	R	-	-	-	-	S
M-SOY 8550*	R	-	-	-	-	R	-	R	-	-	-	-	S
M-SOY 8757*	MS	-	-	-	-	R	-	S	-	-	S	S	R3
M-SOY 8800*	-	-	-	-	-	R	-	MR	-	-	-	-	-
M-SOY 8914*	R	-	-	-	-	R	-	MS	-	-	-	-	S
M-SOY 9001*	R	-	-	-	-	R	-	MR	-	-	S	S	S
M-SOY 9010*	R	-	-	-	-	R	-	MR	-	-	-	-	S
M-SOY 9030*	R	-	-	-	-	-	-	MR	-	-	-	-	S
M-SOY 9350*	R	-	-	-	-	R	-	MR	-	-	S	S	S
MT/BR 45 (Paiaguás)	R	R	R	R	R	R	MR	MR	D	S	S	-	S
MT/BR 47 (Canário)	R	R	R	R	R	R	MR	AS	D	R	S	-	S
MT/BR 50 (Parecis)	R	R	-	R	R	R	AS	MR	D	S	S	-	S
MT/BR 51 (Xingu)	R	R	-	R	R	R	AS	AS	D	S	S	-	S
MT/BR 52 (Curió)	R	R	-	R	R	R	MR	AS	D	R	S	-	S
MT/BR 53 (Tucano)	R	R	-	R	R	R	AS	AS	D	S	-	-	S
NK412113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R3
OC 17	R	R	R	R	R	R	MR	AS	-	S	MR	S	S
OC 18	R	R	R	I	S	R	S	AS	-	S	-	-	S
OCEPAR 3 Primavera	R	R	AS	R	R	R	MS	AS	-	S	S	S	S
OCEPAR 4 Iguaçú	AS	R	R	R	R	R	MS	S	D	S	R	R	S
P98C21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S
P98N71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R 1,3
P98N82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R 1,3

Continua...

Cultivar	Doenças / reação												
	C.H. <sup>1</sup>	Mancha "olho-de-rã" <sup>2</sup>					M.a. <sup>3</sup>	O. <sup>4</sup>	VNH <sup>5</sup>	SMV <sup>6</sup>	Nematóide <sup>7</sup>		
		Cs-15	Cs-23	Cs-24	Cs-25	Mist.					M.j.	M.i.	NCS <sup>8</sup>
...Continuação Tabela 11.1													
RB 501	R	-	-	-	R	-	-	S	-	-	-	-	S
RB 502	R	-	-	-	R	-	-	S	-	-	-	-	S
RB 603	R	-	-	-	R	-	-	S	-	-	-	-	S
RB 604	R	-	-	-	R	-	-	AS	-	-	-	-	S
RB 605	R	-	-	-	R	-	-	AS	-	-	-	-	S
SL 8801	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S
SL 8802	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S
SL 8901	R	-	-	-	-	-	-	MR	-	-	-	-	S
SL 8902	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S
Suprema	R	-	-	-	-	I	-	-	-	-	-	-	S
UFUS Riqueza	R	-	-	-	-	R	-	R	R	R	-	-	S
UFUS Impacta	R	-	-	-	-	R	-	R	R	R	-	-	S
UFU Imperial	R	-	-	-	-	R	-	R	R	R	-	-	-
UFU Milionária	R	-	-	-	-	R	-	R	R	R	-	-	S
UFV 16 (Capinópolis)	R	-	-	S	R	R	S	R	-	S	-	-	S
UFV 17 (Minas Gerais)	R	-	-	R	R	R	MR	-	-	S	-	-	S
UFV 18 (Patos de Minas)	R	-	-	R	R	R	R	MR	-	R	-	-	S
UFV 19 (Triângulo)	R	-	-	R	R	R	MR	-	S	-	-	-	S
UFV 20 (Florestal)	R	-	-	R	R	R	R	-	-	S	-	-	S
UFV/ITM 1	MS	R	R	S	R	R	S	-	-	S	MR	R	S
UFVS 2001	R	-	-	-	-	I	-	R	-	R	-	-	S
UFVS 2002	R	-	-	-	-	R	-	R	-	-	-	-	S
UFVS 2003	R	-	-	-	-	R	-	MR	-	-	-	-	S

Continua...

Cultivar	Doenças / reação												
	C.H. <sup>1</sup>	Mancha "olho-de-rã" <sup>2</sup>					M.a. <sup>3</sup>	O. <sup>4</sup>	VNH <sup>5</sup>	SMV <sup>6</sup>	Nematóide <sup>7</sup>		
		Cs-15	Cs-23	Cs-24	Cs-25	Mist.					M.j.	M.i.	NCS <sup>8</sup>
...Continuação Tabela 11.1													
UFVS 2004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S
UFVS 2005	R	-	-	-	-	R	-	MR	-	-	-	-	S
UFVS 2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S
UFVS 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S
UFVS 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S
UFVS 2201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S
UFVS 2202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S
UFVS 2203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S
UFVS 2301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S
UFVS 2302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S
UFVS 2303	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S
UFVTN 101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S
UFVTN 102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S
UFVTN 103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S
UFVTN 104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S
UFVTN 105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S
UFVTNK 106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S
V-MAX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R3

Continua...

## ...Continuação Tabela 11.1

- <sup>1</sup> C.H. - Cancro da haste - Reação: R (resistente) = 0% a 25% de plantas mortas (PM); MR (moderadamente resistente) = 26% a 50% PM; MS (moderadamente suscetível) = 51% a 75% PM; S (suscetível) = 76% a 90% PM; AS (altamente suscetível) = mais de 90% PM (J.T. Yorinori CANCRO DA HASTE DA SOJA: Epidemiologia e Controle. Embrapa Soja, Circ. Tec. 14. 1996. 75 p.).
- <sup>2</sup> Mancha "olho-de-rã" (*Cercospora sojina*) - Reação: R (resistente) = 0% a 10% de área foliar infectada (afi) no folíolo central do trifólio mais infectado na planta amostrada; MR (moderadamente resistente) = 11% a 25% afi; MS (moderadamente suscetível) = 26% a 50% afi; S (suscetível) = 51% a 75% afi; AS (altamente suscetível) = mais de 75% afi. I (intermediária) = com lesões que não esporulam. Cs-15: reação à raça Cs-15, patogênica ao gene de resistência da cultivar Santa Rosa; Cs-23: reação à raça Cs-23; Cs-24 e Cs-25: novas raças presentes no MA e no PI; Mist.: mistura das raças (J.T. Yorinori).
- <sup>3</sup> M.a. - Mancha alva (*Corynespora cassiicola*) - Reação: mesma escala usada para mancha "olho-de-rã".
- <sup>4</sup> O. - Oídio (*Erysiphe diffusa*) - Reação: mesma escala usada para mancha "olho-de-rã".
- <sup>5</sup> VNH - vírus da necrose da haste. R = resistente; S = suscetível; D = desuniforme, genótipo com até 15% de plantas suscetíveis.
- <sup>6</sup> SMV - Vírus do mosaico comum da soja: S (suscetível) = plantas com sintomas de mosaico; R (resistente) = plantas sem sintomas ou com reação de hipersensibilidade, com lesões necróticas localizadas.
- <sup>7</sup> Nematóide de galhas: *M.j.* (*Meloidogyne javanica*) e *M.i.* (*M. incognita*): reações baseadas em intensidades de galhas e presença de ootecas, avaliadas a campo e em casa-de-vegetação. S = suscetível; MT= moderadamente tolerante; e T = tolerante.
- <sup>8</sup> NCS - Nematóide de Cisto da Soja (*Heterodera glycines*) – Resistência: R3 (à raça 3), R 1,3 (às raças 1 e 3) e R 1, 3, 4, 14 (às raças 1, 3, 4 e 14).
- \* Informações sobre reações ao cancro da haste, mancha "olho-de-rã" e oídio, das cultivares M-SOY, fornecidas pela MONSOY Ltda (Eng<sup>o</sup> Agr<sup>o</sup> Adilson Bizzeto, Rolândia, PR). Ago/2000.
- [ ] Entre colchetes - não faz parte do nome de registro
- ( ) Entre parêntesis - Faz parte do nome de registro.

**Tabela 11.2.** Estádios de desenvolvimento da soja<sup>1</sup>.

Estádio	Descrição
..... I. Fase Vegetativa .....	
VC.	Da emergência a cotilédones abertos.
V1.	Primeiro nó; folhas unifolioladas abertas.
V2.	Segundo nó; primeiro trifólio aberto.
V3.	Terceiro nó; segundo trifólio aberto.
Vn.	Enésimo (último) nó com trifólio aberto, antes da floração.
..... II. Fase Reprodutiva (Observação na haste principal) .....	
R1.	Início da floração: até 50% das plantas com flor.
R2.	Floração plena: maioria dos racemos com flores abertas.
R3.	Final da floração: flores e vagens com até 1,5cm.
R4.	Maioria das vagens no terço superior com 2-4cm.
R5.1.	Grãos perceptíveis ao tato a 10% da granação.
R5.2.	Maioria das vagens com granação de 10%-25%.
R5.3.	Maioria das vagens entre 25% e 50% de granação.
R5.4.	Maioria das vagens entre 50% e 75% de granação.
R5.5.	Maioria das vagens entre 75% e 100% de granação.
R6.	Vagens com granação de 100% e folhas verdes.
R7.1.	Início a 50% de amarelecimento de folhas e vagens.
R7.2.	Entre 51% e 75% de folhas e vagens amarelas.
R7.3.	Mais de 76% de folhas e vagens amarelas.
R8.1.	Início a 50% de desfolha.
R8.2.	Mais de 50% de desfolha à pré-colheita.
R9.	Ponto de maturação de colheita.

<sup>1</sup> Fonte adaptado de: RITCHIE, S.; HANWAY, J.J.; THOMPSON, H.E. How a Soybean Plant Develops. Ames, Iowa State University of Science and Technology, Coop. Ext. Serv., 1982. 20 p. (Special Report, 53) (José Tadashi Yorinori, Embrapa Soja, Londrina. 1996).

**Tabela 11.3.** Fungicidas registrados para o controle da ferrugem da soja (*Phakopsora pachyrhizi*). XXVII Reunião de Pesquisa de Soja da Região Central do Brasil. Cornélio Procópio, PR. 2005.

Nome comum	Nome comercial	Dose/ha		Agrupamento <sup>3</sup>
		g de i.a. <sup>1</sup>	l ou kg de p.c. <sup>2</sup>	
azoxystrobin	Priori <sup>4</sup>	50	0,20	*
azoxystrobin + ciproconazole	Priori Xtra <sup>4</sup>	60 + 24	0,30	***
ciproconazole + propiconazole	Artea	24 + 75	0,30	***
difenoconazole	Score 250 CE	50	0,20	*
epoxiconazole	Opus	50	0,40	**
fluquinconazole	Palisade <sup>5</sup>	62,5	0,25	*
flutriafol	Impact 125 SC	62,5	0,50	***
myclobutanil	Systhane 250	100 - 125	0,40 - 0,50	**
pyraclostrobin + epoxiconazole	Opera	66,5 + 25	0,50	***
tebuconazole	Constant 200 CE	100	0,50	***
tebuconazole	Elite 200 CE	100	0,50	***
tebuconazole	Folicur 200 CE	100	0,50	***
tebuconazole	Orius 250 CE	100	0,40	***
tebuconazole	Tríade 200 CE	100	0,50	***
tetraconazole	Domark 100 CE	50	0,50	**
tetraconazole	Eminent 125 EW	50	0,40	**
tiofanato metílico + flutriafol	Celeiro	300 + 60	0,60	***
tiofanato metílico + flutriafol	Impact duo	300 + 60	0,60	***
trifloxystrobin + ciproconazole	Sphere <sup>5</sup>	56,2 + 24	0,30	***
trifloxystrobin + propiconazole	Stratego <sup>5</sup>	50 + 50	0,40	*

A empresa detentora é responsável pelas informações de eficiência dos produtos.

<sup>1</sup> g i.a. = gramas de ingrediente ativo

<sup>2</sup> l ou kg de p.c. = litros ou quilogramas de produto comercial

<sup>3</sup> Agrupamento realizado com base nos ensaios em rede para doenças da soja, safras 2003/04 e 2004/05. (\*\*\*) - maior que 86% de controle; (\*\*) - 80 a 86% de controle e (\*) - 60 a 79 % de controle.

<sup>4</sup> Adicionar Nimbus 0,5% v./v. aplicação via pulverizador tratorizado ou 0,5 L/ha via aérea

<sup>5</sup> Adicionar 250 mL/ha de óleo mineral ou vegetal

**Tabela 11.4.** Fungicidas registrados para o controle de doenças de final de ciclo. XXVII Reunião de Pesquisa de Soja da Região Central do Brasil. Cornélio Procópio, PR. 2005.

Nome comum	Nome comercial	Dose/ha	
		g de i.a. <sup>1</sup>	l ou kg de p.c. <sup>2</sup>
azoxystrobin	Priori <sup>3</sup>	50	0,20
azoxystrobin + ciproconazole	Priori Xtra <sup>3</sup>	60 + 24	0,30
carbendazim	Bendazol	250	0,50
carbendazim	Derosal 500 SC	250	0,50
difenoconazole	Score 250 CE	50	0,20
flutriafol	Impact 125 SC	100	0,80
pyraclostrobin + epoxiconazole	Opera	66,5 + 25	0,50
tebuconazole	Constant 200 CE	150	0,75
tebuconazole	Elite 200 CE	150	0,75
tebuconazole	Folicur 200 CE	150	0,75
tebuconazole	Orius 250 CE	150	0,60
tebuconazole	Tríade 200 CE	150	0,75
tetraconazole	Domark 100 CE	50	0,50
tetraconazole	Eminent 125 EW	50	0,40
tiofanato metílico	Cercobin 500 SC	300 - 400	0,60 - 0,80
tiofanato metílico	Cercobin 700 SC	300 - 420	0,43 - 0,60
tiofanato metílico + flutriafol	Celeiro	300 + 60	0,60
tiofanato metílico + flutriafol	Impact duo	300 + 60	0,60
trifloxystrobin + ciproconazole	Sphere <sup>4</sup>	56,2 + 24	0,30
trifloxystrobin + propiconazole	Stratego <sup>4</sup>	50 + 50	0,40

A empresa detentora é responsável pelas informações de eficiência dos produtos.

<sup>1</sup> g i.a. = gramas de ingrediente ativo

<sup>2</sup> l ou kg de p.c. = litros ou kilogramas de produto comercial

<sup>3</sup> Adicionar Nimbus 0,5% v./v. aplicação via pulverizador tratorizado ou 0,5 L/ha via aérea

<sup>4</sup> Adicionar 250 mL/ha de óleo mineral ou vegetal

**Tabela 11.5.** Fungicidas registrados para o controle do oídio (*Erysiphe diffusa*). XXVII Reunião de Pesquisa de Soja da Região Central do Brasil. Cornélio Procópio, PR. 2005.

Nome comum	Nome comercial	Dose/ha		Agrupamento <sup>3</sup>
		g de i.a. <sup>1</sup>	l ou kg de p.c. <sup>2</sup>	
azoxystrobin + ciproconazole	Priori Xtra <sup>4</sup>	60 + 24	0,30	**
carbendazim	Bendazol	250	0,50	*
carbendazim	Derosal 500 SC	250	0,50	*
difenoconazole	Score 250 CE	37,5	0,15	**
enxofre	Kumulus	2000	2,50	*
fluquinconazole	Palisade <sup>5</sup>	62,5	0,25	**
flutriafol	Impact 125 SC	50	0,40	**
myclobutanil	Systhane 250 CE	62,5 - 125	0,25 - 0,50	**
pyraclostrobin + epoxiconazole	Opera	66,5 + 25	0,50	**
tebuconazole	Constant 200 CE	100	0,50	**
tebuconazole	Triade 200 CE	100	0,50	**
tebuconazole	Elite 200 CE	100	0,50	**
tebuconazole	Folicur 200 CE	100	0,50	**
tebuconazole	Orius 250 CE	100	0,40	**
tetraconazole	Domark 100 CE	50	0,50	**
tiofanato metílico	Cercobin 500 SC	300 - 400	0,60 - 0,80	*
tiofanato metílico	Cercobin 700 SC	300 - 420	0,43 - 0,60	*
trifloxystrobin + ciproconazole	Sphere <sup>5</sup>	56,2 + 24	0,30	**

A empresa detentora é responsável pelas informações de eficiência dos produtos.

<sup>1</sup> g i.a. = gramas de ingrediente ativo

<sup>2</sup> l ou kg de p.c.= litros ou kilogramas de produto comercial

<sup>3</sup> Agrupamento realizado com base nos ensaios em rede para doenças da soja, safras 2003/04 e 2004/05. (\*\*) maior que 70% de controle; (\*) de 60-70% de controle.

<sup>4</sup> Adicionar Nimbus 0,5% v./v. aplicação via pulverizador tratorizado ou 0,5 L/ha via aérea

<sup>5</sup> Adicionar 250 mL/ha de óleo mineral ou vegetal

**Tabela 11.6.** Distribuição de raças de *Heterodera glycines* no Brasil. Embrapa Soja, outubro de 2005.

Estados/Municípios	Raças
• Bahia	3
- Formosa do Rio Preto	3
• Goiás	3, 4, 5, 6, 9, 10 e 14
- Campo Alegre de Goiás	14
- Catalão	3
- Chapadão do Céu	3, 4, 5, 6, 9 e 14
- Gameleira de Goiás	3
- Ipameri	3 e 6
- Luziânia	3
- Jataí	4, 6, 9 e 14
- Mineiros	3, 6 e 14
- Rio Verde	3 e 10
- Perolândia	14
- Serranópolis	14
• Maranhão	9
- Balsas	9
• Mato Grosso	1, 2, 3, 4, 4 <sup>+</sup> , 5, 6, 9, 10, 14 e 14 <sup>+</sup>
- Alto Garças	3 e 14
- Alto Taquari	3, 10 e 14
- Campo Verde	1, 2, 3 e 5
- Campos de Júlio	5, 6 e 9
- Campo Novo do Parecis	3 e 9
- Deciolândia	3
- Diamantino	3
- Don Aquino	3 e 5
- Guiratinga	14
- Itiquira	3
- Jaciara	5
- Nova Ubiratã	3

Continua...

Estados/Municípios	Raças
...Continuação Tabela 11.6	
- Primavera do Leste	1, 3 e 5
- Santo Antônio do Leste	3
- Sapezal	3, 5 e 6
- Sorriso	3, 4 <sup>+</sup> , 5, 14 e 14 <sup>+</sup>
- Tangará da Serra	1, 3, 4
- Tapurah	6
• Mato Grosso do Sul	3, 4, 5, 6, 9, 10 e 14
- Água Clara	3 e 9
- Alcinoópolis	14
- Camapuã	6
- Chapadão do Sul	4, 5 e 6
- Costa Rica	6, 10 e 14
- Sonora	3
• Minas Gerais	3 e 6
- Araguari	3
- Coromandel	3
- Indianópolis	3
- Iraí de Minas	3
- João Pinheiro	3
- Monte Carmelo	3
- Nova Ponte	3
- Patos de Minas	3
- Pedrinópolis	3
- Perdizes	3
- Presidente Olegário	3
- Romaria	3
- Santa Juliana	3
- Uberaba	3 e 6
- Uberlândia	3

Continua...

Estados/Municípios	Raças
...Continuação Tabela 11.6	
• Paraná	3
- Bela Vista do Paraíso	3
- Congoinhas	3
- Marechal Cândido Rondon	3
- Sertaneja *	3
- Tupãssi	3
• São Paulo	3
- Assis	3
- Florínea	3
- Tarumã	3
• Rio Grande do Sul	3 e 6
- Cruzeiro do Sul	6
- Coimbra	3
- São Miguel das Missões	3
• Tocantins	1
- Dianópolis	1

## 11.4 Manuseio de fungicidas e descarte de embalagem

- ♦ Utilizar fungicidas devidamente registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), para uso na cultura da soja e para a doença ou patógeno que deseja controlar. O número do registro consta no rótulo do produto.
- ♦ Usar equipamento de proteção individual (EPI) apropriado, em todas as etapas de manuseio de agrotóxicos (abastecimento do pulverizador, aplicação e lavagem de equipamentos e embalagens), a fim de evitar possíveis intoxicações.
- ♦ Não fazer mistura em tanque, de dois fungicidas, ou de fungicida (s) com outro (s) agrotóxico (s), procedimento proibido por lei (Instrução Normativa do MAPA nº 46, de julho de 2002).
- ♦ Evitar aplicações em dias ou em horários com ventos fortes, visando reduzir a deriva dos jatos, tornando mais eficiente a aplicação e reduzindo possíveis contaminações de áreas vizinhas.
- ♦ Observar o período de carência do produto (período compreendido entre a data da aplicação e a colheita da soja).
- ♦ Ler com atenção o rótulo e a bula do produto e seguir todas as orientações e os cuidados com o descarte das embalagens.
- ♦ Devolver as embalagens vazias (após a tríplice lavagem das embalagens de produtos líquidos), no prazo de um ano após a compra do produto, ao posto de recebimento indicado na nota fiscal de compra, conforme legislação do MAPA (Lei 9.974, de 06/06/2000 e Decreto 4.074, de 04/01/2002).



# 12

## Retenção Foliar e Haste Verde

---

A retenção foliar e/ou haste verde da soja é, quase sempre, consequência de distúrbios fisiológicos que interferem na formação ou no enchimento dos grãos. Dentre esses podem estar os danos por percevejos, o estresse hídrico (falta ou excesso) e o desequilíbrio nutricional das plantas.

Sob estresse hídrico, pode haver aborto de flores e de vagens. Seca acentuada durante a fase final de floração e na formação das vagens pode causar abortamento de quase todas as flores restantes e vagens recém formadas. A falta de carga nas plantas pode provocar uma segunda florada, normalmente infértil, resultando em retenção foliar pela ausência de demanda pelos produtos da fotossíntese. A situação pode se agravar se houver excesso de chuvas durante a maturação. O excesso de umidade, nesse período, propicia a manutenção do verde das hastes e vagens e favorece o aparecimento de retenção foliar, mesmo em plantas com carga satisfatória e sem danos de percevejos. Há cultivares mais sensíveis a esse fenômeno.

As causas mais comuns têm sido os danos por percevejos e o desequilíbrio nutricional relacionado ao potássio. A não aplicação, com rigor necessário, dos princípios do Manejo de Pragas, tem levado, muitas vezes, a um controle não eficiente dos percevejos. Isto é mais comum em lavouras semeadas após a época recomendada e/ou quando se usam cultivares tardias. Nesses casos, pode haver migração das populações de percevejos de lavouras em estágio final de maturação, ou recém colhidas, para as lavouras com vagens ainda verdes. Quanto às causas de ordem nutricional, foi observado, em lavouras e em experimentos, que a ocorrência de retenção foliar e/ou senescência anormal da planta de soja está associada com baixos níveis de potássio no solo e/ou altos valores (acima de 50) da relação  $(Ca + Mg)/K$ . Nessas condições, pode ocorrer baixo “pegamento”

de vagens, vagens vazias e formação de frutos partenocárpicos (Mascarenhas et al., 1988).

Há indicações de pesquisa realizada no exterior de que a retenção foliar/haste verde pode ser causada, também, por um tipo de fitoplasma, fato ainda não investigado no Brasil.

Não há solução para o problema já estabelecido. Porém, uma série de práticas podem evitá-lo. A primeira prática é manejar o preparo e a fertilidade do solo, de acordo com as recomendações técnicas, para permitir que as raízes tenham desenvolvimento normal, alcançando maiores profundidades. Assim, a extração de umidade do solo, durante os períodos de seca, é favorecida, evitando distúrbios fisiológicos e desequilíbrios nutricionais. Outros cuidados são: melhorar as condições físicas do solo para aumentar sua capacidade de armazenamento de água e facilitar o desenvolvimento das raízes, evitar cultivares e épocas de semeadura que exponham a soja a fatores climáticos adversos coincidentes com os períodos críticos da cultura e fazer o controle de pragas conforme preconizado no Manejo de Pragas (capítulo 10).

ALMEIDA, A.M.R.; AMORIM, L.; BERGAMIN FILHO, A.; TORRES, E.; FARIAS, J.R.B.; BENATO, L.C.; PINTO, M.C.; VALENTIN, N. Progress of soybean charcoal rot under tillage and no-tillage systems in Brazil. **Fitopatologia Brasileira**, v.28, p.131-135, 2003.

ALMEIDA, A.M.R.; VLIET, H.V.D.; KITAJIMA, E.W.; PIUGA, F.F.; MARIN, S.R.R.; VALENTIN, N.; BINNECK, E.; BENATO, L.C.; NEPOMUCENO, A.L.; OLIVEIRA, T.G. Vírus da necrose da haste: ocorrência no Brasil e controle. In: REUNIÃO DE PESQUISA DE SOJA DA REGIÃO CENTRAL DO BRASIL, 24., 2002, São Pedro. **Ata...** Londrina: Embrapa Soja, 2002. v.1, p.57-73.

BONATO, E.R.; BONATO, A.L.V. **A soja no Brasil: história e estatística**. Londrina: EMBRAPA-CNPSO, 1987. 61p. (EMBRAPA-CNPSO. Documentos, 21).

CALDWELL, B.E., (Ed.). **Soybeans: improvement, production, and uses**. Madison: ASA, 1973. 681p. (ASA. Agronomy, 16).

CAMPO, R.J.; HUNGRIA, M. **Compatibilidade de uso de inoculantes e fungicidas no tratamento de sementes de soja**. Londrina: Embrapa Soja, 2000. 32p. (Embrapa Soja. Circular Técnica, 26).

CAMPO, R.J.; HUNGRIA, M.; ALBINO, U.B.; MORAES, J.Z.; SIBALDELLI, R.N.R. Estudo da compatibilidade em aplicação conjunta nas sementes, entre fungicidas, micronutrientes e inoculantes, sobre a sobrevivência do *Bradyrhizobium* e a eficiência de fixação biológica do nitrogênio. In: EMBRAPA SOJA. **Resultados de pesquisa da Embrapa Soja 1999**. Londrina, 2000. p.238-248 (Embrapa Soja. Documentos, 142).

CAMPO, R.J.; HUNGRIA, M.; MORAES, J.Z.; SIBALDELLI, R.N.R. Compatibilidade de aplicação conjunta nas sementes, de fungicidas, micronutrientes e inoculantes, sobre a sobrevivência do *Bradyrhizobium* e

a eficiência de fixação biológica do nitrogênio. In: HOFFMANN-CAMPO, C.B.; SARAIVA, O.F. (Org.). **Resultados de pesquisa da Embrapa Soja 2000: microbiologia de solos**. Londrina: Embrapa Soja, 2001. p.29-39 (Embrapa Soja. Documentos, 163).

CONAB. **Indicadores da agropecuária**. Brasília, 2002. Disponível em : < <http://www.conab.gov.br/> > Acesso em : 1 out. 2002.

DALL'AGNOL, A. The impact of soybeans on the Brazilian economy. **AGJacto**, n.2, p.16-17, aug. 2000.

DALL'AGNOL, A. Sem medo de competir. **Agroanalysis**, Rio de Janeiro, v.22, n.2, p.42-43, fev. 2002.

EMBRAPA SOJA. **Recomendações técnicas para a cultura da soja no Paraná 1999/2000**. Londrina, 1999. p.103, 109. (Embrapa Soja. Documentos, 131).

EMBRAPA. Centro Nacional de Pesquisa de Soja. **Recomendações técnicas para a cultura da soja no Paraná 1993/94**. Londrina: EMBRAPA-CNPSO : OCEPAR, 1993. p.28 (EMBRAPA-CNPSO. Documentos, 62; OCEPAR. Boletim Técnico, 34).

ESTADOS UNIDOS. Department of Agriculture. Economic Research Service. **Data products**. Washington , 2002. Disponível em: < <http://www.ers.usda.gov/data/sdp/view.asp?f=international/93002/> > Acesso em: 1 out. 2002.

FEHR, W.R.; CAVINESS, C.E. **Stage of soybean development**. Ames: Iowa State University, 1981. 12p. (Iowa Cooperative Extensive Service. Special Report, 80).

FRANÇA NETO, J. de B.; HENNING, A.A. **DIACOM: diagnóstico completo da qualidade da semente de soja**. Londrina: EMBRAPA-CNPSO, 1992. 22p. (EMBRAPA-CNPSO. Circular Técnica, 10).

FRANÇA NETO, J. de B.; KRZYZANOWSKI, F.C.; COSTA, N.P. da; HENNING, A.A. **O teste de tetrazólio em sementes de soja**. Londrina: EMBRAPA-CNPSO, 1998. 72p. (EMBRAPA-CNPSO. Documentos, 116).

GAZZIERO, D.L.P.; GUIMARÃES, S.C.; PEREIRA, F.A.R. **Plantas daninhas**: cuidado com a disseminação. Londrina: EMBRAPA-CNPSo, 1989. 1 folder.

HADLICH, E.; SCHIMIDT, S.H.; COSTA, N.P. da; MESQUITA, C. de M. **Campanha de redução de perdas na colheita de soja**: manual da colheita mecânica da soja. Curitiba: SEAB, 1997. 28p. (EMATER-PR. Informações Técnicas, 36).

HENNING, A.A. **Patologia de sementes**. Londrina: EMBRAPA-CNPSo, 1996. 43p. (EMBRAPA-CNPSo, Documentos, 90).

HUNGRIA, M.; CAMPO, R.J.; MENDES, I.C. **Fixação biológica do nitrogênio na cultura da soja**. Londrina: Embrapa Soja, 2001. 48p. (Embrapa Soja. Circular Técnica, 35; Embrapa Cerrados. Circular Técnica, 13)

KRYZYKANOWSKI, F.C.; FRANÇA-NETO, J.B.; HENNING, A.A.; CATTELAN, A.J.; COSTA, N.P. **Cuidados na aquisição e na utilização da semente de soja**. Londrina: EMBRAPA-CNPSo, 1996. 9p. (EMBRAPA-CNPSo. Comunicado Técnico, 55).

MASCARENHAS, H.A.A.; BULISANI, E.A.; MIRANDA, M.A.C. de; PEREIRA, J.C.V.N.A.; BRAGA, N.R. Deficiência de potássio em soja no Estado de São Paulo: melhor entendimento do problema e possíveis soluções. **O Agrônomo**, Campinas, v.40, n.1, p.34-43, 1988.

MASCARENHAS, H.A.A.; TANAKA, R.T. Soja. In: RAIJ, B. van; CANTARELLA, H.; QUAGGIO, A.J.; FURLANI, A.M.C. (Ed.). **Recomendações de adubação e calagem para o Estado de São Paulo**. 2.ed. Campinas: IAC, 1996. p.202-203. (IAC. Boletim Técnico, 100).

MESQUITA, C. de M.; COSTA, N.P.; MANTOVANI, E.C.; ANDRADE, J.C.M. de A.; FRANÇA-NETO, J.B.; SIVA, J.G. da; FONSECA, J.R.; PORTUGAL, F.A.F.; GUIMARÃES SOBRINHO, J.B. **Manual do produtor**: como evitar desperdício nas colheitas de soja, do milho e do arroz. Londrina: EMBRAPA-CNPSo, 1998. 31p. (EMBRAPA-CNPSo, Documentos, 112).

MIYASAKA, S.; MEDINA, J.C. (Ed.). **A soja no Brasil**. Campinas: ITAL, 1981. 1062p.

RAIJ, B. van.; CANTARELLA, H.; QUAGGIO, J.A.; FURLANI, A.M.C. (Ed.). **Recomendações de adubação e calagem para o Estado de São Paulo**. 2.ed. Campinas: IAC, 1996. 285p. (IAC. Boletim Técnico, 100).

RAIJ, B. van; QUAGGIO, A.J.; CANTARELLA, H.; ABREU, C.A. Interpretação de análise de solo. In: RAIJ, B. van; CANTARELLA, H.; QUAGGIO, A.J.; FURLANI, A.M.C. (Ed.). **Recomendações de adubação e calagem para o Estado de São Paulo**. 2.ed. Campinas: IAC, 1996. p.8-13. (IAC. Boletim Técnico, 100).

SFREDO, G.J.; BORKERT, C.M.; OLIVEIRA, M.C.N. de; WOBETO, C. e ALMEIDA, J. Determinação da relação ótima entre Ca, Mg e K para a cultura da soja em solos do Paraná: estudo a campo In: EMBRAPA SOJA. **Resultados de pesquisa de soja 1991/92**. Londrina, 1999. pt.1, p.327-355. (Embrapa Soja. Documentos, 138).

SFREDO, G.J.; KLEPKER, D.; ORTIZ, F.R.; OLIVEIRA NETO, W. **Níveis críticos de enxofre no solo para a soja, no Brasil**. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 29., 2003, Ribeirão Preto. **Solo**: alicerce dos sistemas de produção. Ribeirão Preto: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo: UNESP, 2003. 1 CD-ROM.

SOUSA, D.M.G. de. **Calagem e adubação para cultura da soja nos cerrados**. Planaltina: EMBRAPA-CPAC, 1984. 9p. (EMBRAPA-CPAC. Comunicado Técnico, 38).

SOUSA, D.M.G. de; LOBATO, E. **Correção do solo e adubação da cultura da soja**. Planaltina: EMBRAPA-CPAC, 1996. 30p. (EMBRAPA-CPAC. Circular Técnica, 33).

SOUSA, D.M.G. de; LOBATO, E.; REIN, T.A. **Uso de gesso agrícola nos solos dos Cerrados**. Planaltina, EMBRAPA-CPAC, 1996. 20p. (EMBRAPA-CPAC. Circular Técnica, 32).

YORINORI, J.T. **Cancro da haste da soja**: epidemiologia e controle. Londrina: EMBRAPA-CNPSO, 1996. 75p. (EMBRAPA-CNPSO. Circular Técnica, 14).



---

*Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária  
Centro Nacional de Pesquisa de Soja  
Rod. Carlos João Strass - Distrito de Warta  
Fone: (43) 3371-6000 Fax: (43) 3371-6100  
Caixa Postal 231 - CEP 86001-970 Londrina PR  
Home page: <http://www.cnpso.embrapa.br>  
E-mail: [sac@cnpso.embrapa.br](mailto:sac@cnpso.embrapa.br)*

**Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento**      **Governo Federal**