

Interpretação de Resultados de Análise de Solo

Francisco Morel Freire¹

Uma das condições para que os resultados da análise de solo e sua interpretação sejam válidos é que existam correlações entre os valores obtidos por um determinado método de extração e a resposta de culturas à adubação ou calagem em condições de campo. Por essa razão é que são desenvolvidos estudos de correlação e calibração de métodos de análise de solo. Na fase de correlação, por exemplo, são avaliados diferentes extratores, sendo selecionados os que melhor se aproximam do método padrão, que é a quantidade absorvida e acumulada pelas plantas de um dado nutriente. Na fase de calibração são, então, definidos os níveis críticos e as doses dos nutrientes a serem aplicados. Como os métodos de extração podem variar entre laboratórios de estados diferentes, que, por sua vez, possuem experimentação agrônômica própria, os critérios de interpretação deixam de ser,

assim, únicos. A título de ilustração, merece ser mencionado que, em Minas Gerais, adota-se o extrator Mehlich-1 para fósforo, ao passo que, em São Paulo, a extração desse elemento é feita com resina trocadora de íons.

As classes de interpretação para os resultados das análises químicas de solos emitidos pelos laboratórios em Minas Gerais encontram-se nas Tabelas 1, 2, 3, 4 e 5. Embora essas classes sejam gerais, a utilização delas permite separar glebas com probabilidades diferentes de resposta à aplicação de nutrientes.

Acidez do solo

Na avaliação da acidez do solo, deve-se levar em consideração as características acidez ativa (ou pH) e a trocável, a saturação por alumínio e por bases, a acidez potencial e o teor de matéria orgânica, que estão relacionadas entre si. Relacionada também com a acidez do solo está a disponibilidade

¹ Eng. Agr., Doutor, Fertilidade de Solo, Epamig Caixa Postal 295 CEP 35 701-970
Sete Lagoas, MG.
E-mail: epamigctao@hotmail.com

dos nutrientes cálcio e magnésio e de micronutrientes como manganês, ferro, cobre e zinco (Tabelas 1 e 2).

Fósforo, enxofre e potássio

A eficiência de extração do fósforo disponível pelo método Mehlich-1 sofre grande influência da capacidade tampão de fosfatos

fósforo remanescente (Tabela 4). Para o potássio disponível, como a capacidade tampão para potássio não afeta a eficiência de extração pelo método Mehlich-1, sendo também de pouco significado para a maioria dos solos de Minas Gerais, é adotada apenas uma classificação para esse nutriente (Tabela 3).

Tabela 1. Classes de interpretação para a acidez ativa do solo (pH)¹

Classificação química						
Ac. muito elevada	Acidez elevada	Acidez média	Acidez fraca	Neutra	Alcalinidade fraca	Alcalinidade elevada
>4,5	4,5 – 5,0	5,1 – 6,0	6,1 – 6,9	7,0	7,1 – 7,8	>7,8
Classificação agrônômica						
Muito baixo	pBaixo	Bom	Alto	Muito alto		
<4,5	4,5 – 5,4	5,5 – 6,0	6,1 – 7,0	>7,0		

¹ pH em H₂O, relação 1:2,5, TFSA : H₂O.

Fonte: ALVAREZ V. et al. (1999).

Tabela 2. Classes de interpretação de fertilidade do solo para a matéria orgânica e para o complexo de troca catiônica.

Característica	Unidade	Classificação				
		Muito baixo	Baixo	Médio ²	Bom	Muito Bom
Carbono orgânico (C.O.) ¹	dag/kg	≤ 0,40	0,41 – 1,15	1,17 – 2,32	2,33 – 4,06	> 4,06
Matéria orgânica (M.O.) ¹	dag/kg	≤ 0,70	0,71 – 2,00	2,01 – 4,00	4,01 – 7,00	> 7,00
Cálcio trocável (Ca ²⁺) ⁴	cmol _c /dm ³	≤ 0,40	0,41 – 1,20	1,21 – 2,40	2,41 – 4,00	> 4,00
Magnésio trocável (Mg ²⁺) ⁴	cmol _c /dm ³	≤ 0,15	0,16 – 0,45	0,46 – 0,90	0,91 – 1,50	> 1,50
Acidez trocável (Al ³⁺) ⁴	cmol _c /dm ³	< 0,20	0,21 – 0,50	0,51 – 1,00	1,01 – 2,00	> 2,00
Soma de bases (SB) ⁵	cmol _c /dm ³	< 0,60	0,61 – 1,80	1,81 – 3,60	3,61 – 6,00	> 6,00
Ac. potencial (H + Al) ⁶	cmol _c /dm ³	< 1,00	1,01 – 2,50	2,51 – 5,00	5,01 – 9,00	> 9,00
CTC efetiva (T) ⁷	cmol _c /dm ³	≤ 0,80	0,81 – 2,30	2,31 – 4,60	4,61 – 8,00	> 8,00
CTC pH 7 (T) ⁸	cmol _c /dm ³	≤ 1,60	1,61 – 4,30	4,31 – 8,60	8,61 – 15,00	> 15,00
Saturação por Al ³⁺ (m) ⁹	%	≤ 15,0	15,1 – 20,0	20,1 – 50,0	50,1 – 75,0	> 75,0
Saturação por bases (V) ¹⁰	%	≤ 20,0	20,1 – 40,0	40,1 – 60,0	60,1 – 80,0	> 80,0

¹ dag/kg = % (m/m); cmol_c/dm³. ² O limite superior desta classe indica o nível crítico.

³ Método Walkley & Black; M.O. = 1,724 x C.O. ⁴ Método KCl 1 mol/L. ⁵ SB = Ca²⁺ +

Mg²⁺ + K⁺ + Na⁺. ⁶ H⁺ + Al. Método Ca(OAc)₂ 0,5 mol/L, pH 7,3. ⁷ T = SB + Al³⁺.

⁸ T = SB + (H + Al). ⁹ m = 100 Al³⁺ / a. ¹⁰ V = 100 SB/T.

Fonte: ALVAREZ V. et al. (1999).

do solo. Por isso, na interpretação da disponibilidade de fósforo, são usadas características que estão relacionadas com a capacidade tampão, como o teor de argila ou o valor do fósforo remanescente (Tabela 3). O enxofre disponível, extraído com fosfato monocálcico em ácido acético, semelhantemente, é também afetado pela capacidade tampão de sulfatos do solo. Na interpretação do enxofre disponível de amostras compostas da camada subsuperficial, as classes de fertilidade apresentadas estão de acordo, como para o fósforo disponível, com a concentração de

Micronutrientes

Embora seja freqüente a deficiência de zinco e ou de boro em várias culturas em Minas Gerais, especialmente em solos de cerrado, há uma limitação de estudos detalhados no que se refere a trabalhos de calibração para interpretação de resultados de análise de solo para micronutrientes. Apesar disso, é apresentada uma primeira aproximação de interpretação, sendo incluídas classes de fertilidade para zinco, manganês, ferro e cobre, extraídos com o extrator Mehlich-1, e para boro, extraído com água quente (Tabela 5).

Tabela 3. Classes de interpretação da disponibilidade para o fósforo de acordo com o teor de argila do solo ou do valor de fósforo remanescente (P-rem) e para o potássio.

Característica	Classificação				
	Muito baixo	Baixo	Médio	Bom	Muito bom
	----- (mg/dm ³) ¹ -----				
Argila (%)	Fósforo disponível (P) ²				
60 - 100	≤ 2,7	2,8 - 5,4	5,5 - 8,0 ³	8,1 - 12,0	> 12,0
35 - 60	≤ 4,0	4,1 - 8,0	8,1 - 12,0	12,1 - 18,0	> 18,0
15 - 35	< 6,6	6,7 - 12,0	12,1 - 20,0	20,1 - 30,0	> 30,0
0 - 15	< 10,0	10,1 - 20,0	20,1 - 30,0	30,1 - 45,0	> 45,0
P-rem ⁴ (mg/L)	Potássio disponível (K) ³				
0 - 4	≤ 3,0	3,1 - 4,3	4,4 - 6,0 ³	6,1 - 9,0	> 9,0
4 - 10	≤ 4,0	4,1 - 6,0	6,1 - 8,3	8,4 - 12,5	> 12,5
10 - 19	≤ 6,0	6,1 - 8,3	8,4 - 11,4	11,5 - 17,5	> 17,5
19 - 30	≤ 8,0	8,1 - 11,4	11,5 - 15,8	15,9 - 24,0	> 24,0
30 - 44	≤ 11,0	11,1 - 15,8	15,9 - 21,8	21,9 - 33,0	> 33,0
44 - 60	≤ 15,0	15,1 - 21,8	21,9 - 30,0	30,1 - 45,0	> 45,0
	< 15	16 - 40	41 - 70	71 - 120	> 120

mg/dm³ = ppm (m/v). ¹Método Mehlich-1. ²Nesta classe apresentam-se os níveis críticos de acordo com o teor de argila ou com o valor do fósforo remanescente. O limite superior desta classe indica o nível crítico. P-rem = Fósforo remanescente. Fonte: Alvarez V. et al. (1999).

Tabela 4. Classes de interpretação da disponibilidade para o enxofre¹ de acordo com o valor de fósforo remanescente (P-rem).

P-rem	Classificação				
	Muito baixo	Baixo	Médio ²	Bom	Muito bom
mg/L	----- (mg/dm ³) ³ -----				
	Enxofre disponível (S)				
0 - 4	≤ 1,7	1,8 - 2,5	2,6 - 3,6	3,7 - 5,4	> 5,4
4 - 10	≤ 2,4	2,5 - 3,6	3,7 - 5,0	5,1 - 7,5	> 7,5
10 - 19	≤ 3,3	3,4 - 5,0	5,1 - 6,9	7,0 - 10,3	> 10,3
19 - 30	≤ 4,6	4,7 - 6,9	7,0 - 9,4	9,5 - 14,2	> 14,2
30 - 44	≤ 6,4	6,5 - 9,4	9,5 - 13,0	13,1 - 19,6	> 19,6
44 - 60	8,9	9,0 - 13,0	13,1 - 18,0	18,1 - 27,0	> 27,0

¹Extrator Ca(H₂PO₄)₂, 500 mg/L de P, em H₂OAc 2 mol/L.

²Esta classe indica os níveis críticos de acordo com o valor de P-rem.

³mg/dm³ = ppm (m/v).

Fonte: Alvarez V. et al. (1999).

Tabela 5. Classes de interpretação da disponibilidade para os micronutrientes.

Micronutrientes	Classificação				
	Muito baixo	Baixo	Médio ¹	Bom	Muito bom
mg/L	----- (mg/dm ³) ² -----				
Zinco disponível (Zn) ³	≤ 0,4	0,5 – 0,9	1,0 – 1,5	1,6 – 2,2	> 2,2
Manganês disponível (Mn) ³	≤ 2	3 – 5	6 – 8	9 – 12	> 12
Ferro disponível (Fe) ³	≤ 8	9 – 18	19 – 30	31 – 45	> 45
Cobre disponível (Cu) ³	≤ 0,3	0,4 – 0,7	0,8 – 1,2	1,3 – 1,8	> 1,8
Boro disponível (B) ⁴	≤ 0,15	0,16 – 0,35	0,36 – 0,60	0,61 – 0,90	> 0,90

¹O limite superior desta classe indica o nível crítico.

²mg/dm³ = ppm (m/v).

³Método Mehlich-1.

⁴Método água quente.

Fonte: Alvarez V. et al. (1999).

Bibliografia

ALVAREZ V., V.H.; NOVAIS, R. F.; BARROS, N. F.; CANTARUTTI, R. B.; LOPES, A. S. Interpretação dos resultados das análises de solos. In: RIBEIRO, A. C.; GUIMARÃES, P. T. G.; ALVAREZ V., V. H. (Ed.). **Recomendações para o uso de corretivos e fertilizantes em Minas Gerais – 5. Aproximação**. Viçosa, MG: CFSEMG, 1999. p. 25-32.

Glossário

Capacidade tampão: Refere-se à resistência que tem o solo para deixar variar a quantidade de um determinado nutriente em solução.

Fósforo remanescente: Concentração de fósforo da solução de equilíbrio após agitar durante 1 h a TFSA (terra fina seca ao ar) com solução de CaCl₂ 10 mmol/L, contendo 60 mg/L de P, na relação² 1:10.

Comunicado Técnico, 82

Exemplares desta edição podem ser adquiridos na:
Embrapa Milho e Sorgo
 Caixa Postal 151 CEP 35701-970 Sete Lagoas, MG
 Fone: 0xx31 3779 1000
 Fax: 0xx31 3779 1088
 E-mail: sac@cnpms.embrapa.br

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Comitê de Publicações

Presidente: Ivan Cruz
Secretário-Executivo: Frederico Ozanan Machado Durães
Membros: Antônio Carlos de Oliveira, Arnaldo Ferreira da Silva, Carlos Roberto Casela, Fernando Tavares Fernandes e Paulo Afonso Viana

Expediente

Supervisor editorial: José Heitor Vasconcellos
Revisão de texto: Dilermando Lúcio de Oliveira
Editoração eletrônica: Tânia Mara Assunção Barbosa