


Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Vinculada ao Ministério da Agricultura

CENTRO NACIONAL DE PESQUISA DE CAPRINOS
Est. Sobral/Groaíras, km 04
Cx. Postal D-10
62100 Sobral CE

DOCUMENTOS

n.10, julho/90, p.1/3



MAMITE

Carlos Eugênio Soto Vidal²

Ismar Maciel dos Santos³

Helenira Ellery Marinho Vasconcelos³

A MAMITE, TAMBÉM CONHECIDA COMO MASTITE, PEITO INCHADO OU ZANGADO, É UMA DOENÇA CONTAGIOSA QUE ATACA O ÚBERE E OS PEITOS DAS CABRAS E DAS OVELHAS. GERALMENTE, DEIXA OS PEITOS INCHADOS E DOLORIDOS.

A DOENÇA DIMINUI A QUANTIDADE DE LEITE, ALÉM DE PREJUDICAR BASTANTE A SUA QUALIDADE.

ÁINDA PREJUDICA O CRESCIMENTO DOS CABRITOS E CORDEIROS. A MAMITE TRAZ MUITOS PREJUÍZOS AO CRIADOR SE NÃO FOR TRATADA NO TEMPO CERTO.



¹Série Documentos - produzida para utilização por pequenos produtores de caprinos e ovinos assistidos pelo PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR - PAPP.

²Pesquisador EMBRAPA-CNPC, Sobral, CE, Caixa Postal D-10, 62100.

³Técnicos especializados em Difusão de Tecnologia, EMBRAPA-CNPC.

COMO EVITAR

O LOCAL ONDE A FÊMEA VAI SER ORDENHADA DEVE ESTAR SEMPRE LIMPO. A PESSOA QUE FOR TIRAR O LEITE DEVE TER AS UNHAS CORTADAS E DEVE LAVAR, COM ÁGUA E SABÃO, AS MÃOS E A METADE DOS BRAÇOS.



ANTES DE INICIAR A ORDENHA, O ÚBERE DEVE SER LIMPO COM UMA SOLUÇÃO DESINFETANTE, ANTES E DEPOIS DA ORDENHA, E OS PEITOS DEVEM SER MERGULHADOS TAMBÉM NUMA SOLUÇÃO DESINFETANTE. POR EXEMPLO:

.2 COLHERES DE SOPA DE IODO A 10%;

.2 COLHERES DE SOPA DE GLICERINA.

ESTES PRODUTOS SÃO ENCONTRADOS NAS FARMÁCIAS E DROGARIAS.




AS TETAS DA CABRA SÃO DELICADAS E NÃO MUITO ELÁSTICAS, COMO AS DA VACA. POR ISSO, NÃO DEVE-SE PUXAR NEM APERTAR COM MUITA FORÇA.

ESGOTAR TODO O LEITE DO ÚBERE. SOLTAR AS CABRAS NO PASTO, PARA QUE ELAS NÃO SE CONTAMINEM NO LOCAL ONDE É TIRADO O LEITE.

COMO TRATAR

O MELHOR MESMO É EVITAR A DOENÇA. MAS, SE O PEITO TORNAR-SE QUENTE, DOLORIDO, INCHADO, ENDURECIDO, O LEITE DIMINUIR DE UMA HORA PARA OUTRA EM UM DOS PEITOS, OU MESMO NOS DOIS E, LOGO DEPOIS, MUDAR DE COR, APRESENTAR MAU CHEIRO OU TALHAR COM FACILIDADE, O ANIMAL DEVERÁ ESTAR COM MAMITE.



A PRIMEIRA PROVIDÊNCIA A SER TOMADA É SEPARAR A FÊMEA DOS OUTROS ANIMAIS DO REBANHO.

A CABRA DOENTE DEVE SER ORDENHADA POR ÚLTIMO, TENDO-SE O CUIDADO DE ESGOTAR BEM TODO O LEITE DO PEITO E, SE POSSÍVEL, MERGULHAR AS TETAS EM UM COPINHO COM A SOLUÇÃO DESINFETANTE, A MESMA USADA PARA PREVENIR.

COMUNIQUE-SE COM O SERVIÇO DE EXTENSÃO RURAL DE SUA CIDADE, OU ENTRE EM CONTATO COM O CENTRO NACIONAL DE PESQUISA DE CAPRINOS, ESTRADA SOBRAL-GROAÍRAS, KM 4, CAIXA POSTAL D-10, CEP. 62100. SOBRAL, CE.

