

**ADUBAÇÃO DAS COVAS E PLANTIO DE FRUTÍFERAS
NATIVAS DO CERRADO**

José Antônio da Silva

Adubação das covas

As covas devem ser preparadas nas dimensões mínimas de 60 x 60 x 60 cm. Antes do plantio devem receber uma adubação conforme recomendação abaixo:

Adubos	Textura do Solo		
	Argilosa	Média	Arenosa
Calcário dolomítico	200 g	100 g	50 g
PRNT 100%			
Superfosfato triplo	240 g	160 g	80 g
Cloreto de potássio	50 g	50 g	50 g

Plantio das mudas

O plantio das mudas deve ser feito no início do período chuvoso. De preferência, em dia nublado. No momento do plantio, retira-se primeiro o fundo do saco plástico, colocando-o na cova e logo após, corta-se a lateral e retira-se o restante do saco plástico. Esse cuidado é necessário para o bom pegamento de muda. Após o plantio, a muda deve ser irrigada.

Tratos culturais

Para o sucesso do cultivo, após um ano de plantio das frutíferas nativas, recomenda-se realizar o coroamento e em seguida a adubação de cobertura, utilizando-se 10 g/cova da fórmula NPK 10-10-10. No desenvolvimento de cultura, faz-se necessário o controle de formigas.

PUBLICAÇÕES RECOMENDADAS

- SILVA, J.A. da; SILVA, D.B. da; JUNQUEIRA, N.T.V.; ANDRADE, L.R.M. de. **Fru-**
tas nativas do cerrado. Planaltina: EMBRAPA-CPAC/Brasília: EMBRAPA-SPI,
1994. 166p.
- SILVA, J.A. da; SILVA, D.B. da; JUNQUEIRA, N.T.V.; ANDRADE, L.R.M. **Coleta**
de sementes, produção de mudas e plantio de espécies frutíferas nativas dos
cerrados: informações exploratórias. Planaltina: EMBRAPA-CPAC, 1992. 23p.
(EMBRAPA-CPAC. Documentos, 44).
- SILVA, J.A. da.; FONSECA, C.E.L. da. **Propagação vegetativa de pequi-eiro:** en-
xertia em garfagem lateral e no topo. Planaltina: EMBRAPA-CPAC, 1991. 4p.
(EMBRAPA-CPAC. Pesquisa em Andamento, 53).