

TÉCNICO RESPONSÁVEL

José Alves da Silva Câmara
E-mail: camara@cpamn.embrapa.br

IXV EXPANSÃO - 0XX86 223 1414

Embrapa

**Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Centro de Pesquisa Agropecuária do Meio-Norte**

Ministério da Agricultura e do Abastecimento
Av. Duque de Caxias, 5650, B. Buenos Aires
64006-220 Teresina, PI
Fone (0XX) 86 225-1141 Fax (0XX) 86 225-1142
E-mail: webmaster@cpamn.embrapa.br



Ministério
da Agricultura
e do Abastecimento



**Teresina, PI
1999**

Graviola



Mudas Frutíferas

Embrapa

Meio-Norte

MUDA DE BOA QUALIDADE

É aquela que apresenta boa formação, bom vigor e ausência de pragas e doenças, além de ser proveniente de enxertia pela utilização de bons materiais.


TRANSPORTE DE MUDAS

É uma operação que requer bastante cuidado. O ideal é que se usem caixotes, onde as mudas possam ser acondicionadas em espaços adequados, sem sofrerem danos físicos, pela ação de choques ou vento.

COVEAMENTO

Abrir covas com dimensões de 60 x 60 x 60 cm, e fazer adubação pelo menos um mês antes do plantio. Evitar solos rasos e/ou encharcáveis. Na abertura da cova, a terra retirada dos primeiros 20 cm, deve ser separada do material

retirado das camadas mais profundas. Misturar a terra das camadas superiores com os adubos e corretivos. Essa mistura deve ser usada no enchimento da cova.



Método de abertura da cova

Utilizar a terra removida das camadas mais profundas para completar o enchimento da cova.


ADUBAÇÃO

A adubação das plantas deve ser feita de acordo com o resultado da análise do solo. Na impossibilidade de esta ser realizada, utilizar em cada cova, por ocasião do plantio, a seguinte adubação:

800 g de superfosfato triplo

200 g de cloreto de potássio

20 litros de esterco de curral bem curtido



Método de adubação e enchimento da cova

PLANTIO

Efetuar o plantio no início das chuvas. Para evitar a quebra do torrão, recomenda-se retirar inicialmente o fundo do saco antes de colocá-lo na cova. Depois, o saco deve ser cortado lateralmente e removido, deixando-se o topo do torrão cerca de 2 cm acima do nível do solo. Comprimir um pouco a terra em volta do torrão tendo-se o cuidado de não enterrar o pé da planta (colo). O espaçamento recomendado varia de 4 x 4 m a 8 x 8 m, dependendo do tipo de terreno e das máquinas utilizadas nos tratamentos culturais.

ADUBAÇÃO DE COBERTURA

A adubação nos três primeiros anos, deverá ser feita de três em três meses, usando-se um quilo da fórmula 10-13-15 ou 10-15-15, por planta. A partir do quarto ano usar quatro quilos por planta, parcelados da seguinte forma: colocar um quilo no início das chuvas; um quilo trinta dias antes da floração; um quilo após a formação do fruto e o restante no final da colheita. As adubações deverão ser feitas na projeção da copa.