

RECOMENDAÇÕES PARA O CULTIVO DO ARROZ DE SEQUEIRO

PREPARO DO SOLO

Aração a 20-25 cm de profundidade, seguida de uma a duas gradagens destorroadoras e de uma gradagem niveladora imediatamente antes do plantio.

ÉPOCA DE PLANTIO

No início das chuvas.

ESPAÇAMENTO

Em linhas - Sulcos espaçados de 40 cm, com uma densidade de 150 sementes/m².

Em covas: 40 cm x 30 cm ou 40 cm x 20 cm, utilizando-se 8 a 10 sementes por cova.

CALAGEM E ADUBAÇÃO

De acordo com a análise do solo. Para a cultura do arroz o pH ideal é de 5 a 6, razão porque, quando necessária, a calagem deve ser realizada com 2 toneladas de calcário por hectare. Já a adubação deve ser feita aplicando-se todo o fósforo e potássio em fundação. Com ralação ao nitrogênio, recomenda-se a aplicação de 1/3 da dose em fundação e os 2/3 restantes na diferenciação dos primórdios florais (cerca de 50 dias após a emergência, no caso das cultivares de ciclo médio, e 40 dias, em se tratando de cultivares de ciclo precoce).

CULTIVARES RECOMENDADAS

Rio Paranaíba, Araguaia, IAC 47, IAC 165, Uruçuí e Caiapó.

COLHEITA

O início depende da cultivar e da região. A colheita deve ser feita quando o teor de umidade dos grãos estiver entre 18 e 23% ou quando 2/3 dos grãos no cacho estiverem maduros.

Obs: Quantidade necessária de sementes: 40 a 50 quilos por hectare.



Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária -
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA
Centro de Pesquisa Agropecuária do Meio Norte - CPAMN
Av. Duque de Caxias, 5650 - Bairro Buenos Aires
64006-220 - Teresina - PI
Fone: (086) 225-1141 - Fax: (086) 225-1142