


Sistema de Monitoramento Agrometeorológico

Estações Meteorológicas de Região Centro-Oeste


Boletim Número: 407

Boletim Agrometeorológico da Região Centro-Oeste
Período: 07/01/2009 a 14/01/2009

MONITORAMENTO: Precipitação acumulada nesta última semana entre 80 e 140 milímetros no centro-norte, nordeste e centro-sul do Mato Grosso, além do noroeste e centro-sul de Goiás, centro-sul dos Pantanaís (MS), e ainda, centro do Mato Grosso do Sul. Nas demais áreas da Região Centro-Oeste, os acumulados de chuva devem ficar entre 10 e 50 milímetros. Em toda a região, a estiagem agrícola e a umidade do solo encontram-se, respectivamente, abaixo dos 20 dias e variando de 45 a 75 milímetros. Segundo o jornal Folha do Estado (MT), os produtores de soja do norte de Mato Grosso já se preparam para realizar as primeiras colheitas da safra 2008/2009, que devem ser iniciadas a partir do próximo dia 10. Segundo o presidente do Sindicato Rural do município de Lucas do Rio Verde, Júlio Cinpak, cerca de 5% dos 220 mil hectares de soja plantados na região devem ser colhidos no final da primeira quinzena de janeiro. “No ano passado nós atrasamos o início do plantio da safra por causa das poucas chuvas de outubro. Contudo, houve localidades que foram mais atingidas pelas chuvas localizadas e, são as lavouras destas regiões que devem começar a ser colhidas no dia 10 de janeiro”, explica Cinpak.



PREVISÃO: Nos próximos sete dias, os níveis de chuva acumulada devem ficar entre 40 e 100 milímetros no sudoeste, centro-norte e noroeste do Mato Grosso. No restante da Região Centro-Norte, a precipitação acumulada da semana deve ficar entre 5 e 35 milímetros. As temperaturas máximas devem ficar entre 32°C e 36°C no sudoeste e centro-sul do Mato Grosso, Pantanaís (MS), centro de Goiás e centro-norte do Mato Grosso do Sul. Nas demais localidades da região, as máximas devem ficar entre 27°C e 31°C. Em toda a região, as temperaturas mínimas devem variar de 17°C a 22°C. Nas próximas 48 horas, os tratamentos fitossanitários são necessários no sudoeste de Goiás, centro-sul e sudeste de Goiás, além de todo o estado do Mato Grosso do Sul. Neste mesmo período, deve haver irrigação no centro-sul de Goiás e leste do Mato Grosso do Sul. O manejo do solo encontra-se em condições razoáveis e favoráveis na Área Metropolitana de Goiânia (GO), sudoeste e nordeste de Goiás, toda a porção do Mato Grosso do Sul e a maior parte do Mato Grosso (exceto o centro-norte e noroeste). No restante regional, as condições para o manejo do solo encontram-se desfavoráveis e críticas. Seguem favoráveis as condições para a colheita em toda a região. Já o uso de defensivos agrícolas, possui condições desfavoráveis e críticas as microrregiões do entorno do Distrito Federal (GO) e de Alta Floresta (MT). Nas demais localidades do centro-oeste do país, o uso de defensivos agrícolas encontra-se em condições razoáveis e favoráveis.



Culturas indicadas pelo Zoneamento Agrícola do Ministério da Agricultura neste período:

AMENDOIM
ARROZ SEQUEIRO
FEIJAO DE SEQUEIRO 2 SAFRA
GIRASSOL DE SEQUEIRO C
MILHO DE SEQUEIRO
MILHO SAFRINHA C ZA
SOJA DE SEQUEIRO
SORGO ZON GRAO E SEMENTES



© 2002-2006 - Agritempo Todos os direitos reservados
Embrapa Informática Agropecuária
Centro Pesquisa Meteorológicas e Climáticas aplicadas à Agricultura