


Sistema de Monitoramento Agrometeorológico

Estações Meteorológicas de Região Sudeste


Boletim Número: 413

Boletim Agrometeorológico da Região Sudeste
Período: 15/01/2009 a 22/01/2009

MONITORAMENTO: Nas mesorregiões paulistas de Assis, Itapetininga, Presidente Prudente, Araçatuba e Metropolitana de São Paulo, os acumulados de chuva ficaram entre 50 e 100 milímetros nesta última semana. No restante da Região Sudeste, os registros de precipitação acumulada ficaram abaixo de 30 milímetros. Em toda o sudeste brasileiro, a estiagem agrícola encontra-se abaixo dos 5 dias e a umidade do solo varia de 45 a 75 milímetros. Segundo o Governo do Estado, Minas Gerais confirmou, em 2008, a condição de líder nacional nas exportações de ovos de galinha em casca refrigerados para consumo, alcançando receita da ordem de US\$ 28,4 milhões. Além disso, o Estado teve uma receita de US\$ 1,2 milhão com a comercialização de ovos de incubação no exterior. Os dados são do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) e foram organizados pela Superintendência de Política e Economia Agrícola da Secretaria de Estado da Agricultura (Seapa). De acordo com o superintendente de Política e Economia Agrícola da secretaria João Ricardo Albanez, os mineiros responderam, no ano passado, por 62% do valor total das exportações brasileiras de ovos para consumo, que alcançaram US\$ 46,5 milhões no levantamento do MDIC. Na comparação dos volumes negociados, o Estado vendeu quase 20 mil toneladas, enquanto a soma do Brasil é de aproximadamente 33,2 mil toneladas. Portanto, as empresas de Minas embarcaram 60% do volume total que o país destinou ao exterior em 2008. As empresas do Estado que trabalham com ovos em casca para consumo no mercado externo são a Granja Mantiqueira, de Itanhandu, e o Aviário Santo Antônio (ASA), de Nepomuceno, ambos os municípios localizados no Sul do Estado.



PREVISÃO: Na próxima semana, os registros de precipitação acumulada na semana devem ficar entre 110 e 150 milímetros no centro de Minas Gerais, Área Metropolitana de Belo Horizonte (MG), Zona da Mata (MG), sul e oeste de Minas Gerais, mesorregiões paulistas de Araçatuba, Araraquara, norte do Vale do Paraíba e Metropolitana de São Paulo, além da maior parte do Rio de Janeiro (exceto o norte). No restante da Região Sudeste, a precipitação acumulada deve ficar entre 10 e 70 milímetros. As temperaturas máximas devem ficar entre 30°C e 34°C nas mesorregiões paulistas de São José do Rio Preto, Vale do Paraíba e sudoeste de Ribeirão Preto, assim como noroeste e norte de Minas Gerais, Jequitinhonha (MG), centro e norte do Espírito Santo. Nas demais localidades da região, as maiores temperaturas do dia devem ficar entre 23°C e 28°C. No litoral da região, as mínimas devem ficar entre 22°C e 24°C. Nas outras áreas da região, as temperaturas máximas devem variar de 17°C e 21°C. Nas próximas 48 horas, serão necessários tratamentos fitossanitários nas microrregiões mineiras de Januária e Montes Claros. Neste mesmo período, é necessário irrigar o Campo das Vertentes (MG), município e cidades vizinhas de Caraguatatuba (SP), além da microrregião de Guarapari (ES). O manejo do solo encontra-se em condições desfavoráveis e críticas no sul e oeste de Minas Gerais, Campo das Vertentes (MG), e também, as mesorregiões paulistas de Itapetininga, sul do Vale do Paraíba e litoral sul. Nas demais áreas da região, o manejo do solo encontra-se em condições razoáveis e favoráveis. A colheita segue desfavorável no sul e oeste de Minas Gerais, assim como as mesorregiões paulistas de Itapetininga e sul de Bauru. No restante regional, a colheita segue razoável. O uso de defensivos agrícolas possui condições desfavoráveis e críticas no sul, centro e oeste de Minas Gerais, Área Metropolitana de Belo Horizonte (MG), Triângulo (MG), Jequitinhonha (MG), Vale do Mucuri (MG), leste do Vale do Rio Doce (MG), mesorregiões paulistas de Itapetininga, oeste de Ribeirão Preto, leste de Campinas e centro sul de Bauru, além da microrregião de São José dos Campos (SP), noroeste capixaba, e também, o centro e sul fluminense. Nas outras áreas da região, o uso de defensivos agrícolas possui condições razoáveis.



Culturas indicadas pelo Zoneamento Agrícola do Ministério da Agricultura neste período:

ALGODAO HERBACEO
AMENDOIM
BANANA DE SEQUEIRO
BANANA IRRIGADA
CAFE ARABICA DE SEQUEIRO
CEVADA IRRIGADA
FEIJAO DE SEQUEIRO 2 SAFRA
GIRASSOL DE SEQUEIRO C
MAMONA
MILHO SAFRINHA C ZA
SOJA DE SEQUEIRO
SORGO ZON GRAO E SEMENTES



© 2002-2006 - Agritempo Todos os direitos reservados
Embrapa Informática Agropecuária
Centro Pesquisa Meteorológicas e Climáticas aplicadas à Agricultura