


Sistema de Monitoramento Agrometeorológico

Estações Meteorológicas de Região Sul


Boletim Número: 414

Boletim Agrometeorológico da Região Sul
Período: 16/01/2009 a 23/01/2009

MINITORAMENTO: Nesta última semana, os registros de chuva acumulada ficaram entre 80 e 140 milímetros no oeste e sudoeste do Paraná, Região metropolitana de Curitiba (PR), oeste de Santa Catarina (SC), Vale do Itajaí (SC), Área Metropolitana de Porto Alegre (RS). No restante da Região Sul, os acumulados de chuva variaram de 20 a 70 milímetros. Em toda a região sul, a estiagem agrícola encontra-se abaixo dos 15 milímetros. No oeste, centro-ocidental e sul do Rio Grande do Sul, além do sudoeste do Paraná, a umidade do solo encontra-se entre 15 e 30 milímetros. Nas demais localidades da região, as reservas de água do solo encontram-se entre 40 e 75 milímetros. Segundo portal Agrolink, a Emater confirmou as perdas nas lavouras de milho e feijão decorrentes da estiagem, que ocasionou prejuízo de pelo menos R\$ 332,36 milhões no Rio Grande do Sul. O rendimento médio do milho no Estado caiu para 3.272 kg/ha e a produção total, para 4.470.698 toneladas. Os valores representam redução superior a 16% em relação às projeções iniciais. 'Esta perda é consolidada e poderá se agravar', ressalta o engenheiro agrônomo da Emater, Atalides Jacobsen.



PREVISÃO: Para a próxima semana na Região Sul, os tratamentos fitossanitários são aconselháveis no centro-norte e sudeste do Rio Grande do Sul. Não deve haver irrigação no sudoeste, noroeste e oeste do Paraná, assim como as microrregiões catarinenses de Chapecó e Campo de Lages, Grande Florianópolis (SC), Área Metropolitana de Porto Alegre (RS), sudeste e noroeste gaúcho. As condições para o manejo do solo encontram-se razoáveis no sudoeste e oeste do Paraná, centro oriental, sudeste e noroeste do Rio Grande do Sul, Grande Florianópolis (SC), e ainda, as microrregiões catarinenses de Chapecó e Campo de Lages. No restante da região, as condições para o manejo do solo encontram-se desfavoráveis e críticas. A colheita segue razoável na Região Metropolitana de Curitiba (PR), além de toda a porção do estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nas demais áreas regionais, a colheita segue desfavorável. O uso de defensivos agrícolas possui condições desfavoráveis e críticas nas microrregiões gaúchas de Erechim e Frederico Westphalen, na maior parte do oeste de Santa Catarina (exceto a microrregião de São Miguel do Oeste) e noroeste catarinense. Nas outras áreas da região, o uso de defensivos agrícolas encontra-se em condições razoáveis.



Culturas indicadas pelo Zoneamento Agrícola do Ministério da Agricultura neste período:

AMENDOIM
BANANA DE SEQUEIRO
CAFE ARABICA DE SEQUEIRO
FEIJAO DE SEQUEIRO 1 SAFRA
FEIJAO DE SEQUEIRO 2 SAFRA
GIRASSOL DE SEQUEIRO C
MAMONA
MILHO DE SEQUEIRO
MILHO SAFRINHA C ZA
SORGO ZON GRAO E SEMENTES



© 2002-2006 - Agritempo Todos os direitos reservados
Embrapa Informática Agropecuária
Centro Pesquisa Meteorológicas e Climáticas aplicadas à Agricultura