

Sistema de Monitoramento Agrometeorológico


Estações Meteorológicas de Região Centro-Oeste

Boletim Número: 437


Boletim Agrometeorológico da Região Centro-Oeste

Período: 18/02/2009 a 25/02/2009

MONITORAMENTO: A chuva que ficou acumulada dos dias 11/02 a 18/02 foi registrada entre 70 e 120 milímetros no sudeste, centro-leste e extremo oeste do Mato Grosso, além da microrregião do Alto Taquari (MS) e microrregião de Aragarças (GO). No restante da Região Centro-Oeste, os acumulados de precipitação ficaram entre 10 e 40 milímetros. A estiagem agrícola e a umidade do solo encontram-se, respectivamente, entre 40 e 60 dias, e variando, de 5 a 15 milímetros na microrregião mato-grossense de Colíder. Sendo que nas demais áreas da região, a estiagem agrícola encontra-se abaixo dos 10 dias e a umidade do solo varia de 50 a 75 milímetros. Segundo o Diário de Cuiabá, o estado do Mato Grosso registrou no mês passado o melhor janeiro de toda a série histórica elaborada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, iniciada em 1999. Alheia à crise internacional, as exportações estaduais em janeiro de 2009 tiveram desempenho positivo atingindo a comercialização de US\$ 542,81 milhões. Em relação a janeiro de 2008, as vendas ficaram 23,36% acima dos US\$ 440 milhões faturados anteriormente. Na comparação mensal, com dezembro de 2008, a pauta estadual manteve vigor, registrando evolução de 7,96% em relação aos US\$ 502 milhões faturados naquele período. O superávit foi mais uma vez baseado nas vendas de grãos, soja e milho, sendo este último o destaque, como também as vendas de carne de frango. Conforme dados divulgados na última sexta-feira pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), o Estado passou pelos impactos da crise mundial graças também à ampliação dos mercados consumidores.



PREVISÃO: Deve haver acúmulos de chuva entre 100 e 180 milímetros no centro-sul, sudeste, leste e extremo norte do Mato Grosso, assim como o sudoeste, centro-oeste, centro-norte e noroeste de Goiás, para a próxima semana. Nas demais localidades da Região Centro-Oeste, os registros de precipitação acumulada devem ficar entre 20 e 60 milímetros. As maiores temperaturas do dia devem ficar entre 30°C e 34°C em todo o estado do Mato Grosso do Sul, microrregião de Rondonópolis (MT), e ainda, o sudoeste, sudeste e centro-norte do Mato Grosso. Nas demais áreas da região, as temperaturas máximas devem ficar entre 27°C e 29°C. Em toda a região, as temperaturas mínimas devem variar de 18°C a 22°C. Nas próximas 48 horas, os tratamentos fitossanitários serão necessários no sudoeste de Goiás, além do leste e centro-sul do Mato Grosso do Sul. As irrigações serão necessárias na microrregião do Meia Ponte (GO) e Colíder (MT). Encontram-se desfavoráveis e críticas as condições para o manejo do solo no noroeste, sudoeste e extremo oeste de Goiás, além da microrregião do Meia Ponte (GO), e ainda, o centro, norte e leste do Mato Grosso. Nas demais áreas regionais, o manejo do solo encontra-se em condições razoáveis e favoráveis. A colheita segue desfavorável nas microrregiões mato-grossenses de Arinos e Alta Floresta. No restante da região, a colheita segue em condição razoável. No centro-norte de Goiás, Entorno do Distrito Federal (GO), centro-sul dos Pantanais (MS), sudoeste e centro-norte do Mato Grosso, o uso de defensivos agrícolas possui condições desfavoráveis e críticas. Sendo que nas outras porções do centro-oeste do país, seguem em condições razoáveis.



Culturas indicadas pelo Zoneamento Agrícola do Ministério da Agricultura neste período:

CANOLA DE SEQUEIRO
FEIJAO DE SEQUEIRO 2 SAFRA
GIRASSOL DE SEQUEIRO C
MILHO SAFRINHA C ZA
SORGO ZON GRAO E SEMENTES
TRIGO DE SEQUEIRO
TRIGO IRRIGADO



© 2002-2006 - Agritempo Todos os direitos reservados
Embrapa Informática Agropecuária
Centro Pesquisa Meteorológicas e Climáticas aplicadas à Agricultura