




Sistema de Monitoramento Agrometeorológico

Estações Meteorológicas de Região Sudeste




Boletim Número: 439

Boletim Agrometeorológico da Região Sudeste
 Período: 26/02/2009 a 05/03/2009

MONITORAMENTO: Nesta última semana, os acumulados de chuva ficaram abaixo dos 40 milímetros em toda a Região Sudeste. A umidade do solo varia de 10 a 30 milímetros no Jequitinhonha (MG), Vale do Mucuri (MG), Vale do Rio Doce (MG), além da maior parte do estado do Espírito Santo (exceto o sudoeste). No restante da região, as reservas de água do solo encontram-se entre 35 e 75 milímetros. Em todo o sudeste do país, não há estiagem agrícola. Segundo Levantamento do Cepea aponta que os preços do açúcar cristal seguiram firmes nos últimos dias, apesar da baixa liquidez – compradores e usinas retraídos. Nessa quarta-feira, 25, o Indicador CEPEA/ESALQ para o produto de cor ICUMSA entre 130 e 180 (estado de São Paulo) fechou em R\$ 46,51/saca de 50 kg, alta de 12,3% no acumulado do mês. O suporte vem do cenário internacional de oferta pequena. De modo geral, usinas devem iniciar a produção de açúcar branco somente em abril, apesar de o início da colheita da região Centro-Sul ser esperado para a segunda quinzena de março. Os primeiros cortes de cana, que costumam ter produtividade inferior, devem ser direcionados para a produção de álcool e de açúcar VHP (exportação).



PREVISÃO: No sul de Minas Gerais, Campo das Vertentes (MG), além da maior parte do estado de São Paulo (exceto as mesorregiões de Araçatuba e São José do Rio Preto), as temperaturas máximas devem variar de 29°C a 33°C. Nas demais áreas da região, as máximas devem ficar entre 23°C e 28°C. Em todo o litoral da região, as mínimas devem ficar entre 22°C e 24°C. No restante regional, as temperaturas mínimas devem variar de 16°C a 20°C. Os tratamentos fitossanitários são aconselháveis na microrregião mineira de Curvelo, Araçuaí e Januária. Já a irrigação, deve ser feita no Jequitinhonha (MG), Vale do Mucuri (MG), Vale do Rio Doce (MG), Área Metropolitana de Belo Horizonte (MG), nordeste e centro fluminense, Baixadas (RJ) e a maior parte do Espírito Santo (exceto o sul). As condições para o manejo do solo encontram-se favoráveis e razoáveis no Triângulo (MG), Zona da Mata (MG), noroeste de Minas Gerais, Área Metropolitana de Belo Horizonte (MG), maior parte do estado de São Paulo (exceto a mesorregião de Itapetininga, São José do Rio Preto, Araçatuba e Presidente Prudente), centro-leste e sul do Espírito Santo, e ainda, toda a porção do Rio de Janeiro. No restante regional, o manejo do solo encontra-se em condições desfavoráveis e críticas. A colheita segue desfavorável apenas no extremo sul de São Paulo, sendo que nas demais áreas da região, segue em condição razoável. O uso de defensivos agrícolas encontra-se em situação desfavorável no norte de Minas Gerais, norte do Jequitinhonha (MG), extremo sul de São Paulo e sudeste capixaba. Nas demais localidades da região, o uso de defensivos agrícolas possui condições razoáveis.



Culturas indicadas pelo Zoneamento Agrícola do Ministério da Agricultura neste período:

AMENDOIM
FEDAO DE SEQUEIRO 2 SAFRA
GIRASSOL DE SEQUEIRO C
MILHO SAFRINHA C ZA
SORGO ZON GRAO E SEMENTES
TRIGO DE SEQUEIRO
TRIGO IRRRIGADO



© 2002-2006 - Agritempo Todos os direitos reservados
Embrapa Informática Agropecuária
Centro Pesquisa Meteorológicas e Climáticas aplicadas à Agricultura