

Sistema de Monitoramento Agrometeorológico


Estações Meteorológicas da Região Norte

Boletim Número: 441


Boletim Agrometeorológico da Região Norte

Período: 02/03/2009 a 09/03/2009

MONITORAMENTO: Acumulados de precipitação entre 10 e 40 milímetros em todo o estado de Tocantins, Rondônia e Roraima, além do centro-norte do Amazonas, sul do Pará e Área Metropolitana de Belém (PA), nesta última semana. No restante da Região Norte, os registros de precipitação acumulados na semana variaram de 50 a 110 milímetros. Apenas no sudoeste do Amazonas, Área Metropolitana de Belém (PA), centro e norte de Roraima, a estiagem agrícola encontra-se entre 30 e 60 dias. Nas demais áreas da região, a estiagem agrícola encontra-se abaixo dos 20 dias. No centro e nordeste de Roraima, assim como a Área Metropolitana de Belém (PA), a umidade do solo encontra-se entre 10 e 30 milímetros. No restante regional, as reservas de água do solo variam de 45 a 75 milímetros.



PREVISÃO: Nesta próxima semana, no sudeste, centro oriental e sul de Tocantins, além de Roraima, Amapá, sul do Pará e Baixo Amazonas (PA), os níveis de precipitação acumulada devem ficar entre 10 e 60 milímetros. No restante da Região Norte, os acumulados de chuva devem variar de 70 a 150 milímetros. As maiores temperaturas do dia devem ficar entre 32°C e 36°C em todo o estado de Roraima, sudoeste de Tocantins e sul de Rondônia. Nas demais localidades da região, as temperaturas máximas devem ficar entre 27°C e 31°C. Já as mínimas, devem ficar entre 20°C e 24°C em todo o norte do país. Nas próximas 48 horas, os tratamentos fitossanitários serão necessários em Roraima, sudoeste de Rondônia, além do centro-ocidental e sul de Tocantins. Neste mesmo período, deve-se irrigar o sudeste do Amazonas, centro e norte de Roraima, e ainda, o sudeste de Tocantins. As condições para o manejo do solo encontram-se razoáveis na maior parte de Tocantins (exceto o noroeste), sendo que nas demais áreas da região, as condições encontram-se desfavoráveis e críticas. A colheita segue desfavorável no centro, centro-oeste e extremo leste do Pará, assim como sudoeste do Amazonas, norte do Amapá, e ainda, o centro e sul de Madeira Guaporé (RO). Nas demais áreas regionais, a colheita segue em condição razoável. Na maior parte do Amazonas (exceto o noroeste e oeste), Marajó (PA), sudeste do Pará, leste do Vale do Acre (AC), nordeste de Roraima, norte, centro e sudoeste de Rondônia, além da maior parte de Tocantins (exceto o norte), o uso de defensivos agrícolas possui condições razoáveis. Nas outras áreas regionais, é crítico o uso de defensivos agrícolas.



Culturas indicadas pelo Zoneamento Agrícola do Ministério da Agricultura neste período:



© 2002-2006 - Agritempo Todos os direitos reservados
Embrapa Informática Agropecuária
Centro Pesquisa Meteorológicas e Climáticas aplicadas à Agricultura