




Sistema de Monitoramento Agrometeorológico

Estações Meteorológicas de Região Sul




Boletim Número: 444

Boletim Agrometeorológico da Região Sul
 Período: 06/03/2009 a 13/03/2009

MONITORAMENTO: Nesta última semana, houve registros de 60 a 110 milímetros de acumulados de chuva no nordeste e sudeste de Santa Catarina, sul da área Serrana (SC), leste do Vale do Itajaí (SC), além do sudoeste e centro do Rio Grande do Sul. No restante da Região Sul, os níveis de precipitação acumulada ficaram abaixo dos 35 milímetros. Em toda o sul do país, a estiagem agrícola encontra-se abaixo dos 25 dias e a umidade do solo variando de 35 a 75 milímetros. De acordo com o portal Agrolink, a região paranaense de Campos Gerais já deixou de produzir aproximadamente 60 mil toneladas de milho em função da estiagem prolongada registrada nos meses de novembro e dezembro, conforme dados do Departamento de Economia Rural (Deral). A expectativa inicial era de cultivar 191 mil hectares, o que reduziu para 181 mil hectares. Segundo informações do Deral, em torno de 25% da área cultivada de milho na região já foi colhida e a previsão é de concluir a colheita em maio. Na comparação com a safra 2007/08 a área cultivada de milho reduziu 9,4%, passando de 202 mil hectares para 181 mil hectares, aproximadamente.



PREVISÃO: As temperaturas máximas devem ficar entre 22°C e 26°C na Área Metropolitana de Curitiba (PR), sudeste do Paraná, maior parte de Santa Catarina (exceto o oeste), faixa litorânea, norte e nordeste do Rio Grande do Sul. Nas demais áreas da região, as máximas devem ficar entre 28°C e 32°C. As temperaturas mínimas devem ficar entre 11°C e 14°C nas serras gaúchas e catarinenses. Sendo que no restante regional, as menores temperaturas do dia devem variar de 16°C a 21°C. Os tratamentos fitossanitários são aconselháveis no centro-oeste e extremo sul do Rio Grande do Sul. Deve-se irrigar o leste, centro-sul e noroeste do Paraná, assim como o extremo oeste de Santa Catarina, além das microrregiões gaúchas de Santa Rosa, Ijuí, Osório e Carazinho. O manejo do solo é desaconselhável no sudoeste e centro-sul do Rio Grande do Sul, centro-sul da Área Metropolitana de Porto Alegre (RS), nordeste de Santa Catarina e leste do Vale do Itajaí (SC). Nas demais áreas da região, são aconselháveis o manejo do solo. Em toda a Região Sul, a colheita encontra-se e condições razoáveis e favoráveis. Já o uso de defensivos agrícolas, possui condições desfavoráveis no centro do Rio Grande do Sul, centro da Área Metropolitana de Porto Alegre (RS), sul e nordeste de Santa Catarina, leste do Vale do Itajaí (SC), microrregiões paranaenses de Pitanga e União da Vitória. Nas demais localidades regionais, a aplicação de defensivos agrícolas pode ser utilizada.



BANANA DE SEQUEIRO
CAFÉ ARABICA DE SEQUEIRO
CANOLA DE SEQUEIRO
FEDAO DE SEQUEIRO 1 SAFRA
FEDAO DE SEQUEIRO 3 SAFRA
MILHO SAFRINHA C ZA



© 2002-2006 - Agritempo Todos os direitos reservados
Embrapa Informática Agropecuária
Centro Pesquisa Meteorológicas e Climáticas aplicadas à Agricultura