


Sistema de Monitoramento Agrometeorológico

Estações Meteorológicas de Região Sul


Boletim Número: 449

Boletim Agrometeorológico da Região Sul
Período: 13/03/2009 a 20/03/2009

MONITORAMENTO: Nos últimos sete dias, os acumulados de precipitação ficaram entre 170 e 230 milímetros na Área Metropolitana de Curitiba (PR). Nas demais localidades da Região Sul, a precipitação acumulada na semana ficou abaixo de 40 milímetros. Em todo o sul do país, a estiagem agrícola encontra-se abaixo dos 20 dias e a umidade do solo varia de 30 a 75 milímetros. Segundo o portal Agrolink, a primavera chuvosa, seguida de geadas e granizo, prejudicou o cultivo de maçã no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. A safra gaúcha, que será aberta simbolicamente hoje, em Vacaria, não irá ultrapassar 450 mil toneladas, segundo a Emater, um recuo de 9%. Com isso, a produção nacional deve ficar em 750 mil toneladas, 10% inferior à de 2008. O cenário favorece o preço. Conforme o agrônomo da Emater, Antônio Conte, o valor do quilo ao produtor está acima de R\$ 0,65. Em 2008, o mercado pagou menos de R\$ 0,50. "Esse panorama dará certa tranquilidade". As indústrias que processam maçã acreditam que terão boa comercialização em 2009. A expectativa é manter o volume exportado em 20% da produção. "Existe crise, mas não há sinal de diminuição de vendas", garantiu o vice-presidente da Agapomi, Alceu Borges.



PREVISÃO: As temperaturas máximas da próxima semana devem ficar entre 29°C e 33°C no centro e oeste do Rio Grande do Sul, nordeste de Santa Catarina, leste do Vale do Itajaí (SC) e a maior parte do Paraná (exceto o sudeste). No restante da Região Sul, as máximas devem variar de 23°C a 27°C. Na área Serrana (SC) e centro-sul do Paraná, as menores temperaturas do dia devem ficar entre 11°C e 14°C. Nas outras áreas da região, as mínimas devem ficar entre 16°C e 20°C. Nas próximas 48 horas, os tratamentos fitossanitários serão necessários na maior parte do Paraná (exceto o norte, nordeste e Área Metropolitana de Curitiba), noroeste, centro e oeste de Santa Catarina, além do centro, centro-oeste e sudoeste do Rio Grande do Sul. Neste mesmo intervalo, deve-se irrigar o noroeste do Rio Grande do Sul, microrregião gaúcha de Osório, assim como o noroeste, oeste, sudoeste, centro-sul e nordeste do Paraná. São desfavoráveis as condições para o manejo do solo somente no sudeste do Rio Grande do Sul e microrregião paranaense de Umuarama. A colheita encontra-se em condição razoável em toda região, exceto o nordeste do Paraná. A aplicação e defensivos agrícolas encontram-se em condições críticas e desfavoráveis no norte e nordeste do Paraná, sul e nordeste de Santa Catarina, oeste da Área Serrana (SC), além do sudeste e nordeste do Rio Grande do Sul. Nas demais áreas da região, o uso de defensivos agrícolas encontra-se em condições razoáveis.



Culturas indicadas pelo Zoneamento Agrícola do Ministério da Agricultura neste período:

BANANA DE SEQUEIRO
CAFE ARABICA DE SEQUEIRO
CANOLA DE SEQUEIRO
FEDAO DE SEQUEIRO 3 SAFRA
MILHO SAFRINHA C ZA
TRIGO DE SEQUEIRO



© 2002-2006 - Agritempo Todos os direitos reservados
Embrapa Informática Agropecuária
Centro Pesquisa Meteorológicas e Climáticas aplicadas à Agricultura