

Sistema de Monitoramento Agrometeorológico


Estações Meteorológicas de Região Norte

Boletim Número: 458


Boletim Agrometeorológico da Região Norte

Período: 06/04/2009 a 13/04/2009

MONITORAMENTO: Acumulados de chuva entre 140 e 220 milímetros no centro-oeste do Pará, nesta última semana. No restante da Região Norte, os registros de precipitação variaram de 20 a 80 milímetros. Na maior parte do norte do país, a estiagem agrícola não ultrapassa os 15 dias, exceto o norte de Roraima, onde varia de 40 a 70 dias. A umidade do solo encontra-se entre 10 e 40 dias no sudoeste do Pará, sudeste do Amazonas, oeste de Rondônia, norte e toda a faixa leste de Roraima, assim como o sudeste de Tocantins. Nas demais localidades da região, as reservas hídricas do solo encontram-se entre 45 e 70 milímetros.



PREVISÃO: No sudoeste e centro-sul do Amazonas, nordeste do Pará e centro de Tocantins, podem haver acumulados de chuva entre 140 e 180 milímetros, na próxima semana. No restante da Região Norte, a precipitação acumulada deve ficar entre 60 e 120 milímetros, salvo o norte do Amapá e sudoeste de Rondônia, onde os registros não devem ultrapassar os 30 milímetros. As temperaturas máximas devem ficar entre 30°C e 34°C no centro e leste do Pará, Baixo Amazonas (PA), todo o estado de Roraima, norte do Amazonas, além do centro, centro-norte e norte de Tocantins. No restante regional, as máximas devem ficar entre 27°C e 29°C. Já as mínimas devem variar de 21°C a 24°C em todo o norte do país. Os tratamentos fitossanitários são necessários somente no sudoeste de Rondônia, centro-sul de Madeira Guaporé (RO), todo o estado de Roraima, além do centro-ocidental de Tocantins. Deve-se irrigar o centro e sudoeste do Pará, nordeste de Roraima, Área Metropolitana de Porto Velho (RO) e centro de Rondônia. O manejo do solo deve ser praticado no oeste do Pará, Madeira Guaporé (RO), centro-oriental e norte de Tocantins. A colheita pode ser realizada no sudeste do Amazonas, maior parte do Pará (exceto o sul), todo o estado do Amapá, centro-leste de Roraima, todo o estado de Rondônia e maior parte de Tocantins (exceto o sul).



Culturas indicadas pelo Zoneamento Agrícola do Ministério da Agricultura neste período:



© 2002-2006 - Agritempo Todos os direitos reservados
Embrapa Informática Agropecuária
Centro Pesquisa Meteorológicas e Climáticas aplicadas à Agricultura